

مېۋىلىك ھەرخىللىرىنىڭ ئالا سۈرۈشلىرىنى
ئۆز ئىستىساراسى بېكىتىش



قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى



مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سورتلىرىنى
تېز يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسى

تۈزگۈچى : مۇھەممەتئىمىن توختى

قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى

图书在版编目(CIP)数据

果树良种速育技术/买买提明·托合提编. —喀什:喀什维吾尔文出版社, 2003. 10(2006. 4 重印)

ISBN 7—5373—1207—9

I. 果… II. 买… III. 果树—育种繁育—维吾尔语(中国少数民族语言) IV. S660.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 036237 号

责任编辑:迪丽拜尔·阿布都热依木

责任校对:阿尔祖姑丽·斯迪克

果树良种速育技术

买买提明·托合提 编

喀什维吾尔文出版社出版发行

(喀什市塔吾古孜路 14 号 邮编: 844000)

各地新华书店经销

喀什维吾尔文出版社印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 开本 4.25 印张

2003 年 11 月第 1 版 2006 年 4 月第 2 次印刷

印数:2571——5650 定价:6.50 元

如有质量问题,请与我社联系调换 电话:0998—2653927

تۈزگۈچىدىن

مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرىنى تېز يېتىشتۈرۈش ئۇسۇلى ، ئادەتتىكى ئەنئەنىۋى كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئۇسۇللىرىغا قارىغاندا بىرقەدەر يېڭى ۋە بىر-قەدەر ئىلمىي بولغان ئىلغار پەن - تېخنىكا ئۇسۇلىدۇر . بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىپ مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىنى يې-تىشتۈرگەندە ، كۆچەت يېتىشتۈرۈش ۋاقتىنى قىسقارتىد-لى ، سورتلارنىڭ ئەلالىرىنى تاللاپ كۆپەيتكىلى ، يېتىش-تۈرۈلگەن سورتلارنىڭ سۈپىتىنى ساقلاپ قالغىلى ۋە ئىق-تىسادىي ئورمان بازىسى قۇرۇلۇشى ئۈچۈن تۈمەنلىگەن ئەلا سورتلۇق مېۋىلىك كۆچەتلىرىنى تېز يېتىشتۈرۈپ بەر-گىلى بولىدۇ .

نۆۋەتتە ، مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەت-لىرىنى تېز يېتىشتۈرۈش ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ باغۋەنچى-لىك ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىياتىنى تېخىمۇ تېزلىتىپ ، ئۇنىڭ سورت ، سۈپەت ، مەھسۇلات سەۋىيىسىنى مەملىكە-تىمىزنىڭ ، جۈملىدىن دۇنيادىكى ھەرقايسى ئەللەرنىڭ تە-رەققىيات سەۋىيىسىگە يەتكۈزۈشنى ، ئاپتونوم رايونىمىز-نىڭ باغۋەنچىلىك ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى خەلقئارا بازارغا يۈزلەندۈرۈپ ، مېۋىچىلىك ئارقىلىق رايونىمىزنىڭ ئىقتى-

سادىي تەرەققىياتنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈشنى مەقسەت قىلدۇ . بۇ مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن ، «مېۋە - چېۋە ماكانى» دەپ نام ئالغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىز 2001 - يىلىدىن باشلاپ ئۆزىنىڭ ئالتۇن دەۋرىدە - گە قەدەم قويدى .

ئاپتونوم رايونلۇق دېھقانچىلىق نازارىتى تەمىنلىگەن سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا (تۆۋەندىكى سان - سىپىرلار «شىنجاڭ ئىقتىساد گېزىتى» نىڭ 2001 - يىل 12 - ئاينىڭ 20 - كۈنىدىكى 953 - سانىدىن ئېلىندى) ، كەلگۈسى بەش يىل ئىچىدە ، شىنجاڭدا مېۋە - ۋىچىلىك بازىسى شەكىللىنىدىكەن . تۇرپان ، ئۈرۈمچى ۋە تەڭرىتېغىنىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى ئىقتىسادىي بەلۋاغ رايونلىرىدا 10 مىڭ مولۇق تاۋار ئۈزۈم بازىسى قۇرۇلىدۇ . كەن ، بايىنغولىن ئوبلاستى ، ئاقسۇ قاتارلىق رايونلاردا 1 مىليون مولۇق تاۋار نەشپۈت بازىسى بەرپا قىلىنىدىكەن . خوتەن ، قەشقەر ، ئاقسۇ رايونلىرىدا 1 مىليون مولۇق تاۋار ئۆرۈك بازىسى بەرپا قىلىنىدىكەن . خوتەن ، قەشقەر ، ئا - تۇش رايونلىرىدا 1 مىليون مولۇق تاۋار ئانار بازىسى بەرپا قىلىنىدىكەن ، خوتەن ، قەشقەر ، ئاقسۇ رايونلىرىدا 500 مىڭ مولۇق تاۋار ياڭاق بازىسى بەرپا قىلىنىدىكەن . بۇنىڭدىن باشقا ، ھەرقايسى ۋىلايەت ، ئوبلاست ، ناھىيە ، شەھەر - لەرنىڭ پىلانى ئاپتونوم رايوننىڭ پىلانىدىنمۇ چوڭراق ئىدەكەن . 2001 - يىل 9 - ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۈرۈمچى يەرمەنكىسىدە ، بايىنغولىن ئوبلاستى 1 مىليون مولۇق نەشپۈت بازىسى قۇرۇشنى ، قاغىلىق ناھىيىسى ياڭاق بازىدە -

سى كۆلۈمنى ئىككى يىل ئىچىدە 400 مىڭ موغا يەتكۈزۈشنى پىلانلىغان .

بۇ پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ، مېۋىلىك دە- رەخلەرنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرىنى تاللاپ تاۋار بازىسى قۇرۇپ ، مېۋىلەرنىڭ سورتىنى ياخشىلاش ، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ، مەھسۇلات مىقدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ . بۇنداق قىلىش ئاپتونوم رايونىمىزدىكى مېۋە - چېۋە پىششىقلاپ ئىشلەيدىغان زاۋۇت - كارخانىلار- نىڭ تەرەققىياتىغا يول ئېچىپ ، مەملىكەت ئىچى ۋە خەلقئارا سودىدىكى رىقابەتتە ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەش ئارقىلىق مېۋە - چېۋە مەھسۇلاتلىرىنىڭ سودىسىنى راۋانلاشتۇرۇپ ، دېھقان - چارۋىچىلارنىڭ كىرىم مەنبەسىنى كېڭەيتىش ۋە خەلق ئىگىلىكى تەرەققىياتىنى يۈكسەلدۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە .

ئاپتونوم رايونىمىز باغۋەنچىلىكىنىڭ ئالتۇن دەۋرىنى كۈتۈۋېلىپ ، مېۋە ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ، جۈملىدىن جايلارنىڭ مېۋىلىك دەرىخەلەرنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرىنى تېز يېتىشتۈرۈپ ، ئىقتىسادىي ئورمان تاۋار بازىسى قۇرۇلۇشىنى مول كۆچەت مەنبەسى بىلەن تەمىنلىشىگە كاپالەتلىك قىلىشى ئۈچۈن ، ئۆزۈمنىڭ ئۇزاق يىللىق ئەمەلىي تەجرىبىسى ۋە باشقىلارنىڭ ئىلغار تېخنىكا - تەجرىبىلىرى يەكۈنلەنگەن نۇرغۇنلىغان ماتېرىياللار ئىچىدىن تاللاپ ، قولىڭىزلاردىكى «مېۋىلىك دە- رەخلەرنىڭ ئەلا سورتلىرىنى تېز يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسى» دېگەن كىتابچىنى تۈزۈپ چىقتىم .

بۇ كىتاب ھەرقايسى جايلارنىڭ «غەربىي رايونىنى ئې-
چىش» تىن ئىبارەت ئىستراتېگىيىلىك تەدبىرنى ئەمەلىي-
لەشتۈرۈش جەريانىدا ، ئېكولوگىيىلىك مۇھىت قۇرۇلۇ-
شى بىلەن باغۋەنچىلىكنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىقتىسادىي
قۇرۇلۇشنىڭ تەرەققىيات تەلپىگە زىچ ماسلىشىپ ، ئاپتو-
نوم رايونىمىزنىڭ كەلگۈسى بەش يىللىق ئىقتىسادىي ئور-
مان تاۋار بازىسى قۇرۇش پىلانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە
مېۋىلەرنىڭ سورت - سۈپەت مەسىلىسىنى ياخشىلاشتا دۈچ
كېلىۋاتقان قىيىن مەسىلىلىرىگە ئەمەلىي پەن - تېخنىكا
ئۇچۇرى ئارقىلىق ياردەم بېرىدۇ . ياڭاق ، بادام ، چى-
لان ، ئۆرۈك ، ئانار ، نەشپۈت ، ئۈزۈم قاتارلىق ئاساسلىق
مېۋىلىك دەرەخ تۈرلىرىنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرىنى
قانداق قىلغاندا تېز ۋە سۈپەتلىك يېتىشتۈرگىلى بولىدۇ ،
دېگەن سوئاللارغا ئەمەلىي پەن - تېخنىكا تەدبىرلىرى ئار-
قىلىق جاۋاب بېرىدۇ .

كىتابتا قىسمەن يېتەرسىزلىكلەر سېزىلسە ، كەسىپ-
داشلار ۋە باغۋەنچىلىك پەن - تېخنىكا خادىملىرىنىڭ ئەمە-
لىيەت جەريانىدا تۈزىتىپ كېتىشىنى ۋە سەمىمىي
تەنقىد - تەكلىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن .

مۇندەرىجە

- 1 كىرىش سۆز
- I باب ئۇرۇق تېرىش ئارقىلىق كۆچەت
- 5 يېتىشتۈرۈش
- 1 . ياغاچنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت
- 5 يېتىشتۈرۈش
- 2 . بادامنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت
- 13 يېتىشتۈرۈش
- 3 . چىلاننىڭ ئۇرۇقى (مېغىزى) نى تېرىپ كۆچەت
- 19 يېتىشتۈرۈش
- 4 . ئۆرۈكنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت
- 31 يېتىشتۈرۈش
- 5 . ئانارنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت
- 36 يېتىشتۈرۈش
- 6 . شاپتۇلنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت
- 45 يېتىشتۈرۈش
- II باب قەلەمچە تەكش ئارقىلىق كۆچەت
- 52 يېتىشتۈرۈش
- 1 . چىلان نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت
- 53 يېتىشتۈرۈش
- 2 . ئانار نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت

- 58 يېتىشتۈرۈش
- 3 . ئەنجۈر نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت
- 68 يېتىشتۈرۈش
- 4 . ئۈزۈم نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت
- 76 يېتىشتۈرۈش
- III باب ئۇلاش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش
- 87 1 . ياڭاق كۆچىتىنى ئۇلاش
- 88 2 . بادام كۆچىتىنى ئۇلاش
- 94 3 . چىلان كۆچىتىنى ئۇلاش
- 98 4 . ئۈزۈم تېلىنى ئۇلاش
- 104 5 . ئۆرۈك كۆچىتىنى ئۇلاش
- 109 6 . نەشپۈت كۆچىتىنى ئۇلاش
- 110 7 . شاپتۇل كۆچىتىنى ئۇلاش
- 118 IV باب مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىنى باشقا ئۆسۈملەر
- 122 بىلەن يېتىشتۈرۈش
- 1 1 . نوتىدا باسقۇرۇش ئارقىلىق كۆچەت
- 122 يېتىشتۈرۈش
- 2 2 . تۈپ ئايرىش ئارقىلىق كۆچەت
- 123 يېتىشتۈرۈش
- 3 3 . توقۇلمىدىن كۆچەت يېتىشتۈرۈش

كىرىش سۆز

مەركەزنىڭ غەربىي رايونى كەڭ كۆلەمدە ئېچىش ئىستراتېگىيىسى ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ مېۋە ئىشلەپچىقىرىشنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا تۈرتكىلىك رول ئوينىماقتا. كۆپ يىللاردىن بۇيان ، ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرىنى يېتىشتۈرۈش ، ئۆستۈرۈش ۋە كېڭەيتىش تېخنىكىسى تېز سۈرئەت بىلەن ئومۇملاشتۇرۇلۇپ ، جايلارنىڭ مېۋە ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىياتىغا پۇختا ئاساس يارىتىلدى ، ھازىر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى ۋىلايەت ، ئوبلاست ، ناھىيە ، شەھەرلىرىدە مېۋە ئىشلەپچىقىرىش كۆلەملىشىش ، بازىلىشىش يولىغا ، باغۋەنچىلىك مەھسۇلاتلىرى تارقالىشىش - رىقابەتلىشىش يۈزلىشىشكە قاراپ يۈزلەندىمەكتە . بۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا جايلارنىڭ مېۋە ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىياتى زور دەرىجىدە ئىلگىرى سۈرۈلۈپ ، باغۋەنچىلىك مەھسۇلاتلىرى ئۆزىنىڭ سۈپەت جەھەتتىن سەرخىللىقى ھەم ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكى بىلەن ئېلىمىزنىڭ ئىچكى بازارلىرى ۋە خەلقئارا بازارلاردا ئۆزىنىڭ رىقابەت جەھەتتىكى ئۈستۈنلۈكىنى نامايان قىلماقتا .

لېكىن ، يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ، بىر قىسىم جايلار

ئۆز رايونىدىكى كەسپىي تارماقلارنىڭ مېۋىلىك كۆچەتلەرنى
ئۆز ئورنىدا يېتىشتۈرۈش ، ئۆز ئورنىدا كارانتىن قىلىش ،
ئۆز ئورنىدا تەكشۈرۈپ نازارەت قىلىشىغا ياخشى ئەھمىيەت
بەرمىگەنلىكتىن ، كۆچەت يېتىشتۈرۈش ، سېتىش ، يۆتە-
كەش ۋە مېۋىلىك باغ بىنا قىلىشتا كۆپلىگەن مەسىلىلەر
ساقلانماقتا . شۇنداق بولغانلىقتىن ، بەزى جايلار ئادەتتە
ئۆز ئورۇنلىرىدا يېتىشتۈرگىلى بولىدىغان بىر قىسىم ئەلا
سورتلۇق مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىنى ھەدىسىلا باشقا را-
يون ۋە ئىچكى ئۆلكىلەردىن يۆتكەپ كىرىپ ، بىر تەرەپتىن
مەبلەغنىڭ سىرتقا ئېقىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارسا ،
يەنە بىر تەرەپتىن ئورمان كېسەللىكى ۋە زىيانداش ھاشا-
راتلارنىڭ ئاپتونوم رايونىمىزدا تارقىلىشىنى كەلتۈرۈپ
چىقارماقتا .

ئەلا سورتلۇق كۆچەتلەرنى ئۆز ئورنىدا يېتىشتۈرگەندە
سىرتتىن كۆچەت يۆتكەپ كەلگەنگە قارىغاندا ، مەبلەغنى
تېجەپ قالغىلى بولۇپلا قالماستىن ، ئەڭ مۇھىمى ، ئۆز
ئورنىدا يېتىشتۈرۈلگەن كۆچەتلەر ساغلام ، ئىشەنچلىك ،
ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك بولۇپ ، كۆچەت مەنبەسىنىڭ
ئۈزۈلۈپ قېلىشىدىن ساقلانغىلى ، كېسەللىك ۋە زىيانداش
ھاشاراتلارنىڭ پەيدا بولۇشىدىن دەل ۋاقتىدا مۇداپىئە كۆر-
گىلى ۋە تەلتۆكۈس يوقاتقىلى بولىدۇ . سۈپەت ئۆلچىمىگە
توشمايدىغان كۆچەتلەرنى ئىشلەپچىقىرىش ئورنىدىلا بىر تە-
رەپ قىلىپ ، كۆرۈلۈش ئېھتىمالى بولغان ئىقتىسادىي زە-
يانىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ . شۇڭا ، جايلار ئۆز ئورنى-
دا ئەلا سورتلۇق كۆچەت يېتىشتۈرۈش بازىسى قۇرۇش

بىلەن بىللە ، يۇقىرى پەن - تېخنىكا ئىقتىدارىغا ئىگە كۆچەتچىلىك ، باغۋەنچىلىك تېخنىكى قوشۇنى يېتىشتۈرۈشكە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىشى ، كۆچەتخانىلارنىڭ ئىلمىي ئۇسۇلدا كۆچەت يېتىشتۈرۈشىگە قۇلايلىق شارائىت يارىتىپ بېرىشى لازىم .

1980 - يىللىرىدىن بۇيان ، كۆپ خىل مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سورتلىرى ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن ئاپتو-نوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا ئارقا - ئارقىدىن يۆتكەپ كېلىنىپ يەرلەشتۈرۈلدى . ھازىر بۇ خىل سورتلارنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىش ، مېغىزنى تېرىش ، قە-لەمچە قىلىش ، تۈپلەندۈرۈش ، ئۇلاش ، توقۇلما ئارقىلىق كۆپەيتىش ، يۇمران نوتىلىرىنى دورا ئارقىلىق يىلتىز تارتقۇزۇش ئۇسۇللىرى بىلەن ئېھتىياجلىق كۆچەتلىرىنى ئۆز ئورنىدىلا ھەل قىلىپ ، مېۋىلىك باغ بىنا قىلىش تەلىپىنى قاندۇرغىلى بولىدۇ . مۇشۇنداق قىلغاندا تۈرلۈك ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرىنى ئىلمىي ئۇسۇلدا كۆپەيتكىلى ۋە كۆچەتلىرىنىڭ تەننەرخىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ ، نەتىجىدە سىرتتىن كۆچەت يۆتكەپ كىرىشنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ . شۇڭا ، ھەرقايسى جايلار ئۆزلىرىنىڭ ئەۋزەل تەبىئىي شارائىتىغا ئاساسەن ، ئۆز ئورنىدا كۆچەت يېتىشتۈرۈش پىرىن-سىپىدا چىڭ تۇرۇپ ، ئۆزلىرى يېتىشتۈرگەن كۆچەتلىرىنى ئىشلىتىپ باغ بىنا قىلىشى ، سىرتتىن ئۆز جايىنىڭ تەبىئىي شارائىتىغا ماس كەلمەيدىغان كۆچەتلىرىنى كۆپلەپ يۆتكەپ كىرىشنى قاتتىق كونترول قىلىشى كېرەك . پەۋ-قۇلئاددە ئەھۋال ئاستىدا سىرتتىن كۆچەت يۆتكەپ كىرىش-

كە توغرا كەلسە ، ئاز يۆتكەپ كىرىپ يەرلەشتۈرۈپ ، كې-
يىن پەيدىنپەي ئۆز ئورنىدا كېڭەيتىش ئارقىلىق ئېھتىياج-
لىق كۆچەت سانىنى تولۇقلاشقا ئىمكانىيەت قالدۇرۇش
لازىم . شۇنداق قىلغاندىلا كۆچەت بازارلىرىنى نازارەت قى-
لىش ، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ ، كۆچەتچىلىكنى غەربىي
رايوننى ئېچىشقا خىزمەت قىلدۇرۇپ ، ئاپتونوم رايونىمىز
باغۋەنچىلىكىنىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنى ھەقىقىي ئۆستۈر-
گىلى بولىدۇ .

I باب ئۇرۇق تېرىش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش

ئۇرۇق تېرىش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش جىنس-لىق كۆپەيتىش ئۇسۇلى بولۇپ ، ئۇ ئەمەلىي قوللىنىلىش تارىخى ناھايىتى ئۇزاق ، قوللانماق ئاسان ، ئاددىي ، ئۈنۈمى ياخشى ئۇسۇلدۇر . بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ياڭاق ، بادام ، پىستە ، ئۆرۈك ، شاپتۇل ، چىلان ، ئانار ، ئالما ، جىگدە ، ياۋا ئامۇت قاتارلىق كۆپ خىل مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىنى يېتىشتۈرگىلى بولىدۇ . ھازىر ئۇرۇق تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئۇسۇلى يېڭى پەن - تېخنىكا ئارقىلىق مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سۈپەتلىرىنى تېز ، سۈپەتلىك ئۆس-تۈرۈپ ، ئىقتىسادىي ئورمان بىنا قىلىشنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇھىم رول ئوينىماقتا .

1 . ياڭاقنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش

سورتلۇق ياڭاقلار تۈپلەر بويىچە تاللاپ يىغىۋېلىنغاندىن كېيىن ، پوستىدىن ئاجرىتىپ 4 — 5 كۈن ئاپتاپتا ، 10 — 15 كۈن ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان سالىقنى جايدا

قۇرۇتۇپ تېرىشقا تەييارلاپ قويۇلىدۇ .

1. ئەلا سورتلۇق ياڭاقنىڭ ئۇرۇقىنى تاللاش

يېڭى پەن - تېخنىكىنى قوللىنىپ ياڭاقنى «ئەلا سۇ - پەتلىك ، يۇقىرى مەھسۇلاتلىق» قىلىپ ئۆستۈرۈش ، نۆ - ۋەتتە ياڭاق ئىشلەپچىقىرىشنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى مۇھىم ۋەزىپىلەرنىڭ بىرى . پەن - تېخنىكىغا تايىنىپ ياڭاقنى ئۇرۇقىدىن تېرىپ كۆپەيتىشنى ئۇلاپ كۆپەيتىش - كە ، ئەنئەنىۋى باشقۇرۇش ئۇسۇلىنى تۈجۈپىلەپ باشقۇ - رۇش ئۇسۇلىغا ، سۈپەتسىز كۆچەت ئىشلەپچىقىرىشنى ئەلا سورتلۇق كۆچەت ئىشلەپچىقىرىشقا ئۆزگەرتىپ ، ياڭاق ئىشلەپچىقىرىشنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش نۆۋەت - تىكى بازار ئېھتىياجىنىڭ جىددىي تەلپى . ئەگەر يېڭى پەن - تېخنىكا ئارقىلىق بۇ مەسىلە ھەل قىلىنسا ، ياڭاق ئىشلەپچىقىرىشنىڭ دەۋرىنى قىسقارتىپ ، مەھسۇلاتى تۆ - ۋەن ، سۈپىتى ناچار ياڭاق دەرەخلىرىنى ئەلا سورتلۇق ، يۇقىرى مەھسۇلاتلىق دەرەخ قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىققىلى بولىدۇ . مۇشۇنداق قىلغاندىلا ياڭاق ئىشلەپچىقىرىشتا بى - رىنچىدىن ، سورت ؛ ئىككىنچىدىن ، سۈپەت ؛ ئۈچىنچى - دىن ، مەھسۇلات ئۆتكىلىدىن ئۆتۈپ ، ئىچكى ۋە خەلقئارا بازارلاردا شىنجاڭ ياڭقىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى نامايان قىل - غىلى ، سۈپىتىنى رىقابەت ئۈستۈنلۈكىگە ئىگە قىلغىلى ، ئىقتىسادىي قىممىتىنى ئۆستۈرۈپ كۆپلەپ تاشقى پېرېۋوت ياراتقىلى بولىدۇ .

ئاپتونوم رايونىمىزدا ئۆستۈرۈلۈۋاتقان ياڭاقلارنىڭ

سورتلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ ، ئۇنىڭ كۆپ قىسمى خوتەن ، قەشقەر ، ئاقسۇ ۋىلايەتلىرىگە تارقالغان . بۇنىڭ ئىچىدە «ئەلا سۈپەتلىك ، يۇقىرى مەھسۇلاتلىق» ياڭاق سورتلىرىمۇ ئاز ئەمەس ، مەسىلەن قەغەز ياڭاق ، خەسە ياڭاق ، تۆشۈك شاكالىق ياڭاق ، ئېسەن ياڭاق ، كۆپ ھوسۇللۇق ياڭاق ، چىلگە ياڭاق ، چوڭ مېۋىلىك ياڭاق ، باشاقسىمان مېۋىلەيدىغان ياڭاق قاتارلىقلار بار . بۇلار بالادۇر مېۋىلەش ، بالدۇر پىشش ، كۆپ مەھسۇلات بېرىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە بولۇپلا قالماستىن ، بەلكى مېۋىسىنىڭ دانىسى چوڭ ، شاكىلى نېپىز ، مېغىزى توق ، ماي تەركىبى يۇقىرى ، مېغىزىنىڭ سۈپىتى ياخشى ، تەمى تاتلىق بولۇشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە . شۇڭا ، بۇلارنى «ئەلا سورت» دەپ ئاتاشقا ، ئۇرۇقنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈشكە ۋە ئۇنىڭدىن نوتا (بخ) ئېلىپ باشقا ناچار سورتلارغا ئۇلاپ كېڭەيتىشكە بولىدۇ .

ئاپتونوم رايونلۇق ئورمانچىلىق نازارىتى 1978 - يىلىدىن 1991 - يىلىغىچە (ئىلگىرى - كېيىن بولۇپ 5 — 6 قېتىم) جەنۇبىي شىنجاڭغا ياڭاق سورتلىرىنى تاللاپ بېكىتىش خىزمەت گۇرۇپپىسى ئەۋەتىپ ، ياڭاق سورتلىرىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈپ چىقتى . ئۇلار شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا بېرىپ تەكشۈرۈش ، سېلىش - تۈرۈش ، باھالاش ، تەتقىق قىلىش ، تاللاش ، بېكىتىش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىپ ، ئەڭ ئاخىرىدا 26 خىل سورتنى شىنجاڭ بويىچە «ئەلا سۈپەتلىك ، يۇقىرى مەھسۇلاتلىق ياڭاق سورتى» دەپ بېكىتتى . بۇلار بالدۇر مېۋىگە كە-

رىش ، كۆپ مېۋە بېرىش ، سۈپەتلىك بولۇشتەك ئورتاق ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە ، بۇنىڭ ئىچىدە «شىنجاڭ مول ھو- سۇللۇق ياڭىقى» ، «ئاقسۇ جام 343 - نومۇر» ، «ئاقسۇ كۈنئەھەر 183 - نومۇر» قاتارلىق ئۈچ خىل سورت ئۆزىنىڭ دانىسى چوڭ ، شاكىلى نېپىز ، مېغىزى سۈپەت- لىك ، مېغىزىنىڭ ماي نىسبىتى يۇقىرى ، ئىرسىيەتچانلىق قى مۇقىم ، ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك ، ئىقتىسادىي قىم- مىتى يۇقىرى بولۇش ۋە بالدۇر مېۋىگە كىرىش ، كۆپ ھوسۇل بېرىش ، بالدۇر پىششىقلىنىش ئىبارەت كۆپ خىل ئالاھىدىلىكلىرىگە ئاساسەن ، نۇقتىلىق كېڭەيتىلىدىغان سورت قىلىپ بېكىتىلگەن ئىدى . ھازىر بۇ ئۈچ خىل سورت شىنجاڭدىلا ئەمەس ، بەلكى پۈتۈن مەملىكەت دائىرى- سىدە زور كۆلەمدە كېڭەيتىلىۋاتىدۇ . بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ، شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا يۇقىرىقى ئۈچ خىل سورتنىڭ ئۇرۇقىنى تاللاپ تېرىش ۋە شۇ خىل سورتلارنى ئۇلاق ئۈستى قىلىپ ئۇلاش ئارقىلىق سۈپەتلىك ، ئەلا سورتلۇق كۆچەتلەرنى يېتىشتۈرۈپ ، ئورمان بىنا قىلىشقا ئىشلىتىش لازىم .

2. ئۇرۇق يىغىش

ئەلا سورتلۇق ياڭاق كۆچتى يېتىشتۈرۈشتە ، ئەلا سۈپەتلىك ، بالدۇر مېۋىلەيدىغان مول ھوسۇللۇق ئېسىل سورتلارنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىش ۋە شۇ تۈپلەردىن نوتا (خىپ- چا ، بخ) ئېلىپ ، ئادەتتىكى ئۇرۇقتىن يېتىشىپ چىققان كۆچەتلەرگە كۆز (بخ) قويۇش قاتارلىق ئۇسۇللار قوللى- دۇ .

نىلىدۇ . ئۇرۇق تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈشتىن ئىلگىرى
 ئۇرۇق يىغىش ، ئۇرۇق تاللاش ، ئۇرۇقنى بىخلاندۇرۇش
 خىزمەتلىرىنى پۇختا ئىشلەش لازىم . ئۇرۇق يىغىشتا يۇقىرىدا
 رىدا نامى ئاتالغان ئەلا سورتلار ئىچىدىن مەھسۇلاتى مول ،
 دانىسى چوڭ ، پوستى نېپىز ، مېغىزى تولۇق پىشقان ،
 ساغلام ئۆسكەن ، كېسەللىك ، زىيانداش ھاشارلارنىڭ
 زىيىنىدىن قۇتۇلغان ئوتتۇرا ياشلىق (40 —
 50 يىللىق) ئەلا تۈپلەرنى ئانا دەرەخ قىلىپ تاللاش كېرەك .
 9 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا (ياڭاقنىڭ مېۋە پوستى
 سارغىيىپ %60 تىن كۆپرەكى مەك بولغاندا) ، مېۋە پوستى
 تى تەبىئىي ھالدا يېرىلغان مەزگىلدە دەرەخ تاجىنىڭ ئوتتۇرا
 ۋە يۇقىرى قىسمىدىكى شاخلاردىن مېۋىلەرنى يىغىۋالسا بولىدۇ ،
 مېۋىلەرنى يىغىپ بولغاندىن كېيىن بىر يەرگە
 دۆۋىلەپ قويماي ، ئۆز ۋاقتىدا پوستىدىن ئاجرىتىپ 4 —
 5 كۈن ئاپتاپقا سېلىپ ، سالىقن جايغا يۆتكەپ تولۇق
 قۇرۇتقاندىن كېيىن ، چىپتا تاغارغا قاچىلاپ سالىقن ئۆيدە
 ساقلاش لازىم .

3 . ئۇرۇقنى بىخلاندۇرۇش

ياڭاقنى كۈز پەسلىدە تېرىشقىمۇ ، ئەتىياز پەسلىدە
 تېرىشقىمۇ بولىدۇ . ئەتىيازدا تېرىلسا ئۈنۈمى ياخشىراق
 بولىدۇ . كۈز پەسلىدە تېرىلسا بىخلاندۇرۇش ھاجەتسىز ،
 ئاق يەرگە تاپ ئېچىپ ئۇرۇق سالغاندىن كېيىن ، كۆمۈپلا
 تولۇق سۈيى قويۇۋەتسە بولۇۋېرىدۇ . لېكىن ، ئەتىيازدا تېرىشقا
 توغرا كەلسە ، ئۇرۇقنى ئالدىن بىخلاندۇرۇپ ، ئاندىن

دىن تېرىش لازىم .
ئۇرۇق تۆۋەندىكى بىرنەچچە خىل ئۇسۇلدا بىر تەرەپ قىلىنىدۇ :

1) سۇغا چىلاپ بىخلىتىش . تېرىشقا تەييارلىغان ياغاچ ئۇرۇقلىرىنى چىپتا تاغارغا قاچىلاپ ئاغزىنى مەھكەم ئەتكەندىن كېيىن ، توشما ، ئازما ياكى ئۆستەڭلەردە ئېقىد- ۋاتقان سۈزۈك ئېقىن سۇغا 10 — 12 كۈن چىلاپ ، ئۇرۇقنىڭ ئۈچ قىسمى يېرىلغاندىن كېيىن تېرىسا بولىدۇ . ئەگەر ئۈچ قىسمى يېرىلمىسا ، يەنە 2 — 3 كۈن سۇغا چىلاپ ، % 60 ئۇرۇق بوردىلىپ ئۈچ قىسمى يېرىلغاندىن كېيىن تېرىسا ، ئۇرۇقنىڭ ئۈنۈپ چىقىش ۋاقتى قىسقا ، كۆكلەش ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ .

2) ئىلمان سۇغا چىلاپ بىخلىتىش . ئۇرۇقنى چوڭ قازان ، داس ، تۇڭ ياكى چوڭ ئىدىش قاچىلارغا تۆكۈپ ، ئۈستىگە 35 — 40 C لۇق ئىلمان سۇ قۇيۇپ ، ياغاچ بىلەن 15 — 20 مىنۇت تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن ، سۇنى تۆكۈۋېتىپ قايتا ئىلمان سۇ قۇيۇلىدۇ . سۇنى ھەر سوتكىدا بىر قېتىم ئالماشتۇرۇپ ، ئۇرۇقنى سوغۇق سۇ بىلەن چايقاپ ، 7 — 8 كۈن سۇغا چىلىغاندىن كېيىن ، يېرىلغانلىرىنى ئىلغاپ ئۇدۇللۇق تېرىسا بولىدۇ .

3) سۇغا چىلاپ ھەم ئاپتاپقا سېلىپ بىخلىتىش . ئۇرۇقنى 8 — 10 كۈن سۇغا چىلاپ سۈزۈۋېلىپ ، 5 — 6 سائەت ئاپتاپقا سېلىپ شاكىلى يېرىلغاندىن كېيىن تېرىسا بولىدۇ .

4) سۇغا چىلاپ ھەم قۇمغا كۆمۈپ بىخلىتىش .

ئۇرۇق 5 — 6 كۈن سۇغا چىلىنىپ ، ئاندىن نەم قۇمغا ئارىلاشتۇرۇلۇپ ، كۈن نۇرى چۈشىدىغان يەردە ياكى ئىسسىق ئۆيدە ساقلىنىدۇ . ھەر كۈنى قۇمغا سۇ چىچىپ ئۇرۇق تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ، قۇمنىڭ نەملىكى ۋە ئىسسىقلىقى نورماللاشقاندىن كېيىن ، ئۇرۇق ئېسىلىپ يېرىلىشقا باشلايدۇ . ئۇرۇقنى قۇمدىن ئايرىۋېلىپ ۋاقتىدا تېرىسا ئۈنۈپ چىقىشى ياخشى بولىدۇ . بۇنىڭدىن باشقا ، ئۇرۇق بىخلاندۇرۇشنىڭ يەنە ئورغا قۇم تۆكۈپ قەۋەتلەپ بىخلاندۇرۇش ، پارنىكتا بىخلاندۇرۇش ، پار ئۆيلىرىدە بىخلاندۇرۇش قاتارلىق بىرقانچە خىل ئۇسۇللىرى بار .

4 . يەر تەييارلاش

ياڭاق تېرىش ئۈچۈن سۇ مەنبەسى مول ، سۈيى راۋان ، تۇپراق قاتلىمى قېلىن ، شور ، تۈز تەركىبى يوق ، كۈن نۇرى تولۇق چۈشىدىغان ، كەلكۈن بېسىپ كەتمەيدىغان ، قۇمساڭ ئەت تۇپراقلىق ياكى مۇنبەت يەرنى تاللاش لازىم . ئۇرۇق ئەتىيازدا تېرىلماقچى بولسا ، تاللانغان يەرگە بۇ يىل كۈز پەسلىدە ھەر موسىغا 5000 كىلوگرام ياخشى چىرىگەن ئورگانىك ئوغۇت تۆكۈپ ، چوڭقۇر ئاغدۇرۇپ توك سۈيى قويۇش كېرەك . ئەتىيازدا توك ئېرىگەندىن كېيىن ، يەرنى يەنە بىر قېتىم چوڭقۇر ، يۇمشاق ئاغدۇرۇپ ، قىرلاپ ، تۈزلەپ ، چۆنەك تارتىپ ، سۇلياۋ يوپۇق يېپىش لازىم .

5 . ئۇرۇق تېرىش

ياڭاق كۈز پەسلىدە 10 - ئايلاردا ، ئەتىياز پەسلىدە

3 - ئاينىڭ ئاخىرى ، 4 - ئاينىڭ باشلىرىغىچە تېرىلسا ئەڭ مۇۋاپىق پەيتتە تېرىلغان بولىدۇ . ئەتىيازدا تېرىشقا توغرا كەلسە ، ئۆسسىغا چۆنەك ئېچىپ ، سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ تېرىغان ياخشى . تېرىشتا ، قۇر (رەت) ئارىلىقىنى 40 — 50 سانتىمېتىر ، تۈپ ئارىلىقىنى 15 — 20 سانتىمېتىر ، چوڭقۇرلۇقىنى 5 — 6 سانتىمېتىر قىلسا مۇۋاپىق بولىدۇ . تېرىش ئۇسۇلى كېۋەز تېرىش ئۇسۇلى بىلەن ئوخشاش بولۇپ ، تۆشۈك ئېچىش ئۈچۈن مەخسۇس سايمان تەييارلاش لازىم . ئۇرۇق ھەربىر تۆشۈككە بىر-بىر دىن ، قىرغىقى (يېرىقى) يەرگە قارىتىپ تېرىلىدۇ . ئۇ-رۇق تېرىلىپ بولغاندىن كېيىن ، ئۈستىگە 4 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا ھۆل توپا تۆكۈپ چىڭدىلىدۇ . ئادەتتە ، 1 مو يەرگە 120 — 140 كىلوگرام ئۇرۇق سېلىنسا بولىدۇ .

6 . پەرۋىش قىلىش

ياڭاق تېرىپ 25 — 30 كۈن ئۆتكەندە ئۈنۈشكە باشلايدۇ . شۇنىڭدىن تارتىپ پەرۋىش قىلىشنى كۈچەيتىش كېرەك . كۆچەت ئۈنۈپ رەسمىي يوپۇرماق چىقىرىپ 15 — 20 سانتىمېتىر بولغاندا ، بىر قېتىم ئاز - ئازدىن ئازوتلۇق ئوغۇت بىلەن ئوغۇتلىنىپ دەرھال سۇغىرىلىدۇ . تېز ئۆسۈش مەزگىلىدە (6 - ئاينىڭ بېشىدىن 8 - ئاينىڭ ئوتتۇرىغىچە) ئىككى قېتىم ئورگانىك ئوغۇت بىلەن ئو-غۇتلىنىپ 3 — 4 قېتىم سۇغىرىپ ، تۈۋى يۇمشىتىلىدۇ . ئوتىنى ئوتاپ ، كېسەللىك ، زىيانداش ھاشارلارنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ . 3 — 4 قېتىم دورا ۋە يوپۇرماق گۆھىرى

چېچىلىدۇ . 8 - ئاينىڭ ئاخىرىدا بىر قېتىم كالىيلىق ئوغۇت بېرىپ كۆچەت تېنىنىڭ ياغاچلىشىشى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ . 9 - ئاينىڭ بېشىدا ئوغۇتلاش ، ئاخىرىدا سۇ-غىرىش توختىتىلىدۇ . ئەگەر كۆچەتلەر مايسا بولغان مەز-گىللەردە قۇرغاقچىلىق ئېغىر ، تېمپېراتۇرا يۇقىرى بولۇپ كەتسە ، كۆچەتلەرنىڭ نابۇت بولۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ، كەچ تەرەپلەردە دورا چېچىش ماشىنىسى بىلەن يوپۇرماق يۈزىگە سۇ پۈركۈش ، قومۇش ، ئوت - چۆپ قاتارلىق نەرسىلەر بىلەن كۆچەتكە سايە چۈشۈرۈپ كۆچەتلەرنىڭ چارلىشىپ كۆيۈپ كېتىشىدىن مۇداپىئە كۆ-رۈش لازىم . شۇ يىلى ئۇرۇقتىن تېرىلغان كۆچەتلەر ئادەت-تە 50 — 60 سانتىمېتىرغا ، ياخشى پەرۋىش قىلىپ باشقۇرۇلسا 70 — 80 سانتىمېتىرغا يېتىدۇ ، كۆ-چەتلەرنى 11 - ئاينىڭ باشلىرىدا كۈزلۈك سۇغى-رىپ ، 20 — 25 - كۈنلىرىدىن بۇرۇن توپا بىلەن كۆمۈپ قىشتىن ئۆتكۈزۈش لازىم . ئىككىنچى يىلى ئەتىيازدا كۆ-مۈكتىن ئاچقاندىن كېيىن ، ياخشى پەرۋىش قىلىپ ، 5 - ئايدا ئۇلاق ئاستى قىلىپ ئەلا سورتلارغا ئۇلىغاندا ، كۆچەت-نىڭ ئېگىزلىكىنى 1.5 — 2 مېتىرغا يەتكۈزگىلى ، سور-تىنى تېخىمۇ ياخشىلىغىلى بولىدۇ .

2. بادامنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ

كۆچەت يېتىشتۈرۈش

1. بادامنىڭ ئەلا سورتلىرىنى تاللاش

بادامنىڭ تۈرى 40قا يېتىدۇ . ئەمما ، مەملىكىتىمىز-

دە يەتتە تۈرى ، شىنجاڭدا ياۋا بادامدىن بىر تۈر ، ئۆستۈ-
رۈلگەن مەدەنىي بادامدىن ئاچچىق بادام ، تاتلىق بادامدىن
ئىبارەت ئىككى تۈر ، ئىچكى ئۆلكىلەردىن كىرگۈزۈلگەن
بادامدىن ئۈچ تۈر بولۇپ ، جەمئىي ئالتە تۈرى بار . ئىككى
خىل مەدەنىي بادامنىڭ يەنە قەغەز بادام ، ئارا شاكاللىق
بادام ، تاش بادام ، شاپتۇل بادام ، ئاچچىق بادامدىن ئىبارەت
ئۆزگەرگەن بەش كەنجى تۈرى ۋە بۇ تۈرلەرگە تەۋە 20
نەچچە خىل سورتى بولۇپ ، بۇلارنىڭ ھەرقايسىسى ئۆزىگە
خاس ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە ، بۇلارنىڭ ئىچىدىن ئۇرۇقنى
تېرىش ۋە ئۇلاش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈلىدىغان ئەلا
سورتلارنى ياخشى تاللاش كېرەك . تاللانغان ئەلا سورتلار
ئىرسىيەتچانلىقى بىرقەدەر مۇقىم ، مەھسۇلاتى يۇقىرى ،
ئۆمرى ئۇزاق ، مېغىزىنىڭ سۈپىتى ياخشى ، شاكىلى نې-
پىز ، ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك ، مەھسۇلاتى مەملىكەت
ئىچى ۋە خەلقئارا بازارلاردا شۆھرەت قازانغان ئەڭ تاخشى
سورتلاردىن بولۇشى لازىم .

ئاپتونوم رايونلۇق پەن - تېخنىكا كومىتېتى
1994 - يىلى ئاپتونوم رايونىمىز بويىچە بادام سورتلىرىنى
تەكشۈرۈپ باھالاش ئارقىلىق 10 خىل بادام سورتىنى «ئەلا
سورت» دەپ تاللاپ بېكىتكەن ، ئۇلار تۆۋەندىكىچە :

1 . كېيىن پىشار مول ھوسۇللۇق بادام (يەكەن

18 - نومۇر) ؛

2 . ئەگرى تۇمشۇق بادام ؛

3 . قوشماق بادام ؛

4. كۆپ مېۋىلىك بادام (يەكەن 2 - نومۇر) ؛
5. قەغەز بادام (يەكەن 1 - نومۇر) ؛
6. قوش مېغىزلىق بادام (يەكەن 9 - نومۇر) ؛
7. چوقۇر بادام ؛
8. كەش بادام ؛
9. سوغۇققا چىداملىق ، مول ھوسۇللۇق بادام ؛
10. خەسە بادام .

بۇلارنىڭ ئىچىدە كېيىن پىشار مول ھوسۇللۇق بادام (يەكەن 18 - نومۇر) ، قوش تۇمشۇق بادام ، قوشماق بادام ، كۆپ مېۋىلىك بادام قاتارلىق سورتلار ئاساسلىق تەكلىپلىدىغان سورتلار ، قەغەز بادام (يەكەن 1 - نومۇر) ، قوش مېغىزلىق بادام (يەكەن 9 - نومۇر) قاتارلىقلار چاڭلاشتۇرغۇچى سورتلاردۇر . بۇنىڭدىن باشقا ، ئۇلارنى رۇقنى تېرىپ كۆپەيتىشكە ، ئۇلاپ كۆپەيتىشكە بولىدۇ . دىغان ئەلا سورتلارنى ئۆز جايىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ تاللاپ بېكىتىش لازىم . ئەلا سورتلارنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرگەندە ، شۇ خىل سورتنىڭ ئىرسىدە يەتچانلىقى كۈچلۈك بولسا ، ئۇنىڭدىن يېتىشىپ چىققان كۆچەتلەر ئەسلىدىكى ئانا تۈپنىڭ سورتى ۋە سۈپىتىنى ساقلاپ قالالايدۇ . ئەگەر ئىرسىيەتچانلىقى ئۆزگىرىشچان ياكى شالغۇتلىشىپ كەتكەن بولسا ، سورتى چېكىنىپ كېتىدۇ . ئەلا سورتلۇق تۈپلەردىن ئۇرۇق يىغىپ تېرىش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرگەندە ، باغ بىنا قىلىنغاندىن كېيىن تۇپراقنىڭ قۇرۇلمىسى ياخشى بولماسلىق ، تۈپ-

راق ، سۇ ، ھاۋا شارائىتىغا ماسلىشالماسلىق ، بېقىش - باشقۇرۇشقا ئەھمىيەت بەرمەسلىك قاتارلىق تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىنمۇ سورتلاردا چېكىنىپ كېتىش ، مەھسۇلاتى تۆۋەنلەپ كېتىش ، ھەتتا چېچەكلەپ مېۋە بەرمەسلىكتەك ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ . شۇڭا ، بىرىنچىدىن ، ئەلا سورتلۇق بادامنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش ؛ ئىككىنچىدىن ، ئۇنىڭغا يەنە شۇ خىل ئەلا سورتلارنى ئۇلاش ؛ ئۈچىنچىدىن ، ئاچچىق بادام ، شاپتۇل بادام ، قېلىن پوستلۇق بادامنىڭ ئۇرۇقى تېرىپ يېتىشتۈرۈلگەن 1 — 2 يىللىق كۆچەتلەرگە ئەلا سورتلارنى بىخ ئۇلاق قىلىپ ئۇلاش ئارقىلىق ئەلا سورتلۇق كۆچەتلەرنى يېتىشتۈرۈش لازىم .

2. بادامنىڭ ئۇرۇقىنى بىر تەرەپ قىلىش

ئەلا سورتلۇق بادام ئۇرۇقىنىڭ پوستى نېپىز ، سۇ سۈمۈرۈشى تېز بولغاچقا ، ئۇنى بىخلاندۇرۇش ئۈچۈن يا-ڭاق ، ئۆرۈك ، شاپتۇل ، تاش بادام ، شاپتۇل بادام قاتارلىقلارغا ئوخشاش مۇرەككەپ مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش كەتمەيدۇ ، سورتلۇق بادام ئۇرۇقىنى كۈزدە تېرىغاندا بىر تەرەپ قىلمىسىمۇ بولىدۇ ، لېكىن ئەتىيازدا تېرىغاندا تېرىشتىن ئىلگىرى بىخلاندۇرۇپ ئاندىن تېرىلىدۇ . ئادەتتە تېرىلىدىغان بادام ئۇرۇقلىرى تېرىشتىن بىر ئاي بۇرۇن سورتلار بويىچە ئىسسىق سۇغا چىلىنىدۇ . نېپىز شاكاللىق بادام 4 — 5 كۈن ، ئارا شاكاللىق بادام 10 — 11 كۈن

ئەتراپىدا سۇغا چىلانسا بولىدۇ . ئۇرۇقلار سۇغا تويۇنغاندىن كېيىن ، سۇدىن سۈزۈۋېلىنىپ ، بىر قەۋەت قۇم ، بىر قەۋەت ئۇرۇق ، بىر قەۋەت ئات قىغى تۆكۈپ قەۋەتلەپ بىخلاندۇرۇلىدۇ ، قەۋەتلەپ بىخلاندۇرۇش مەشغۇلاتى پار-نىكتا ياكى سىرتتا ئورەك كولاش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ . پارنىك ئىچىدىكى ئورەككە 10 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا ئات قىغى ، ئۇنىڭ ئۈستىگە 15 — 20 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا نەم قۇم تۆكۈپ ، ئاندىن ئۈستىگە ئۇرۇقنى تۆكۈپ ، ئىككى كۈندە بىر قېتىم سۇ چېچىپ تۇرسا ، ئۇرۇق 20 — 25 كۈندە بىخلىنىدۇ ، ئۇنىڭدىن كېيىن ، ئۇرۇقنى ئايرىۋېلىپ تېرسا بولىدۇ .

3. ئۇرۇق تېرىش

بادامنىڭ قېلىن پوستلۇق سورتلىرى كۈزدە تېرىلسا كۆكلەش ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ ھەم ئۇنى بىخلاندۇرۇش ھاجەتسىز . يۇمشاق پوستلۇق ، قەغەز شاكالىق ، ئارا شا-كالىق سورتلىرى بىخلاندۇرۇش ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىن ئاسان ئۈنگەچكە ، ئۇنى ئەتىيازدا تېرىسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ . ئەتىيازدا (4 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا) تۇپراقنىڭ تېمپېراتۇرىسى 14 — 15 C ئەتراپىدا ئىسسىقلىقتىن كېيىن ، قۇر ئارىلىقىنى 40 — 50 سانتىمېتىر ، تۇپ ئارىلىقىنى 8 — 10 سانتىمېتىر قىلىپ تاپ ئېچىپ ، ئۇرۇق سالغاندىن كېيىن ، ئۈستىنى 3 — 5 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا كۆمسە بولىدۇ ،

بىخلىاندۇرۇلغان ئۇرۇق نەم پېتى تېرىلسا ، 10 — 20 كۈندە ئۈنۈپ چىقىدۇ .

4 . پەرۋىش قىلىش

بادام ئۈنۈپ چىققاندىن كېيىن كۆچەتلەرنىڭ پەرۋىشلىنىشىنى ياخشى ئىشلەش لازىم . مايسا ئۈنۈپ چىقىپ 20 — 25 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ، ھەر 15 — 20 كۈندە بىر قېتىم سۇغىرىپ ، توپىسىنى يۇمشىتىش ، ئوت - چۆپلەرنى ئوتاپ ئېلىۋېتىش لازىم . يەر ئاستى سۈيى نىسبەتەن يۇقىرى بولغان جايلاردا كۆچەتلەرنى بىر يىلدا 5 — 7 قېتىم ، قۇمساڭ ئەت تۇپراقلىرىغا تېرىلغان كۆچەتلەرنى 8 — 10 قېتىم سۇغارسا بولىدۇ . ھەر قېتىم سۇغىرىلغاندىن كېيىن ، تۇپراقنىڭ نەملىكىنى ساقلاپ ، كۆچەتلەرنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ، كۆچەتلەرنىڭ تۈۋىنى چاناپ بوشىتىپ تۇرۇش ھەمدە قوشۇمچە ئوغۇتلاپ كۆچەتلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش شارائىتىنى ياخشىلاش لازىم . بادام كۆچەتلىرىنى 5 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن 8 - ئاينىڭ باشلىرىغىچە 2 — 3 قېتىم قوشۇمچە ئوغۇتلاش ، بىرىنچى قېتىمدا 1 مو يەرگە 700 — 800 كىلوگرام ياخشى چىرىگەن قوي قىغى ، 5 — 6 كىلوگرام ئازوتلۇق ئوغۇتنى تاپ ئېچىپ بېرىش ؛ ئىككىنچى ، ئۈچىنچى قېتىمدا ئوغۇتنىڭ مىقدارى ۋە تۈرىنى كۆپەيتىپ قوشۇمچە ئوغۇت بېرىش لازىم . بۇ مەزگىللەردە 1 مو يەرگە 5 كىلوگرام ئازوتلۇق ئوغۇت ، 7 كىلوگرام فوسفورلۇق ئو-

غۇت ، قوي قىغى ، كۈنجۈرە ، توخۇ - كەپتەر مايىقى قاتار -
 لىقلارنى مۇۋاپىق نىسبەتتە ئارىلاشتۇرۇپ ئوغۇتلاش ، ئو -
 غۇتلاپ بولغاندىن كېيىن ۋاقتىدا سۇغىرىش لازىم . 3 -
 قېتىم ئوغۇتلىغاندا ئازوتلۇق ئوغۇتلارنى توختىتىپ ، فوس -
 فورلۇق ، كالىيلىق ئوغۇتلار بىلەن ئوغۇتلاپ كۆچەتلەرنىڭ
 توملۇقىنى ئاشۇرۇش ، ئۈچ قىسمىنىڭ ياغاچلىشىشىنى
 ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك . كۆچەتلەرنى 9 - ئاينىڭ ئاخىر -
 لىرىدىن باشلاپ سۇغىرىشنى توختىتىش ، ئۇششۇپ كېتىش
 ئەھۋاللىرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ، توك ياتقۇزۇش ، ئىس
 قويۇش ، پاخال ، ئوت - چۆپ يېيىش ، كۆمۈش قاتارلىق
 تەدبىرلەرنى قوللىنىش كېرەك .

3. چىلاننىڭ ئۇرۇقى (مېغىزى) نى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش

1. چىلاننىڭ ئەلا سورتلىرىنى تاللاش
 ئاپتونوم رايونىمىزدا يەرلىك چىلان سورتلىرى -
 9 - 10 خىل ، ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەلتۈ -
 رۇپ يەرلەشتۈرۈلگەن سورتلاردىن 30 — 40 خىل چىلان
 سورتى بولۇپ ، بۇلار سۈپەت ، تەم ، ئىشلىتىلىش جەھەتتە
 ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىككە ئىگە ، بۇلارنىڭ ئىچىدىن دانە -
 سى چوڭ ، ئېتى قېلىن ، پوستى نېپىز ، قەنت تەركىبى
 يۇقىرى ، چۈرۈك ، ئېلاستىكىلىقى ياخشى ، ھۆل پېتى ئىس -

تېمال قىلىشقىمۇ ، قۇرۇق ئىستېمال قىلىشقىمۇ بولىدۇ .
غان ئەلا سورتلارنى تاللاش لازىم . لېكىن ، بۇ سورتلارنىڭ
ئىچىدە مېغىزى چىقىدىغان سورتلار ناھايىتى ئاز ، مېغىزى
چىقىدىغان سورتلارنىڭمۇ مېغىز چىقىش نىسبىتى تۆۋەن ،
بەزى سورتلار ئۇرۇقسىز ، يەنە بەزى سورتلارنىڭ مېغىزى
تويۇنمىغان (پۇچەك) . شۇڭا ، سورتلارنى ياخشى تاللاپ ،
مېغىزنى تېرىپ كۆپەيتىشكە بولىدىغانلىرىنى مېغىزنى
تېرىپ كۆپەيتىش ، ئۇرۇقنى تېرىپ كۆپەيتىشكە بولىدۇ .
غانلىرىنى ئۇرۇقنى تېرىپ كۆپەيتىش ، ئۇلاش ئارقىلىق
كۆپەيتىشكە بولىدىغانلىرىنى ئۇلاپ كۆپەيتىش كېرەك .
1 . ئىچكىرى ئۆلكىلەرنىڭ مېغىزنى تېرىپ كۆپەيتىش .

تىشكە بولىدىغان ئەلا سورتلىرى

ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كىرگۈزۈلىدىغان ، مېغىزنى
تېرىپ كۆپەيتىشكە بولىدىغان ئەلا سورتلاردىن نەشپۈتسە-
مان چىلان ، دۇنخۇاڭ چىلىنى ، شياڭفېن يۇمىلاق چىلى-
نى ، شاڭزاۋ چىلىنى ، لاڭزاۋ چىلىنى ، قىشلىق چىلان
(ئالمىسىمان چىلان) ، زەنخاڭ چوڭ چىلىنى ، چۈنزۇ
چىلىنى قاتارلىقلار بار . بۇ خىلدىكى سورتلارنىڭ ساپ
مېغىز چىقىش نىسبىتى 20 — 60% بولۇپ ، ئۈنۈش
نىسبىتى تېخىمۇ تۆۋەن ، ئۆسۈپ يېتىلىشى ئاستا بولغاچقا ،
ئۇرۇق ، ئەمگەك كۈچى ۋە يەر ئىسراپ بولۇپ كېتىدۇ .
شۇڭا ، ئەڭ ياخشىسى مېغىزنى چىقىرىپ تېرىش كېرەك .
يۇقىرىقى ئەلا سورتلار مېغىزنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈر-
گەندىن كېيىن ، ئەسلىي سورتنىڭ خۇسۇسىيىتىنى ساقلاپ

قالىدۇ ، بۇ خىل كۆچەتلەرنى قايتا ئۇلاش ھاجەتسىز .
2 . مېغىزنى تېرىپ كۆپەيتىشكە بولىدىغان يەرلىك

سورتلار

بۇ خىل سورتلاردىن شىنجاڭ سوقا چىلىنى (قەشقەر ،
ئاقسۇ ۋىلايەتلىرىگە تارقالغان) ، قەشقەر چىلىنى (مېغىزى
تويۇنغان ، مېغىز چىقىش نىسبىتى 88 — 90%) ، كوند-
شەھەر چىلىنى (مېغىزى تويۇنغان ، مېغىز چىقىش نىسبى-
تى 90%) ، قۇمۇل چىلىنى (ئۇرۇقى كىچىك ، مېغىز
چىقىش نىسبىتى تۆۋەنرەك) قاتارلىقلار بار .

بۇ سورتلارنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈ-
رۈشكە ، مېغىزنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈشكەمۇ يا-
كى ئۇلاق ئاستى قىلىپ باشقا ئەلا سورتلارنى ئۇلاپ كۆچەت
يېتىشتۈرۈشكەمۇ بولىدۇ . ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يې-
تىشتۈرۈشكە توغرا كەلسە ، ئالدى بىلەن بىخلاندۇرۇپ
ئاندىن تېرىش لازىم .

3 . ئۇرۇقىنى تېرىپ ئۇلاق ئاستى قىلىدىغان سورتلار
شىنجاڭ باغ چىلىنى (يۇمىلاق كىچىك چىلان) . جە-
نۇبىي شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارقالغان بولۇپ ،
مېۋىسى كىچىك ، تەمى تاتلىق ، ئۇرۇقى چوڭ ، مېغىزى
توق ، مېغىز چىقىش نىسبىتى 95 — 98% . ئۇنىڭ مېغى-
زىنى تېرىش ھاجەتسىز ، ئۇرۇقىنى بىخلاندۇرۇپ تېرىپ
كۆچەت يېتىشتۈرگەندىن كېيىن ، ئەلا سورتلارنى ئۇلاشتا
ئۇلاق ئاستى قىلىنىدۇ .

ياۋا چىلان (ئاچچىق چىلان) . چۈچۈمەل چىلان دەپمۇ

ئاتىلىدۇ ، دۆلىتىمىزنىڭ «ئۈچ شىمالىي رايونى» غا تار-
قالغان غوللۇق چاتقال دەرەخ بولۇپ ، مېۋىسى كىچىك ،
تەمى چۈچۈمەل ، ئۇرۇقى چوڭ ، مېغىزى ئۇششاق ، مېغىز
چىقىش نىسبىتى 95 — 96% .ياۋا چىلاننىڭ مېۋىسىنى
يېگىلى بولمايدۇ ، مېغىزى دورىگەرلىك سانائىتىدە ، مىللىي
تېبابەتچىلىك ۋە جۇڭگو تېبابەتچىلىكىدە دورا قىلىنىدۇ .
ئۇرۇقى ياكى مېغىزىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئار-
قىلىق سورتلۇق چىلاننىڭ ئۇلاق ئاستى قىلىشقا بولىدۇ .

2. چىلاننىڭ ئۇرۇقىنى ئېتىدىن ئايرىش
تېرىپ كۆپەيتىشكە بولىدىغان چىلاننىڭ ئەلا سورتلى-
رى تەكشۈرۈپ بېكىتىلگەندىن كېيىن ، ئۇرۇقى مېۋە ئې-
تىدىن ئاجرىتىۋېلىنىدۇ . ئۇرۇقنى مېۋە ئېتىدىن ئاجرد-
تىشتا ، ئالدى بىلەن چىلان پاكىز يۇيۇپ بورىغا يېيىپ
قۇرۇتۇلىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ، ئۇرۇق مېۋە ئېتىدىن
پىچاق بىلەن بىر - بىرلەپ ئاجرىتىۋېلىنىدۇ . مېۋە ئېتى
مۇراببا ، شەربەت تەييارلاشقا ياكى قۇرۇق ئىستېمال قى-
لىشقا ئىشلىتىلىدۇ . ئەگەر ئېتى كېرەكسىز دەپ قارالسا ،
ئۇرۇقى ئاجرىتىۋېلىنماقچى بولغان چىلانلارنى سېمونت
كۆلچەك ، داس ، كوزا ياكى تېگىگە سۇلياۋ سېلىنغان ئورد-
غا تۆكۈپ ، 50 — 60°C لۇق قىزىق سۇغا 1 سوتكا چىلاپ ،
ئۈستىنى باسقۇرۇپ قويسا ئېتى يۇمشايدۇ . بۇ چاغدا سىم
تور ، تەڭكەش قاتارلىق سايمانلارنىڭ ياردىمى بىلەن ئۇرۇق-
نى ئېتىدىن ئاجرىتىۋالغىلى بولىدۇ . ئۇرۇقنى ئېتىدىن

ئاجرىتىۋالغاندىن كېيىن ، پاكىز يۇيۇپ بورىغا يېيىپ قۇ-
رۇتۇپ ، چېپتا تاغارغا قاچىلاش لازىم .

3. چىلاننىڭ مېغىزىنى چىقىرىش

ئىچكىرىنىڭ سورتلۇق چىلانلىرىنىڭ مېغىز چىقىش
نەسبىتى 20 — 60% بولغاچقا ، ئادەتتە 1000 تال ئۇرۇق-
تىن 200 — 600 تال سۈپەتلىك مېغىز ئالغىلى بولىدۇ .
مېغىز چىقىش نەسبىتى 50 — 60% بولغان سورتلار
ئىچىدىن 100 كىلو قۇرۇق چىلاندىن 18 — 20 مىڭ تال
مېغىز ئالغىلى بولىدۇ . بۇ 2 مو يەرگە تېرىپ كۆچەت
يېتىشتۈرۈشكە يېتىدۇ . مېغىز چىقىش نەسبىتى
40 — 50% بولغان سورتلاردىن 14 — 17 مىڭ تال ،
40% تىن تۆۋەن بولغان سورتلاردىن ئاز دېگەندەمۇ
10 — 12 مىڭ تال مېغىز ئالغىلى بولىدۇ . چىلان ئۇرۇقى
يۇيۇپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇش داۋامىدا ئاسان كالىئەكلەشۋالىد-
ۇ . بۇ چاغدا ياغاچ كالىئەك ، توقماق قاتارلىقلار بىلەن
يېنىك سوقۇپ ، ئۇرۇقنى بىر - بىرىدىن ئاجرىتىپ ، ئام-
بۇر ياكى يېنىكەرەك تۆمۈر ئەسۋابلار ئارقىلىق ئۇرۇقنى
بىر - بىرلەپ چېقىپ ، مېغىزىنى ئېلىش كېرەك . بىر
ئادەم بىر كۈندە 800 — 1000 تال مېغىز ئايرىيالايدۇ .
مېغىزنىڭ زېدە بولۇپ قالغانلىرى ئۈنمەيدۇ . شۇڭا ، زە-
خىملەنگەن مېغىزلارنى شاللاپ چىقىرىۋېتىپ ، قالغان ساپ
ئۇرۇقنى رەخت خالىتىغا قاچىلاپ ، تېرىش مەزگىلى يېتىپ
كەلگۈچە سالىقىن ، سوغۇق يەردە ساقلاش كېرەك .

4. مېغىزنى پارنىكقا تېرىپ كۆچەت

يېتىشتۈرۈش

1. يەر تەييارلاش

پارنىكتا مېغىز تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ، ئالدى بىلەن تۇپرىقى مۇنبەت ، سۈيى راۋان ، كۈن نۇرى تولۇق چۈشىدىغان يەرنى تاللاپ ، چوڭقۇر ، يۇمشاق ئاغدۇ-رۇش كېرەك . ياخشى چىرىگەن ، سۈپەتلىك قوي قىغىدىن 1 مو يەرگە 25 — 30 تاغار تۆكۈپ ، پارنىك جازىلىرىنى شەرقتىن غەربكە قارىتىپ ، 2 - ئاينىڭ 20 - كۈنلىرىدىن بۇرۇن قوراشتۇرۇپ چىقىش لازىم . 2 - ئاينىڭ 22 - ، 23 - كۈنلىرى يەرنى ئوسا قىلىپ ، 26 - ، 27 - كۈنلىرى پارنىك ئۈستىنى سۇلياۋ بىلەن يېپىش (پارنىكنىڭ كەڭلىكى سۇلياۋنىڭ كەڭلىكى بويىچە بولسا بولۇۋېرىدۇ) ، 3 - ئاينىڭ 1 - كۈنىدىن 5 - كۈنىگىچە مېغىزنى تېرىپ بولۇش لازىم .

2. مېغىز تېرىش

پارنىك ئۈستى يېپىلغاندىن كېيىن ، پارنىكنىڭ تېمپېراتۇرىسى پەيدىنپەي ئۆرلەپ ، تېرىشقا شارائىت يارىتىدۇ . پارنىك ئىچىدە ئازادە مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ، پارنىك ئوتتۇرىسىنىڭ ئېگىزلىكى 2 مېتىردىن ، ئىككى ياقىسىنىڭ ئېگىزلىكى 80 سانتىمېتىردىن تۆۋەن بولماسلىقى ، پارنىكنىڭ ئۈستى ھەر 2 مېتىردا ئارقان بىلەن ئىككى يان تەرەپكە مەھكەم تارتىلىشى كېرەك . بۇ ،

بوراندىن مۇداپىئە كۆرۈشكە پايدىلىق . ئوسا قىلىنغان يەر
 يۇمشاق ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن (پارنىك كۆلىمى كىچىك-
 رەك بولسا كەتمەن بىلەن چاناپ يۇمشىتىلسىمۇ بو-
 لىدۇ) ، يەر ئاستى زىيانداش ھاساراتلارنىڭ زىيان سېلىد-
 شىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ، لازا ، تاماكا ، ئابدىمىلىك يو-
 پۇرمىقىدىن تەييارلانغان پاراشوكسىمان دورىلارنى چې-
 چىپ ، ئاندىن تارماقنىڭ كەينى بىلەن تەكشى تۈزلەش
 كېرەك . پارنىكنىڭ كەڭلىكى سۇلياۋنىڭ كەڭلىكىگە ئاسا-
 سەن بەلگىلەنسە (ئەڭ ياخشىسى 5.5 — 11 مېتىرغىچە
 بولسا) ، پارنىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى كۆچەت يېتىشتۈرۈش پە-
 لانلانغان يەرنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەنسە بولىدۇ . پار-
 نىكا تەييارلانغان يەر تەكشى تۈزلىنىشى ، ئېتىزلارنىڭ
 ئېگىز - پەسلىك پەرقى 2 — 3 سانتىمېتىردىن ئېشىپ
 كەتمەسلىكى ، قىرلار پەس ھەم تۈز سېلىنىشى لازىم .
 پارنىك ئىچىدىكى يەرلەر تەلەپكە لايىق تەكشى تۈزلىد-
 ىپ ، قىرلار سېلىنىپ بولغاندىن كېيىن ، شەرقتىن
 غەربكە بويلاپ تاناپ تارتىپ ، قۇر ئارىلىقىنى 30 سانتىم-
 ىتىر قىلىپ ، ئاكۇشنا بىلەن 1.5 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا
 تاپ ئېچىلىدۇ . مېغىزنى 4 — 5 سائەت سوغۇق سۇغا
 چىلىنغاندىن كېيىن ، سۇدىن سۈزۈۋېلىپ ، ئېچىلغان تاپ
 ئىچىگە ھەر 10 — 12 سانتىمېتىرغا بىر تالدىن ئۇرۇق
 سېلىش ، ئۇرۇقنىڭ چوڭقۇرلۇقى 1.5 سانتىمېتىردىن ئې-
 شىپ كەتمەسلىك ، ئۇرۇق سېلىنىپ بولغاندىن كېيىن
 تارماقنىڭ كەينى بىلەن تەكشى تۈزلەپ ، تاپ بويىچە يېنىك

دەسسەپ چىڭداش لازىم . پارنىك تېمپېراتۇرىسى بىلەن نەملىكىنى ياخشى ماسلاشتۇرۇپ ، تېمپېراتۇرىنى پەيدىد - پەي ئۆرلىتىش ، ئۇرۇق ئۈنۈپ مايسا بولغاندىن كېيىن ، تۆۋەن تېمپېراتۇرىنى 25°C تىن چۈشۈرۈۋەتمەسلىك ، ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرىنى 38°C تىن ئاشۇرۇۋەتمەسلىك كې - رەك . 5 - ئايدىكى پارنىك تېمپېراتۇرىسى $35^{\circ}\text{C} - 38^{\circ}\text{C}$ ئەتراپىدا بولسا ۋە مۇشۇ مەزگىلدە يۇقىرى تېمپې - راتۇرا $15 - 20$ كۈنگىچە مۇقىم بولسا ، مايسىنىڭ ئۆ - سۈپ يېتىلىشى تېز بولىدۇ . پارنىك ئىچىنىڭ تېمپېراتۇ - رىسى ئۆرلىگەنسېرى پار تامچىلىرى سۇلياۋنىڭ يۈزىگە يېپىشىۋالىدۇ . ھەر كۈنى ئەتىگەن - كەچلەردە پارنىك ئۈستىنى يېنىك نەرسىلەر بىلەن ئۇرۇپ پار تامچىلىرىنى چۈشۈرۈۋېتىش كېرەك .

3 . پەرۋاش قىلىش

پارنىك ئىچىنىڭ نەملىكى ۋە تېمپېراتۇرىسى نورمال بولسا ، ئۇرۇق تېرىلغان كۈندىن ھېسابلىغاندا $15 - 18$ كۈندە ئۈنۈپ چىقىشقا باشلايدۇ . ئۇرۇق تېرىلىپ 30 كۈن بولغاندا ئۇرۇقنىڭ $70\% - 80\%$ ى ئۈنۈپ تۇپراق ئۈستىگە چىقىپ بولىدۇ . مېغىزنىڭ 1.5 سانتىمېتىردىن يۇقىرى كۆمۈلۈپ قالغانلىرى 4 - ، 5 - ئايلاردىمۇ ئۈنۈپ چىقىدۇ . ئۇرۇق تېرىلىپ $25 - 30$ كۈنگىچە تۇپراقنىڭ نەملىكى يوقىلىپ ، مايسىلارنى قۇرت كېسىۋېتىش ياكى ئۇسساپ قېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە ، سۈزۈك سۇ بىلەن نېپىز سۇغىرىش كېرەك . بۇ تېخى تولۇق ئۈنىمگەن ئۇرۇقلارغا

نىسبەتەن ئەكس تەسىر كۆرسەتمەيدۇ . سىرتقى مۇھىتنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ ، 36 — 38°C تىن ئاشقاندا ، ئالدى بىلەن پارنىكنىڭ شىمالىي قىسمىنى ھەر كۈنى كەچتە ئاز - ئازدىن ئېچىۋېتىپ ، مايسىلار سىرتقى مۇھىتنىڭ تېمپېراتۇرىسىغا ماسلىشىپ بولغاندىن كېيىن ، سۇلياۋنى بىراقلا ئېلىۋېتىش كېرەك . سۇلياۋنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن ، 15 — 20 كۈندە بىر نۆۋەت سۈزۈك سۇ بىلەن سۇغىرىپ ، ۋاقتىدا چاناپ تۇۋىنى يۇمشىتىش لازىم . كۆچەت 15 — 20 سانتىمېتىردىن ئاشقاندا ئىككى رەتنىڭ ئوتتۇرىسىدىن تاپ ئېچىپ ، ئازوتلۇق ئوغۇت بىلەن ئاز - ئازدىن قوشۇمچە ئوغۇتلاش ، ئىككىنچى ، ئۈچىنچى قېتىمدا سۆڭەك پاراشوكى ، قارا ئوغۇت ، كۈنجۈرە ، قوي قىغى ، گەندە ، توخۇ - كەپتەر مايىقى قاتارلىقلار بىلەن قوشۇمچە ئوغۇتلاپ (ئوغۇتنىڭ مىقدارىنى كۆچەتنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ مۇۋاپىق كۆپەيتىش ۋە مۇۋاپىق تەڭشەش كېرەك) ، 8 - ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ئوغۇتلاشنى ، 9 - ئاينىڭ 20 - كۈنلىرىدىن كېيىن سۇغىرىشنى توختىتىش لازىم . 11 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بىر قېتىم سۇغىرىپ تولق ياتقۇزۇش كېرەك . 7 - ئايدا چىلان كۆچەتلىرىنىڭ ئاساستىنقى قىسمىدىكى شاخ - پۇتاقلىرىنى قاچا بىلەن كېسىپ ئېلىۋېتىپ ھاۋا ئالمىشىشقا شارائىت يارىتىپ بېرىش كېرەك . كۆچەتلەر مايسا مەزگىلىدە 4 — 5 كۈندە بىر قېتىم دورا پۈركۈپ ھاساراتلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە يوقىتىش لازىم .

5. مېغىزنى ئوچۇقچىلىققا تېرىپ كۆچەت يې-

تىشتۇرۇش

ئەلا سورتلۇق چىلان مېغىزنى تېرىپ ئوچۇقچىلىقتا كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئۇسۇلى ئاددىي ، مەشغۇلات تەرتىپى ئاز ، چىقىمى تۆۋەن ، ئۈنۈمى ياخشى بولغان تەدبىرلەرنىڭ بىرى بولۇپ ، ئۇ دۆلەت ، كوللېكتىپ ، شەخسىي كۆچەتخا-نلارنىڭ قوللىنىشىغا باب كېلىدۇ .

1. يەر تەييارلاش

ئوچۇقچىلىقتا مېغىز تېرىپ چىلان كۆچىتى يېتىشتۈ-رۈش ئۈچۈن ، كۈن نۇرى يېتەرلىك ، سۈيى راۋان ، تۇپرىق مۇنبەت ياكى شور تەركىبى بولمىغان قۇمساڭغۇ ئەت تۇپراقلىق يەرلەرنى تاللاش لازىم . تەييارلانغان يەرلەرنىڭ تەكشىلىكى ياخشى بولۇشى ، چوڭقۇر ، يۇمشاق ئاغدۇرۇل-غان ، سۈپەتلىك تۈزلەنگەن ، قىرلىرى تۈز سېلىنغان ، ئوت - چۆپ يىلتىزلىرى ۋە ئەخلەتلەر پاكىز تازىلانغان بولۇشى كېرەك . چىلان مېغىزى يالىڭاچ ھالەتتە بولغاچقا ، تېرىلغاندىن كېيىن ، قۇرت - ھاشارلارنىڭ زىيىنىغا ئا-سان ۋە كۆپ ئۇچرايدۇ . شۇڭا ، ئالدىنقى يىللىرى سەي - كۆكتات تېرىغان يەرلەرنى تاللىماسلىق كېرەك . ئالدى بىلەن تۇپراقنى ياغاچ كۆمۈر كۈلى ، تاماكا توپىسى ۋە باشقا خىمىيىلىك دورىلار ئارقىلىق دېزىنفېكسىيە قىل-غاندىن كېيىن ، ياخشى چىرىگەن سۈپەتلىك قوي قىغىدىن 30 تاغار ئەتراپىدا تۆكۈپ ، يەرنى يۇمشاق ئاغدۇرۇپ ،

ئاندىن تەكشى تۈزلەپ ئوسا قىلىش لازىم .

2 . مېغىز تېرىش

يەر ئوسا قىلىنغاندىن كېيىن ، قايتا ئاغدۇرۇلۇپ ، تەكشى تۈزلەپ 110 سانتىمېتىر كەڭلىكتە چۆنەك ئېچىلد . دۇ . چۆنەكنىڭ ئۈستى تەكشى چىڭداغاندىن كېيىن ، كەڭ ئەنلىك (1.20 مېتىرلىق) سۇلياۋ يوپۇق يېپىلىدۇ . يوپۇق ئۈستىدىن تاناپ تارتىپ ، قۇر ئارىلىقىنى 35 سانتىمېتىر قىلىپ ئۈچ قوش قۇر ، 60 سانتىمېتىر قىلىپ بىر تاق قۇر ئېلىپ مەخسۇس تەييارلانغان سايمان بىلەن تۆشۈك ئېچىلىدۇ . ئۇرۇق (مېغىز) نى تېرىش ۋاقتى 4 - ئاينىڭ 15 - كۈنىدىن 25 - كۈنىگىچە بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ . ئۇرۇقنى ئىلماق سۇغا 4 — 5 سائەت چىلاپ سۈزۈۋېلىپ ، تۈپ ئارىلىقى 10 — 12 سانتىمېتىر ، چوڭقۇرلۇقى 1.5 سانتىمېتىر قىلىپ تېشىلگەن ھەربىر تۆشۈككە بىر تالدىن سېلىپ ، تۆشۈك ھۆل توپا بىلەن كۆمۈلىدۇ . تېرىش ئۇسۇلى ئادەتتە كېۋەز تېرىش ئۇسۇلىغا ئوخشاش بولۇپ ، بۇنداق ئۇسۇلدا تېرىلغان مېغىز ئاساسەن 5 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىغىچە تەكشى ئۈنۈپ بولىدۇ ، لېكىن بۇ مەزگىلدە ، تۇپراق ئاستىدىن يەر يولۇپسى ، ماي قوڭغۇزى ، يال-تىراق قوڭغۇز ، موزايۇپىشى قاتارلىق زىيانداش ھاشارلار ، تۇپراق ئۈستىدە قۇشقاچ ، تۈمۈچۈك ، سۈڭۈچ ، پاختەك ، توخۇ - كەپتەر ، ياۋا توشقان ، كىرپە ، چاشقان قاتارلىقلار - نىڭ زىيان سېلىشى بىرقەدەر كۆپ بولىدۇ . شۇڭا ، بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ، تېرىغاندا يەرلىك ئوغۇتنى بەك

كۆپ تۆكمەسلىك (30 تاغار ئەتراپىدا بولسا بولىدۇ) ،
تۇپراقنى چوقۇم دېزىنفېكسىيە قىلىپ تېرىش ، مايسا ئۈ-
نۇپ 15 — 20 سانتىمېتىر بولغۇچە پات - پات دورا
چېچىپ تۇرۇش لازىم .

3 . پەرۋىش قىلىش

مايسا ئۈنۇپ چىققاندىن باشلاپ 15 — 20 سانتىمېتىر
ئېگىزلىكتە ئۆسكۈچە بولغان ئارىلىقتا ، زىيانداش ھاشا-
رات ، قۇش قاتارلىقلارنىڭ زىيان سېلىشى بىرقەدەر ئېغىر
بولىدۇ . بۇ مەزگىلدە مۇداپىئە كۆرۈش ۋە زىيانداش
ھاشاراتلارنى يوقىتىشنى كۈچەيتىش لازىم . يەر ئاستىدە-
كى زىيانداش ھاشاراتلارنى يوقىتىش ئۈچۈن ، ئېتىزلىققا
سۇ باشلىغاندا ، ئېتىزلاردا سۇ توختىتىپ ، تاسقالغان ياغاچ
كۆمۈر كۈلى ، تاماكا توپىسى ، لازا پاراشوكى قاتارلىقلارنى
سۇغا چېچىش لازىم . يەر ئۈستىدىكى زىيانداشلارنىڭ زىيە-
نىدىن مۇداپىئە كۈرۈشتە خىمىيىلىك دورىلارنى چاچقاندىن
باشقا ، مەخسۇس ئادەم قويۇپ خەۋەر ئېلىش ۋە يوقىتىش
تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك . چىلان كۆچتى قىش
پەسلىدە كۆمۈلمىسىمۇ ئۈش-شۈپ كەتمەيدۇ . لېكىن ،
قىش پەسلىدە ياۋا توشقاننىڭ زىيان سېلىشى نىسبە-
تەن ئېغىر بولىدۇ . شۇڭا ، چىلان ، ئۆرۈك قاتارلىق
قىشتا كۆمۈلمەيدىغان كۆچەتلىرىنى ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە
چەت - ياقا جايىلارغا ۋە جاڭگال ، ساي ياقىسى ئەتراپىغا
تېرىماسلىق كېرەك .

چىلان كۆچتىنى پەرۋىش قىلىشتا ، مايسا 15 — 20

سانتېمېتىر ئېگىزلىكتە ئۆسكەندىن تارتىپ ، يىل ئاخىرىدا -
 غىچە 8 — 10 قېتىم سۇغىرىش ، 5 — 6 قېتىم چاناپ
 تۈۋىنى يۇمشىتىش ، 3 — 4 قېتىم قوشۇمچە ئوغۇت بې-
 رىش ، 3 — 5 قېتىم دورا چېچىش ، 1 — 2 قېتىم
 يوپۇرماق گۆھىرى چېچىش ، 1 — 2 قېتىم غولىنىڭ
 ئاستىنقى شاخ - پۇتاقلىرىنى چاتاپ ھاۋا يۈرۈشتۈرۈش
 لازىم . پەرۋىش قىلىش ئىشلىرى ياخشى ئىشلەنسە ، كۆ-
 چەتلەرنىڭ ئېگىزلىكىنى يىل ئاخىرىغىچە 1.20 — 1.50
 مېتىرغا يەتكۈزگىلى ، ھەر 1 مو يەردە 7 — 8 مىڭ تۈپ
 سورتلۇق كۆچەت يېتىشتۈرۈپ ، تەخمىنەن 15 — 20 مىڭ
 يۈەن كىرىم قىلغىلى بولىدۇ .

4 . ئۆرۈكنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش

1 . ئۆرۈكنىڭ ئەلا سورتلىرىنى تاللاش
 شىنجاڭغا تارقالغان ئۆرۈكلەرنىڭ تۈرى مۇرەككەپ ،
 سورتى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ ، بۇلارنىڭ ئىچىدە ھۆل ئىس-
 تېمال قىلىنىدىغان سورتلار ، پىششىقلاپ ئىشلىنىدىغان
 سورتلار ۋە ھۆل ئىستېمال قىلىشقىمۇ ، پىششىقلاپ ئىش-
 لەشكىمۇ بولىدىغان سورتلار بار . ئۆرۈك ئۆستۈرۈلىدىغان
 ھەرقايسى رايونلارنىڭ ئۆز ئالدىغا تەرەققىي قىلدۇرىدىغان
 نۇقتىلىق ئەلا سورتلىرى بولۇپ ، ئۇنى ئۆستۈرۈش ، كۆ-

پەيتىش جەھەتتە ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىككە ۋە ئىلغار تەجە-
رىبىلەرگە ئىگە .

جايلار ئۆرۈكنىڭ ئەلا سورتلىرىنى تاللاشتا ، ئۆز را-
يونىدىكى داڭلىق ، ئەلا سۈپەتلىك سورتلارنى تەرەققىي قىل-
دۇرۇشنى ئاساس قىلىش بىلەن بىللە ، باشقا جايلارنىڭ
ئالاھىدە ياخشى ئۆرۈك سورتلىرىنى كىرگۈزۈپ سورت
يېتىشتۈرۈش ۋە ئەلا سورتلۇق ئۆرۈكلۈك باغ كۆلىمىنى
كېڭەيتىش خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇپ ياخشى ئىشلىشى كې-
رەك . ئەلا سورتلارنى كىرگۈزۈش ، ئۆستۈرۈش ۋە تەرەق-
قىي قىلدۇرۇشتا ، ئۆرۈك مەھسۇلاتىنىڭ مەملىكەت ئىچى
ۋە خەلقئارا بازارغا يۈزلىنىشىنى ، بازار ئۇچۇرىنى ۋە ئۇ-
نىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنى نەزەردە تۇتۇپ ھەم ھۆل ئىستې-
مال قىلىشقا بولىدىغان ، ھەم قۇرۇتۇپ يۆتكەشكە بولىد-
غان ياكى مېۋىسىنى قۇرۇتقاندىن كېيىن سۈپىتى ئېشىپ ،
قىممەت ئۈستىگە قىممەت قوشۇلىدىغان ، سۈپىتى ئەلا ،
ئالاھىدە سورتلارنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىستراتېگىيە-
لىك نشان قىلىش لازىم . شۇنىڭ بىلەن بىللە ھۆل پېتى
پىششىقلاپ ئىشلىنىدىغان ئەلا سورتلارنىمۇ مەلۇم كۆلەمدە
كېڭەيتىش كېرەك .

(1) ھۆل پېتى ئىستېمال قىلىنىدىغان (پىششىقلاپ
ئىشلىنىدىغان) سورتلار . بۇ خىل سورتلاردىن سېرىق
كىشمىش ، قىزىل كىشمىش ، ماتتا ئۆرۈك ، مايسەن ئۆ-
رۈك ، مېۋىل ئۆرۈك ، ياغلىق ئۆرۈك قاتارلىقلار بار .
(2) پىششىقلاپ ئىشلىنىدىغان سورتلار . بۇ خىل

سورتلاردىن سەمەت ئۆرۈكى ، سېرىق خۇۋەينە ، قارا يوپۇر -
ماق قۇممەت ئۆرۈك ، لىگۋاڭ ئۆرۈكى قاتارلىقلار بار .
3) ھۆل ئىستېمال قىلىشقىمۇ ، پىششىقلاپ ئىشلەش -
كىمۇ بولىدىغان سورتلار . بۇ خىل سورتلاردىن ئاق كىش -
مىش ئۆرۈك ، مايسەن ئۆرۈك ، ئاق ياغلىق ئۆرۈك ، جانان
ئۆرۈك ، تويۇن ئۆرۈك ، ئاق ئۆرۈك ، توغاچ ئۆرۈك ،
سېرىق خۇۋەينە ئۆرۈك ، قارا يوپۇرماق ئۆرۈك ، قاپاق
كىشىمىش ئۆرۈك ، قىزىل قۇممەت ئۆرۈك ، قىزىل قاچا
ئۆرۈك ، خورما ئۆرۈك ، ياغلىق قۇممەت ئۆرۈك ، سەمەت
ئۆرۈكى ، ياسىن ئۆرۈكى قاتارلىقلار بار .

2 . ئۇرۇق يىغىش

تېرىشقا تەييارلىنىدىغان ئۇرۇقلار تاللاپ بېكىتىلگەن
ئەلا سورتلار ئىچىدىن 15 — 20 يىللىق بولغان ، ساغلام
ئۆسكەن ، شاخ - يوپۇرماقلىرى باراقتان ، ھەر يىلى بولۇق
مېۋىلەيدىغان ، كېسەللىك ۋە زىيانداش ھاشاراتلارنىڭ زى -
يىنىغا ئۇچرىمىغان ئانا تۈپلەردىن يىغىۋېلىندۇ . 7 - ئاي -
نىڭ باشلىرىدا ئۆرۈكلەر سارغىيىپ پىشقاندىن كېيىن ،
ئۆرۈك ئىرغىتىپ يىغىۋېلىنىپ ، ئۈچكىسى ئېتىدىن ئاج -
رىتىلىپ سايە جايغا يېيىپ قۇرۇتۇپ ، چىپتا تاغارغا قاچى -
لاپ ساقلىنىدۇ .

3 . يەر تەييارلاش

ئۆرۈك ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك دەرەخ . لېكىن ،
ئۇرۇق تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ، كۈن نۇرى

تەكشى چۈشىدىغان ، شور ، تۈز تەركىبى ئاز ، قۇم تۇپراق ياكى قۇمساڭ ئەت تۇپراقلىق يەرلەرنى تاللاپ ، چوڭقۇر ئاغدۇرۇپ يانتۇلۇق پەرقى چوڭ بولمىغان بىر ياپ سالا ئېتىز تەييارلاش كېرەك ، ھەر مو يەرگە 2500 — 3000 كىلوگرام ياخشى چىرىگەن مەھەللە ئوغۇتى تۆكۈپ ، يەرنى يۇمشاق ئاغدۇرغاندىن كېيىن ، تۈزلەپ ئۇرۇق تېرىشقا تەييارلاپ قويۇش لازىم .

4. ئۇرۇقنى بىر تەرەپ قىلىش

ئۇرۇقنى كۈز ياكى ئەتىياز پەسلىدە تېرىشقا بولىدۇ . كۈزدە تېرىلىدىغان ئۇرۇقنى بىخلاندۇرمىسىمۇ بولىدۇ ، كۈزدە ئۇرۇق تېرىغاندا ، ئۇرۇقنىڭ پۇچەكلىرىنى شاللاپ چىقىرىۋېتىپ ، تېرىشقا تەييارلانغان يەرگە 10 - ، 11 - ئاي ئىچىدە تاپ ئېچىپ ئۇرۇق سالغاندىن كېيىن ، ئۈستىنى كۆمۈپ ، دەرھال سۇ قويۇۋەتسە بولىدۇ . ئەتىيازدا تېرىلىدىغان ئۇرۇقلار قىش پەسلىدە مەخسۇس ئۇسۇللار بىلەن بىر تەرەپ قىلىنىپ بىخلاندۇرۇلغاندىن كېيىن تېرىلىدۇ . ئۇرۇقنى بىخلاندۇرۇشنىڭ ئۇسۇللىرى كۆپ ، مەشغۇلات تەرتىپى ئاددىي بولۇپ ، سۇغا چىلاپ ، قۇمغا كۆمۈپ بىخلاندۇرمىسىمۇ ياكى ئورغا كۆمۈپ بىخلاندۇرمىسىمۇ بولىدۇ . ئەگەر ئۇرۇق تېرىش پەيتى يېتىپ كېلىپ ئۇرۇقنى بىخلاندۇرۇشقا ئۈلگۈرەلمىسە ، ئۈچ - كىنى چېقىپ ، ساق مېغىزنى ئايرىۋېلىپ ، ئىلمان سۇغا 7 — 8 كۈن چىلاپ ، قۇمغا كۆمۈپ بىخلاندۇرغاندىن كېيىن تېرىسىمۇ بولىدۇ .

5. ئۇرۇق تېرىش

ئەتىيازدا تېرىلىدىغان ئۇرۇق 3 - ئاينىڭ 20 - كۈنى -
لىرىدىن 4 - ئاينىڭ 5 - كۈنلىرىگە قەدەر تېرىلسا بولىدۇ ،
تېرىشتىن ئىلگىرى يەرنى ئوسا قىلىپ قايتا ئاغدۇر -
غاندىن كېيىن ، تۈزلەپ تاپ ئېچىپ تېرىسىمۇ ياكى ئاق
يەرگە تېرىپ سۇغارسىمۇ بولىدۇ . تېرىشتا ، قۇر ئارىلىقى
50 سانتىمېتىر ، تۈپ ئارىلىقى 8 — 10 سانتىمېتىر ،
چوڭقۇرلۇقى 3 — 5 سانتىمېتىرغىچە بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ .
يەرنى ئوسا قىلىپ ئاغدۇرۇپ ، تەكشى تۈزلەپ بولىدۇ .
غاندىن كېيىن ، چۆنەك تارتىپ سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ تېرىدۇ .
سا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ ، بۇ ئۇسۇلدا سۇلياۋ
ئۈستىدىن تاناپ تارتىپ قۇر ئارىلىقى بەلگىلىنىپ بولغاندا -
دىن كېيىن ، مەخسۇس سايمان بىلەن تۈپ ئارىلىقى 8 —
10 سانتىمېتىر ، چوڭقۇرلۇقى 3 سانتىمېتىر قىلىپ تۆ -
شۈك ئېچىلىدۇ ، ئاندىن ھەربىر تۆشۈككە بىر تالدىن ئۇ -
رۇق سېلىنىپ ، ئۈستىگە 3 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا ھۆل
توپا تۆكۈپ كۆمۈلىدۇ . بۇ ئۇسۇلدا تېرىلغان ئۇرۇق 20
كۈندە ئۈنۈپ چىقىشقا باشلايدۇ .

6. پەرۋىش قىلىش

ئۆرۈك كۆچەتلىرى ئۈنۈپ 20 — 25 كۈندىن كېيىن
بىر قېتىم نېپىز سۇغىرىلىدۇ ، ئوتغۇچ قاتارلىق سايمانلار
بىلەن كۆچەتنىڭ تۈۋىنى يۇمشىتىپ ، كۆچەتلەر 20 سانتىم -
مېتىردىن ئاشقاندا تاپ ئېچىپ ، ئازوتلۇق ئوغۇت بىلەن
ئوغۇتلاپ دەرھال قاندۇرۇپ سۇغىرىش كېرەك . 7 - ئاي -

لاردا فوسفورلۇق ئوغۇت ياكى توخۇ - كەپتەر مايىقى ، قوي قىغى ، كۈنجىرە قاتارلىقلار بىلەن بىر نۆۋەت ، 8 - ئايلاردا كالىيلىق ئوغۇتلار بىلەن بىر نۆۋەت ئوغۇتلاپ ، كۆچەتلەر - نى يىل بويى 8 — 10 قېتىم سۇغىرىش ، 6 — 7 قېتىم چاناپ تۈۋىنى يۇمشىتىش ، 3 — 4 قېتىم ئوتنى ئوتاش ، 2 — 3 قېتىم دورا چېچىپ كېسەللىك ، زىيانداش ھاشا - راتلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم . 1 — 2 قېتىم ياندىن ئۆسۈپ چىققان شاخلىرىنى پۇتاپ پەرۋىشىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق كۆچەتلەرنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كې - رەك . كۈز ۋە قىش پەسىللىرىدە توڭ سۈيى قويۇش ، ئىس قويۇش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ ، كۆچەتلەرنىڭ ئۆشۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم .

ئەلا سورتلۇق ئۆرۈكنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرگەندە ، ئۇنىڭدىن ئورمان بىنا قىلىش ئارقىلىق مېۋە سۈپىتىنى ياخشىلاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىسمۇ ، لېكىن يىللارنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۇرۇقىدىن تېرىلغان سورتلار چېكىنىپ كېتىدۇ . شۇڭا ، ئەڭ ياخشىسى ئۇنى ئۇلاق ئاستى قىلىپ ، ئەلا سورتلارغا قايتىدىن ئۇلغان تۈزۈك .

5. ئانارنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ

كۆچەت يېتىشتۈرۈش

ئانار دەرىخى قەلەمچە قىلىش ، يىلتىزىدىن تۈپ ئاي - رىش ، نوتا باسۇرۇش ، ئۇرۇقىنى تېرىش ، ئۇلاش قاتارلىق

ئۇسۇللار ئارقىلىق كۆپەيتىلىدۇ . بۇنىڭ ئىچىدە ، قەلەمچە ئارقىلىق كۆپەيتىش ئۇسۇلى بىلەن يىلتىزىدىن يېرىپ تۇپ ئايرىپ كۆپەيتىش ئۇسۇلى كۆپرەك قوللىنىلىدۇ . بۇ ئىككى خىل ئۇسۇلدا كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئاسان ھەم ئۈنۈمى ياخشى . ئەمما ، قەلەمچە قىلىنىدىغان يۇمران شاخ - نوتە - لارنىڭ يېتىشمەسلىكى تۈپەيلىدىن قەلەمچىلەرنىڭ باھاسى ئۆرلەپ كېتىش ، شاخ - نوتىلارنى بەس - بەستە تالىشىپ سېتىۋېلىپ ، مۇددەتتىن بۇرۇن كېسىپ يۆتكەش نەتىجىسىدە كۆكلەش ئۈنۈمى تۆۋەن ، سۈپىتى ناچار بولۇشتەك ئەھۋاللار ھەممىلا جايدا ئومۇميۈزلۈك ساقلانماقتا ، ھەتتا بەزى كىشىلەر پايدىنى كۆزلەپ ، كوللېكتىپ ۋە شەخسلەرنىڭ ئەسلىدە ياخشى مېۋە بېرىۋاتقان ئانار دەرەخلىرىنىڭ كۆپ يىللىق مېۋە شاخلىرىنىمۇ كېسىۋېلىپ ئانار مەھسۇلاتىنى تۆۋەنلەتمەكتە . شۇڭا ، نۆۋەتتە پەن - تېخنىكىغا تايىنىپ ئىلمىي ئۇسۇلدا ئانار ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش يۇقىرىقىدەك ئەھۋاللارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە جىددىيلىكنى پەسەيتىشنىڭ ياخشى تەدبىرى ھېسابلىنىدۇ .

1. ئانار ئۇرۇقىنى تەييارلاش

ئۇرۇق ئېلىش ئۈچۈن 10 - ، 11 - ئايلاردا ياخشى پىشقان ، سۈپىتى ياخشى ، پوستى يېرىلمىغان ، مېۋىسى چوڭ ، تاتلىق ئانار سورتلىرىنى تاللاش كېرەك . ئەڭ ياخشىسى ئانار قىزىرىپ ياخشى پىشقان مەزگىلدە (10 - ئايدا) ئانارلىق باغلاردىن تۈپلەر بويىچە تاللاپ ئۈزۈۋالغان ياخشى . ئانار ئۇرۇقىنى ئانارنى ئۈزۈۋالغاندىن كېيىن تەييارلاش .

يارلىسىمۇ ياكى ئەتىياز پەسلىدە تەييارلىسىمۇ بولىدۇ . لېكىن ، ئانارنى ئۈزۈپ ئۆيگە (ئامبارغا) ئەكىرگەندىن كېيىن ، قىش پەسلىدە توڭلاپ قېلىشتىن ، ئىسسىقتىن كۆكرىپ قېلىشتىن ، چاشقانلارنىڭ زىيان سېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك . ئادەتتە ئانارنى پوستىدىن ئاجرىتىۋېلىپ ، پاكىز داكا خالتىغا قاچىلاپ قول بىلەن سىقىش (ماشىنا بىلەن سىقىشقا بولمايدۇ) ئارقىلىق ئۇرۇقى ئاي-رىۋېلىنىدۇ . سۈيى شەربەت تەييارلاشقا ئىشلىتىلىدۇ . ئۇ-رۇقى سۇدا پاكىز يۇيۇپ تازىلانغاندىن كېيىن ، ئەلگەك ، غەلۋىر قاتارلىق سايمانلار بىلەن سۇدىن سۈزۈۋېلىدۇ . نىپ ، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان سالقىن جايدا بورا ئۈستىگە يېيىپ قۇرۇتۇلىدۇ . تولۇق قۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ، رەخت خالىتا ياكى چىپتا تاغارغا قاچىلاپ سوغۇق جايدا ساقلىنىدۇ .

2 . ئۇرۇقنى بىخلاندۇرۇش

ئانار ئۇرۇقى قاتتىق بولغاچقا ، شۇ پېتى تېرىسا ئاسان ئۈنمەيدۇ . شۇڭا ، تېرىشتىن ئىلگىرى سۇغا چىلاپ ، ھۆل قۇمغا كۆمۈش ، ئورغا تۆكۈش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق بىخلاندۇرۇلىدۇ . 3 - ئايدا پارنىققا تېرىشقا توغرا كەلسە ، 2 - ئاينىڭ ئاخىرلىرى ؛ 4 - ئايدا ئوچۇق ئېتىزغا تېرىشقا توغرا كەلسە ، 3 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا بىخلاندۇرۇلغان ئۇرۇق تەييارلىنىدۇ . شۇڭا ، تېرىلىدىغان ئۇرۇق ئەھۋالغا قاراپ بىر ئاي ئىلگىرى بىخلاندۇرۇشقا تەييارلىنىدۇ . ئۇ-رۇقنى بىخلاندۇرۇش ئۇسۇلى كۆپ بولۇپ ، ئاساسلىق ئۇ-

سۇلى مۇنداق : ئۇرۇق ئالدى بىلەن چوڭ داس ، كوزا ياكى چېلەكلەرگە قاچىلانغاندىن كېيىن ، $40 - 50^{\circ}\text{C}$ لۇق ئىسسىق سۇغا ئۈچ كېچە - كۈندۈز چېلىنىدۇ . ئۇرۇق چېلانغان داس ، چېلەكلەرنىڭ ئاغزى ئوچۇق قويۇلىدۇ . سۈيى ھەر كۈنى كەچتە بىر قېتىم ، ئەتىگەندە بىر قېتىم ئالماش-تۇرۇلىدۇ . ئۈچ كۈندىن كېيىن ئۇرۇق ئەلگەك ياكى غەلۋىر بىلەن سۈزۈۋېلىنىپ ، ئۇرۇقنىڭ بەش ھەسسىسىگە باراۋەر ھۆل قۇمغا تەكشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ . قۇم بەك ھۆل بولۇپ قالسا ئۇرۇق سېسىپ كېتىدۇ . بەك قۇرۇق بولۇپ قالسا ئاسان بىخلانمايدۇ . شۇڭا ، قۇمنىڭ نەملىكى قول بىلەن سىققاندا كالىلەكلىشىپ قالمىغۇدەك ، يەرگە تاشلىغاندا چېچىلغۇدەك ھالەتتە بولۇشى كېرەك . قۇمغا ئارىلاشتۇرۇلغان ئۇرۇق كۈن نۇرى چۈشمەيدىغان جايغا $40 - 50$ سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا ئورەك قېزىپ ، تېگىگە يەنە 10 سانتىمېتىر نەم قۇم يېيىتقاندىن كېيىن ، شۇ ئورەككە تۆكۈلىدۇ ، ئۈستىگە يەنە 10 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا نەم قۇم ، ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە نەم توپا تىندۈرۈلىدۇ . بۇ ئۇسۇلدا ئۇرۇق $25 - 30$ كۈندە $60\% - 70\%$ بىخلىنىپ بولىدۇ . بۇ چاغدا ئۇرۇق غەلۋىر بىلەن يېنىك تاسقاپ قۇمدىن ئاجرىتىلىپ تېرىشقا تەييارلىنىدۇ . پارنىكقا تېرىلىدىغان ئۇرۇق 3 - ئايدا تېرىلغانلىقتىن ، 2 - ئاينىڭ باشلىرىدا بىخلاندۇرۇشقا تەييارلىق قىلىنىدۇ . بۇ چاغدا ھاۋا سوغۇق ، توڭ ئېرىمىگەن بولغاچقا ، ئۇرۇقنى سىرتتا بىخلاندۇرۇش قىيىن بولىدۇ . شۇنىڭ ئۈچۈن ، ئۇرۇقنى ھۆل قۇمغا ئارىلاشتۇرۇپ ، مەش

قويغان ئىسسىق ئۆيدە قۇم ئارىلاشتۇرۇلغان ئۇرۇقنى بىر يەرگە دۆۋىلەپ ئۈستىگە نەم توپا تۆكۈپ ، كىگىز ، ئەدىيال قاتارلىق نەرسىلەر بىلەن يېپىپ قويۇش لازىم . ئۆيىنىڭ ئىچىگە كۈن نۇرى چۈشمەسلىكى ، ئۆيىنىڭ مۇقىم تېمپېراتۇرىسى $15^{\circ}\text{C} - 18^{\circ}\text{C}$ بولۇشى كېرەك . ئۇرۇق بىخەتەرلىك ئۆزۈنلۈكى 5 مىللىمېتىردىن ئېشىپ كەتمەسلىكى ، ئۇرۇق %70 بىخلانغاندا يەرگە تېرىلىشى لازىم .

3. ئانار ئۇرۇقىنى پارنىققا تېرىپ كۆچەت يېتىلدۈرۈش

پارنىكنىڭ تەننەرخى يۇقىرى ، كۆلىمى چەكلىك بولغاچقا ، كۆپىنچە زىچ تېرىشقا توغرا كېلىدۇ . قانداق ئۇسۇلدا تېرىش كېرەكلىكىنى جايلار ئۆز ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىسە بولىدۇ . پارنىققا ئانار ئۇرۇقى تېرىش 3 - ئاينىڭ 15 - كۈنىدىن 30 - كۈنىگىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ . پارنىك ئىچىنى مەش ، پار بىلەن ئىسسىتالايدىغان پارنىك ئۈستىنى بىرېزېنت ، كىگىز قاتارلىق نەرسىلەر بىلەن يېپىش شارائىتى بولغان جايلار 3 - ئاينىڭ باشلىرىدا ئۇرۇق تېرىسىمۇ بولىدۇ . ئۇنىڭ كونكرېت ئۇسۇلى مۇنداق : بۇنىڭدا كۈن نۇرى تولۇق چۈشىدىغان مۇنبەت تۇپراق ياكى يېنىك قۇمساڭغۇ يەر تاللىنىپ ، مۇۋاپىق مىقداردا (35 — 40 تاغار) سۈپەتلىك قوي قىغى ياكى توخۇ - كەپتەر مايىقى تۆكۈپ يۇمشاق ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن ، تۈزلەپ ئوسا قىلىنىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ، پارنىك جازدە

لىرى قۇراشتۇرۇلۇپ ، سۇلياۋ يېپىپ ، پارنىك ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئاشۇرۇلىدۇ . يەرنى يۇمشىتىپ تەكشى تۈزلەپ ، قىر سېلىپ تەييارلىغاندىن كېيىن ، 1 — 1.5 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا ، قۇر ئارىلىقىنى 25 سانتىمېتىر قىلىپ تۈز سىزىق بويىچە تاپ ئېچىپ ، بىخلاندۇرۇلغان ئانار ئۇرۇقى تاپ ئىچىگە قويۇق تېرىلىدۇ . ئۇرۇقنىڭ كۆمۈلۈش قېلىنلىقى 1.5 سانتىمېتىردىن ئېشىپ كەتمەس . لىكى ، ئۈستى تارماقنىڭ كەينى بىلەن تەكشى تۈزلىنىپ ، يېنىك دەسسەپ چىڭدىلىشى كېرەك . بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق 1 مو كۆلەمدىكى پارنىك ئىچىدە 40 — 50 مىڭ تۈپ كۆچەت يېتىشتۈرگىلى ، كۆچەت ئېگىزلىكىنى يىل ئاخىرىغىچە 30 — 40 سانتىمېتىرغا يەتكۈزگىلى ، كېيىنكى يىلى ئۇنى ئاق يەرگە كۆچۈرۈپ كۆچەتلىك بەرپا قىلغىلى ياكى ئېھتىياجلىق ئورۇنلارغا سېتىپ 4 — 5 مىڭ يۈەن كىرىم قىلغىلى بولىدۇ . ئەگەر مايسا يېتىشتۈرۈش مەقسەت قىلىنماي ، رەسمىي كۆچەت يېتىشتۈرۈش مەقسەت قىلىنسا ، تېرىغاندا قۇر ئارىلىقىنى 40 سانتىمېتىر ، تۈپ ئارىلىقىنى 8 سانتىمېتىر قىلىپ ، مۇۋاپىق قويۇق تېرىپ ، ئارتۇق مايسىلارنى 5 - ئايدا تۇپرىقى بىلەن قومۇرۇپ ئاق يەرگە كۆچۈرۈش لازىم . يىل ئاخىرىغىچە ئورنىدا قالغان كۆچەتلەرنىڭ ئېگىزلىكى 60 — 80 سانتىمېتىرغا ، قوز - غاپ ئاق يەرگە كۆچۈرۈلگەن كۆچەتلەرنىڭ ئېگىزلىكى 50 — 60 سانتىمېتىرغا يېتىدۇ .

4. پارنىك ئىچىدىكى كۆچەتلەرنى پەرۋىش

قىلىش

بىخىلاندۇرۇلغان ئانار ئۇرۇقى پارنىققا تېرىلغاندىن كېيىن ، كۆپ قىسمى 20 — 30 كۈنگىچە ئۈنۈپ چىقىدۇ . ئەگەر ئۇرۇق ئۈنۈپ چىقىپ مايسا بولغان مەزگىللەردە ، ھاۋا تېمپېراتۇرىسى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەپ ئۇششۇك پەيدا بولۇپ ، پارنىك ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسى 0°C تىن چۈشۈپ كەتسە ، دەرھال پارنىك ئۈستىنى مەھكەم يېپىپ ، كۆچەت-لەرنى ئۇششۇكتىن ساقلاش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك . كۆچەتلەرنىڭ ئوتتۇرىچە ئېگىزلىكى 4 — 5 سانتىمېتىردىن ، پارنىك ئىچىنىڭ مۇقىم تېمپېراتۇرىسى 25°C تىن ئاشقاندا ، تۈپ ، قۇر ئارىلىقىنى مۇۋاپىق تەڭشەپ مايسا قالدۇرۇش كېرەك . تۇپراقنىڭ نەملىكى نورمال بولۇش ، كۆچەتلەرنى بەك ئالدىراپ سۇغارماسلىق ، بولۇپمۇ لاي ، سېغىز سۇ بىلەن باسۇرۇپ سۇغىرىشتىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم ، پارنىكنىڭ نەملىكى ئۇدا 10 كۈنگىچە ئېشىپ كەتسە ، تۇپراقتا زەمبۇرۇغ پەيدا بولۇپ ، تۇپراق ئۈستى كۆكرىپ قالىدۇ . نەتىجىدە كۆچەتلەردە سېرىق دات كېلىلى ، يىلتىز چىرىش كېلىلى پەيدا بولىدۇ . شۇڭا ، پارنىكنىڭ نەملىكى ئېشىپ كەتكەن ھامان ، پارنىكنىڭ شىمالىي تەرىپىدىكى سۇلياۋنى ھەر كۈنى كەچتە ئېچىۋېتىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ ، تۇپراق نەملىكى تۆۋەنلىگەندىن كېيىن قايتا يېپىش كېرەك . كۆچەتلەرنىڭ ئېگىزلىكى 5 — 8 سانتىمېتىر بولغاندا ، بىر تەرەپتىن ئوتۇغۇچ

بىلەن كۆچەتلەرنىڭ تۇۋىنى يۇمشىتىپ ئوت - چۆپلەرنى
 ئوتاش ، يەنە بىر تەرەپتىن ئەھۋالغا قاراپ دورا چېچىپ ،
 كېسەللىك ۋە زىيانداش ھاشاراتلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش كې-
 رەك . كۆچەتلەرنىڭ ئېگىزلىكى 15 — 20 سانتىمېرغا
 يەتكەندە سۆڭەك پاراشوكى ، قارا ئوغۇت ، كۈنجۈرە قاتار-
 لىقلارنى مۇۋاپىق نىسبەتتە ئارىلاشتۇرۇپ ، ئاز - ئازدىن
 (كېيىنكى مەزگىلدە ئوغۇتنىڭ مىقدارىنى تەدرىجىي كۆ-
 پەيتىش كېرەك) قوشۇمچە ئوغۇتلاش ، 6 - ئايدىن 8 -
 ئايغىچە ئۈچ قېتىم ئوغۇتلاش ، 5 - ئايدىن 9 - ئاينىڭ
 20 - كۈنلىرىگىچە 7 — 8 قېتىم سۇغىرىش ، 5 - ئايدىن
 7 - ئايغىچە 3 — 4 قېتىم دورا چېچىش ، 5 — 6
 قېتىم تۇۋىنى يۇمشىتىپ ھاۋا ئالمىشىشنى ئىلگىرى سۈ-
 رۇش ، تۇپراقنىڭ ئىسسىقلىقىنى ۋە نورمال قۇرغاقلىقىنى
 ساقلاش كېرەك . ئۆسۈۋاتقان مەزگىلدە يۇپۇرماقتىن ئو-
 غۇتلاش ۋە يۇپۇرماق گۆھرىنى چېچىپ كۆچەتلەرنىڭ ئۆ-
 سۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك . پارنىك تېمپېراتۇ-
 رىسىنى تەدرىجىي ئۆرلىتىپ ، ئاخىرقى مەزگىلدە
 $36^{\circ}\text{C} - 38^{\circ}\text{C}$ تا تىزگىنلەپ ، پارنىك تېمپېراتۇرىسى سىرتقى
 مۇھىتنىڭ تېمپېراتۇرىسى بىلەن ماسلاشقاندىن كېيىن ،
 كەچ تەرەپلەردە پارنىك ئۈستىدىكى سۇلياۋلارنى تەدرىجىي
 ئېلىۋېتىش كېرەك .

5. ئانار ئۇرۇقىنى ئوچۇقچىلىققا تېرىپ كۆ-

چەت يېتىشتۈرۈش

ئوچۇقچىلىققا ئانار كۆچىتى يېتىشتۈرۈشتىمۇ ئوخ-

شاشلا بىخلاندۇرۇلغان ئۇرۇق تېرىلىدۇ ، ئالدى بىلەن تۇپرىقى ياخشى ، سۈيى راۋان ، سۇغىرىش قۇلايلىق ، كۈن نۇرى تەكشى چۈشىدىغان ، يانتۇلۇق پەرقى تۆۋەن ، قۇم-ساغۇ يەرلەر كۆچەت يېتىشتۈرۈشكە تەييارلىنىدۇ . ھەر مو يەرگە 50 — 60 تاغار سۈپەتلىك ئورگانىك ئوغۇت تۆكۈپ ، چوڭقۇر ، يۇمشاق ئاغدۇرۇپ تەكشى تۈزلىگەندىن كېيىن ، سۇغىرىپ ئوسا قىلىنىدۇ ، ئاندىن ئوسا قىلىنغان يەر يۇمشاق ئاغدۇرۇپ تۈزلىنىپ ، 1.10 مېتىر كەڭلىكتە چۆنەك ئېچىپ ، چۆنەكنىڭ ئۈستى چىڭداغاندىن كېيىن كەڭ ئەنلىك سۇلياۋ يوپۇق يېپىلىدۇ . بىر چۆنەككە ئۈچ قۇر ، قۇر ئارىلىقى 30 — 35 سانتىمېتىر قىلىپ ئۈچ قوش تاپ ئېلىنىدۇ . ئۈچ قوش تاپتىن كېيىن 60 سانتىمېتىر كەڭلىكتە بىر يەككە تاپ پىلانلاپ ، مەخسۇس تەييارلانغان سايمان بىلەن ھەر 7 — 8 سانتىمېتىر ئارىلىققا بىر تۆشۈك ئېچىلىدۇ ، ئاندىن ھەر بىر تۆشۈككە 5 — 6 تالدىن بىخلاندۇرۇلغان ئۇرۇق سېلىنىپ ، ئۈستى ھۆل توپا بىلەن چىڭدىلىدۇ (ئۇرۇق 2 سانتىمېتىر قېتىملىنىپ كۆمۈلىدۇ) . بۇ ئۇسۇلدا تېرىلغان ئۇرۇق بىر ئاي ئىچىدە ئاساسىي جەھەتتىن ئۈنۈپ چىقىپ بولىدۇ . ئۇرۇق ئۈنۈپ 5 — 6 سانتىمېتىر بولغاندا دەرھال تاقلاپ ، بىرىندى چى قېتىم ھەر بىر تۆشۈككە 2 — 3 تال ، ئىككىنچى قېتىم 1 — 2 تالدىن كۆچەت قالدۇرۇلسا بولىدۇ . بىرىنچى قېتىم مايسا تاقلاشتىن بۇرۇن ، مۇۋاپىق نىسبەتتە تەڭشەلگەن DDV قاتارلىق دورىلارنى چېچىپ ، زىيانداش ھاشا-راتلاردىن مۇداپىئە كۆرۈلىدۇ . كېيىنكى قېتىمدا ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ ئۈنۈمى ياخشى بولغان دورىلارنى بىر قانچە

قېتىم چېچىش كېرەك . كۆچەتلەرنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ، 3 — 4 قېتىم ئاز - ئازدىن سۆڭەك پاراشوكى ، توخۇ - كەپتەر مايىقى ، قوي قىغى ، گەندە ، قارا ئوغۇت ، ئاق ئوغۇت قاتارلىقلار مۇۋاپىق نىسبەتتە تەڭشەپ قوشۇمچە ئوغۇتلىنىدۇ (ئاق ئوغۇت ئازوتلۇق ئو-غۇت بولۇپ ، بەك كۆپ ئىشلىتىلسە يۇمران مایسلارنى كۆيدۈرۈۋېتىدۇ ھەم كۆچەتلەر ئاسان يېتىۋالىدىغان بولۇپ قالىدۇ) . ئادەتتە ئاق ئوغۇت بىلەن توخۇ-كەپتەر مايىقىنى كۆچەتلەرنىڭ مایسا مەزگىلىدە كۆپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ . ئوچۇقچىلىققا ئۇرۇقتىن تېرىلغان ئانار كۆچەتلىرى 9 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىغىچە 6 — 7 قېتىم سۇغىرىلسا ، 5 — 6 قېتىم چاناپ تۈۋى يۇمشىتىلسا ، 1 — 2 قېتىم ياندىن چىققان شاخلىرى پۇتاپ ئېلىۋېتىلسە ، 1 — 2 قېتىم يوپۇرماق گۆھىرى چېچىلسا ، كۆچەتلەرنىڭ پەرۋاش قىلىنىشى ئاساسىي جەھەتتىن تەلەپكە يەتكەن بولىدۇ . بۇ ئۇسۇل بىلەن تېرىپ پەرۋاش قىلىنغان ئانار كۆچەتلىرى-نىڭ ئېگىزلىكىنى يىل ئاخىرىغىچە 70 — 80 سانتىم-مېتىرغا ، ئىككىنچى يىلى 1.20 — 1.50 مېتىرغا يەتكۈزگىلى بولىدۇ .

6 . شاپتۇلنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ

كۆچەت يېتىشتۈرۈش

1 . شاپتۇلنىڭ ئەلا سورتلىرىنى تاللاش

شىنجاڭدا ئۆستۈرۈلۈۋاتقان يەرلىك شاپتۇللارنىڭ

سورتلىرى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ ، دانىسى بىرقەدەر چوڭ ، سۈپىتى ياخشى ، تەمى تاتلىق ، ئىقتىسادىي قىممىتى بىرقەدەر يۇقىرى ، ھەم ھۆل ئىستېمال قىلىشقا ۋە پىششىقلاپ ئىشلەشكە ، ھەم قۇرۇتۇپ ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغان ئەلا سورتلاردىن كۆك چىلگە شاپتۇل (كۆك تەكە) ، مياڭ-سال شاپتۇل ، چوڭ سېرىق شاپتۇل ، توغاچ شاپتۇل ، ئۇزۇن تۇمشۇق ئاق شاپتۇل ، كۆك يارما شاپتۇل ، تاتلىق مېغىزلىق شاپتۇل ، چوڭ ئەششاپتۇل قاتارلىقلار بار . بۇلارنىڭ سورتى ئەلا ، سۈپىتى ياخشى ، دانىسى چوڭ بولۇپ ، مېۋىسىنىڭ ئېغىرلىقى 80 — 200 گرام كېلىدۇ . بۇ سورتلارنى ھەممىلا يەردە كېڭەيتىشكە بولىدۇ . بۇنىڭدىن باشقا ، ھەرقايسى رايونلارنىڭ ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىككە ئىگە ئەلا سورتلۇق شاپتۇللىرىدىن تۆۋەندىكى سورتلار بار .

1) چىلگە سورتلار . كورلا ئاق شاپتۇلى ، گۇما چىلگە شاپتۇلى ، كۇچار ئاق چىلگە شاپتۇلى ، توقسۇ چوڭ ئاق چىلگە شاپتۇلى ، قەشقەر كۈنەشەھەر ئاق چىلگە شاپتۇلى ، سۈرخەك شاپتۇل ، كۆك شاپتۇل ، توغاچ شاپتۇل قاتارلىقلار بار .

2) ئارا ۋە جاڭدا سورتلار . جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن چىقىدىغان چوڭ ئاق شاپتۇل ، توغاچ شاپتۇل ، سېرىق شاپتۇل ، قىزىل ئەششاپتۇل ، كۆك يارما شاپتۇل ، ئاق يارما شاپتۇل ، تاتلىق مېغىزلىق شاپتۇل قاتارلىقلار بار .

3) ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كىرگۈزۈلگەن سورتلار . شاڭخەي شۈيىمى شاپتۇلى ، يۈلۈ شۈيىمى شاپتۇلى ، گاڭشەن-

بەي شاپتۇلى ، چۈنلى (باھار غۇنچىسى) ، شىنۇڭ (غەر-
 بىي شىمال سورتى) ، زاۋشىڭيۈي ، بۇمۇ زاۋشىڭ (ياپونىيە-
 يە سورتى) ، شازىزاۋشىڭ (ياپونىيە سورتى) ، ئاق
 سۈمەرۈڭ (ياپونىيە سورتى) ، داجىۇباۋ (ياپونىيە
 سورتى) ، بەيخۇڭ (بېيجىڭ سورتى) ، شاڭخەي شاپتۇلى ،
 ساخۇاخۇڭ (ئەنجۈر شاپتۇل) ، لەنجۇ چىشۈي شاپتۇلى ،
 شىنجۇ قىزىل شاپتۇلى ، سەنشىنىڭ كۈزلۈك شاپتۇلى ،
 لېنژى سۆسۈن شاپتۇلى ، ۋۇگۇڭ سېرىق ئەتلىك شاپتۇ-
 لى ، لىڭۋۇ سېرىق شاپتۇلى ، تىەنشۈي شاپتۇلى قاتارلىقلار
 ۋە يېڭىدىن تاللاپ يېتىشتۈرۈلگەن سورتلاردىن چىڭفېڭ ،
 جىڭخۇڭ ، مەيشياڭ ، جىڭيۇ ، خۇاڭلو ، لوشياڭ ، يۈەن-
 چۈەنبەي ، لوخۇا — 9 قاتارلىقلار بار .

يۇقىرىقى ئۈچ خىل تۈردىكى شاپتۇللاردىن سورتى
 ئالاھىدە ياخشى ، دانىسى چوڭ ، ئىشلىتىلىش دائىرىسى
 كەڭ ، رەڭگى چىرايلىق ، تەمى تاتلىق ، ئېتى ئاسان ئاج-
 رايدىغان ، ئىقتىسادىي قىممىتى يۇقىرى ، ماسلىشىشچانلى-
 قى كۈچلۈك بولغان سورتلارنى تاللاپ كېڭەيتىشكە بولىدۇ .
 لېكىن ، ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەلتۈرۈلگەن سورت-
 لارنى كېڭەيتىشكە توغرا كەلسە ، شىنجاڭنىڭ يەرلىك شاپ-
 تۇل سورتلىرىنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ يېتىشتۈرگەن 1 —
 2 يىللىق كۆچەتلەرگە ئۇلارنىڭ نوتىلىرىدىن بىخ ئېلىپ
 ئۇلاپ كۆپەيتسە بولىدۇ .

2. ئۇرۇق يىغىش

يەرلىك شاپتۇلنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرىنى يې-

تەشتۈرۈش ئۈچۈن ، ئۇرۇق تېرىش ، ئۇلاش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ . ئۇرۇق تېرىش ئۈچۈن ، ئەلا سورتلۇق شاپ-تۈل مېۋىسىنىڭ ئۇرۇقىنى ئالدىن يىغىپ تەييارلاش كېرەك . شاپتۇلنىڭ مېۋىسى تولۇق پىشقاندىن كېيىن ، ئۇنى كىشىلەر ھۆل پېتى ئىستېمال قىلىدۇ ، قاق يېيىشقىمۇ بولىدۇ . بۇ چاغدا ئۇرۇق يىغىشقا شارائىت ھازىرلىنىدۇ . شاپتۇل پىشىپ ئاخىرلاشقۇچە بولغان ئارىلىقتا ، تېرىشقا كېتەرلىك ئۇرۇقلارنى تولۇق يىغىۋېلىپ ، پاكىز ئادالاپ قۇرۇتۇپ ساقلاش كېرەك .

3 . ئۇرۇقنى بىخلاندۇرۇش

ئۇرۇقنى بىخلاندۇرۇش ۋاقتىدا ، تەييارلانغان ئۇرۇق-لارنى تەكشۈرۈپ ، پۇچەك ، زىيان - زەخمەتكە ئۇچرىغان ئۇرۇقلارنى شاللاپ چىقىرىۋېتىپ ، ساپ ئۇرۇقنى 11 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلاپ بىخلاندۇرۇش تەييارلىقىنى ئىشلەش كېرەك . شاپتۇل ئۇرۇقىنى شۇ پېتى 9 - ، 10 - ئايلاردا ئاق يەرگە تېرىپ ، توك چۈشكۈچە ئۈچ قېتىم سۇغارسا ، ئەتىيازدا زايا بولماي ئۈنۈپ چىقىدۇ . ئەگەر ئۇرۇق تېرىيدىغان يەر مۇقىملاشمىغان بولسا ، قىشتا بىخ-لاندۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ ، ئەتىيازدا تېرىسىمۇ بو-لىدۇ . ئۇرۇقنى بىخلاندۇرۇشتا ، ئالدى بىلەن 80 — 90℃ لۇق ئىسسىق سۇغا 8 — 10 كۈن چىلاپ ، سۇدىن سۈزۈۋېلىپ ، ئۇرۇقنىڭ 4 — 5 ھەسسىسىگە بارا-ۋەر نەم قۇمغا ئارىلاشتۇرۇپ ، ئورەككە تۆكۈپ ، ئۈستى

15 — 20 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا ھۆل توپا بىلەن كۆمۈلدە. دۇ. 3 - ئاينىڭ باشلىرىدا ئۇرۇق ئېچىلىپ، نەم قۇمغا ئارىلاشتۇرۇپ، مەش قويغان ئۆيگە ياكى پارنىك ئىچىگە دۆۋىلەپ ئۈستى نەم چېپتا، كىگىز قاتارلىقلار بىلەن باسۇ. رۇپ قويۇلىدۇ. تېمپېراتۇرا پەيدىنپەي 30°C — 35°C قا يەتكۈزۈلىدۇ. بۇ جەرياندا ئۇرۇق كۈندە بىر قېتىم ئاغدۇ. رۇپ تۇرۇلىدۇ. مۇشۇنداق قىلغاندا ئۇرۇقلار 3 - ئاينىڭ ئاخىرىغىچە 40%—50% بىخلىنىدۇ. ئەگەر ئەتىياز پەسلىدە تېرىش ۋاقتى قىسلىپ قالسا، بىر تەرەپ قىلىنىدىغان قۇرۇق ئۈچكىنى قول بىلەن چېقىپ مېغىزنى ئاجرىتىۋېلىپ، ئىلمان سۇغا 5 — 6 سائەت چىلىغاندىن كېيىن، نەم قۇم ئارىلاشتۇرۇپ، تېمپېراتۇرىسى 25°C — 30°C لۇق جايغا قويسا، 8 — 10 كۈندە بىخلىنىدۇ.

4. ئۇرۇق تېرىش

شىنجاڭنىڭ يەرلىك شاپتۇل سورتلىرىنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرگەندە، بۇ كۆچەتلەر ئەسلىدىكى ئانا تۈپلەرنىڭ ئىرسىيەتلىك ئالاھىدىلىكى (سورت، سۈپەت) نى ئۇزاق يىللارغىچە ساقلاپ قالالايدۇ. چۈنكى، باشقا مېۋىلىك دەرەخلەرگە قارىغاندا شاپتۇل دەرەخىنىڭ ئىرسىيەتچانلىقى تۇراقلىق، سورتلارنىڭ چېكىنىشى تۆۋەن بولۇپ، دەرەخ تۈپلىرى ياخشى پەرۋاش قىلىنسا، مەھسۇلاتىنى يىلمۇيىل ئۆستۈرگىلى، ئەسلىي سورتنى ساقلاپ قالغىلى بولىدۇ. ئەگەر ياخشى پەرۋاش قىلىنمىسا، مېۋە-

سى كىچىكلەپ ، يېلىم پەيدا بولۇپ ، سۈپىتى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ . بۇ ئىرسىيەتلىك ئۆزگىرىش بولماستىن ، پەر-
ۋىش قىلىپ باشقۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك فىزىئولوگىيىلىك
ئۆزگىرىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .

شاپتۇل ئۇرۇقىنى قۇمساڭ ئەت تۇپراق ياكى يەر
ئاستى سۈيى تۆۋەن ، سۈيى يىغىلىپ قالمايدىغان مۇنبەت
يەرلەرگە تېرىش كېرەك . ئۇرۇق تېرىلىدىغان يەرگە كۈن
نۇرى تەكشى چۈشۈشى ، يەر 4 — 5 مېتىر كىلوگرام ئوغۇت
تۈكۈلگەندىن كېيىن چوڭقۇر ئاغدۇرۇلۇپ ، تەكشى تۈزلە-
نشى ، ئۇرۇق بىخلىنىدۇرۇپ تەييارلانغاندىن كېيىن ، ئەت-
يازدا (3 - ئاينىڭ 25 - كۈنلىرىدىن 4 - ئاينىڭ
5 - كۈنلىرىگىچە) ئوسغا تېرىلىشى كېرەك . تېرىش
چوڭقۇرلۇقى 4 — 6 سانتىمېتىر ، تۈپ ئارىلىقى 8 —
10 سانتىمېتىر ، قۇر ئارىلىقى 50 سانتىمېتىر بولسا
مۇۋاپىق بولىدۇ . ئادەتتە 1 مو يەرگە ساپ ئۇرۇقتىن
40 — 45 كىلوگرام سېلىنسا بولىدۇ .

5. كۆچەتلەرنى پەرۋىش قىلىش

مايسا ئۈنۈپ ئالدى - كەينى تەڭشەلگەندىن كېيىن ،
ئوتغۇچ بىلەن ئوتاپ ، ئوت - چۆپلەرنى ئېلىۋېتىش ، ماي-
سىلارنى قۇرت كېسىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە يېنىك سۇ-
غىرىپ بولغاندىن كېيىن دورا چېچىپ يوقىتىش تەدبىرلە-
رنى قوللىنىش لازىم . كۆچەتلەرنى ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە
مايسا ۋاقتىدا كۆپ سۇغارماسلىق كېرەك . ئەگەر تۇپراق-
نىڭ نەملىكى زىيادە كۆپ بولسا ، كۆچەتلەرنىڭ يوپۇرماق-

لىرى قورۇلۇپ قالدۇ ، ھەتتا ئاق تۇزان كېسىلىگە ئاسانلا ئۇچراپ كېتىدۇ . كۆچەتلەرنى ھەر قېتىم سۇغارغاندا ، 4 — 5 كۈن ئۆتكەندىن كېيىنلا دەرھال چاناپ تۈۋىنى يۇمشىد . تىپ ، ھاۋا ئالمىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈشى لازىم . كۆچەت - نىڭ ئېگىزلىكى 20 سانتىمېتىردىن ئاشقاندا ئاز - ئازدىن ئازوتلۇق ئوغۇت بىلەن قوشۇمچە ئوغۇتلاپ دەرھال يېنىك سۇغىرىش ، 7 - ئايلاردا بىر قېتىم ، 8 - ئايلاردا بىر قېتىم فوسفورلۇق ، كالىيلىق ئوغۇتلارنى ياخشى چىرىگەن قوي قىغى ، توخۇ - كەپتەر مايىقى قاتارلىق ئوغۇتلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قوشۇمچە ئوغۇتلاش ، خىمىيىلىك ئوغۇتلار - نىڭ مىقدارى ئىككىنچى ، ئۈچىنچى قېتىمدا 12 — 15 كىلوگرام ئەتراپىدا بولۇش ، ئوغۇتنى كۆچەتكە 15 سانتىمېتىر يىراقلىقتىن تاپ ئېچىپ بېرىش لازىم . كۆچەتلەر مايسا مەزگىلىدە كېسەللىك ، ھاساراتلارنىڭ زىيىنىغا كۆپ ئۇچرايدۇ . بۇ ۋاقىتتا روگور قاتارلىق دورىلارنى مۇۋاپىق نىسبەتتە تەڭشەپ چېچىش لازىم . قىش كىرىشتىن ئىلگى - رى قىشلىق پەرۋىشنى كۈچەيتىپ ، كۆچەتلەرنىڭ ئۇششۇپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ، ئەڭ ياخشىسى توپا بىلەن كۆمۈپ قىشتىن ئۆتكۈزۈش كېرەك .

ئەلا سورتلۇق شاپتۇل دەرەخلىرىنىڭ ئۇرۇقىنى تې - رىپ كۆچەت يېتىشتۈرگەندىن باشقا ، ئادەتتىكى سورتلار - نىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈپ ، ئۇنىڭغا ھەر خىل ئەلا سورتلارنى ئۇلاپ سورت ياخشىلاشقىمۇ بولىدۇ .

Ⅱ باب قەلەمچە تەكش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش

قەلەمچە تەكش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش جىنسىز كۆپەيتىش ئۇسۇللىرىنىڭ بىرى بولۇپ ، بۇ ئۇسۇل شىنجاڭدا 60 - يىللاردىن كېيىن كېڭەيتىلگەن . ئۇزاق يىللىق ئىلمىي تەتقىقات ، پەن - تېخنىكا ئىسلاھاتى ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش روھى ۋە تېخنىكا كېڭەيتىش مەشغۇلاتلىرىنىڭ تۈرتكىسىدە ، بۇ ئۇسۇل بىلەن كۆچەت يېتىشتۈرۈش تېخىمۇ ئىلغارلىققا ۋە زامانىۋىلىشىشقا قاراپ يۈزلەنمەكتە .

بۇ ئۇسۇلنىڭ مەشغۇلاتى ئاددىي ، قوللىنىلىشى ئاسان ، سەرپىياتى تۆۋەن ، ئۈنۈمى يۇقىرى ، كۆچەت يېتىشتۈرۈش ۋاقتى قىسقا ، قوللىنىلىدىغان دەرەخ تۈرى كۆپ بولۇپ ، ئەلا سورتلۇق مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىنى يېتىشتۈرۈشتە ھەم ئاساسلىق ، ھەم ئىلغار ئۇسۇل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ . بۇ خىل ئۇسۇلدا يېتىشتۈرۈلگەن كۆچەتلەر ئانا تۈپلەرنىڭ ئەسلىدىكى خۇسۇسىيىتىنى (سورت ۋە سۈپىتىنى) ساقلاپ قالالايدۇ . شۇنداقلا كۆچەتلەرنى تېز ۋە سۈپەتلىك ئۆستۈرۈپ ، مېۋىلىك باغ بەرپا قىلىشقا ئېھتىياجلىق سورتلۇق كۆچەتلەرنىڭ مەنبەسىنى كېڭەيتكىلى

بولىدۇ . بۇ ئۇسۇل بىلەن چىلان ، ئانار ، ئەنجۈر ، ئۈزۈم ، قىزىلگۈل ، ئاق جىگدە ، بېھى قاتارلىق مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىنى تېز يېتىشتۈرۈپ چىقىلى بولىدۇ .

1 . چىلان نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش

سورتلۇق چىلان كۆچىتى ئۇرۇق (مېغىز) تېرىپ يېتىشتۈرۈلگەندىن باشقا ، نوتىسىنى قەلەمچە قىلىش ، يىل-تىزىنى قەلەمچە قىلىش ، ئۇلاش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق يېتىشتۈرۈلىدۇ .

1 . نوتا يىغىش ۋە قەلەمچە كېسىپ تىكىش
ئەلا سورتلاردىن كېسەللىك ، زىيانداش ھاشاراتلارنىڭ زىيىنىغا ئۇچرىمىغان ، ساغلام ئۆسۈپ يېتىلگەن 1 — 2 يىللىق ياغاچلاشقان شاخلار ۋە شۇ يىلى ئۆسۈپ يېتىلگەن يېرىم ياغاچلاشقان يۇمران نوتىلار يىغىپ تەييارلىنىدۇ . قەلەمچە تىكىش قاتتىق شاخنى قەلەمچە قىلىش ، يۇمران نوتىنى قەلەمچە قىلىش ، يىلتىزنى قەلەمچە قىلىش دەپ ئۈچ خىلغا ئايرىلىدۇ . قەلەمچە تىكىش ئۇسۇلى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن ، يىغىپ تەييارلىنىدىغان نوتىلارنىڭ خۇ-سۇسىيەتلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ .

1) ياغاچلاشقان شاخنى قەلەمچە قىلىش . چىلان دەرە-خى بىخلىنىشتىن ئىلگىرى 1 — 2 يىللىق ياغاچلاشقان

ساغلام شاخلارنى تاللاپ ، 15 — 20 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇق-
تا ، ئۈستىنى تۈز ، ئاستىنى قىيپاش كېسىپ ، ھەر 50
تال قەلەمچە بىر باغلام قىلىپ باغلىنىدۇ . يىلتىز چىقىد-
رىشنى تېزلىتىش ئۈچۈن ، قەلەمچىنىڭ تۆۋەن تەرىپىنى
100ppm لىق ئىندولىبوتىك كىسلاتاسى ياكى 100ppm لىق
ABT يىلتىز تارتقۇزۇش ئۈنتوقىغا (1 گرام دورىغا 10
كىلوگرام سۇ قوشۇلىدۇ) 10 سائەت چىلاپ سۈزۈۋالغان-
دىن كېيىن ، توك بىلەن ئىسسىتىش چۆنىكىدە قەلەمچە-
نىڭ $2/3$ قىسمى قۇمغا كۆمۈلۈپ ، چۆنىكىنىڭ تېمپېراتۇ-
رىسى $25^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ تا كونترول قىلىنىدۇ . قۇمنىڭ نەملىكى
50% ئەتراپىدا بولىدۇ . 20 — 30 كۈندىن كېيىن ،
قەلەمچىنىڭ ئاستى تەرىپىدىكى كېسىلگەن جايىدىن
توقۇلمىلار ئۆسۈپ چىقىدۇ . بۇ چاغدا ئۇنى ئېتىزغا
ئېلىپ چىقىپ ، يەر ئۈستىدە بىر تال بخ قالدۇرۇپ
تىكسە ۋە ۋاقتىدا سۇغارسا ، بىر ئايدىن كېيىن بخ
سۈرۈپ چىقىدۇ .

2) يۇمران نوتىنى قەلەمچە قىلىش . 6 - ئاي-
دىن 8 - ئايغىچە يۇمران نوتىنى قەلەمچە قىلىپ تىكسە
كۆكلەش ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ . بۇنىڭ كونكرېت ئۇسۇلى
تۆۋەندىكىچە : شۇ يىلى ئۆسۈپ چىقىپ يېرىم ياغاچلاشقان
يۇمران چىلان نوتىسى تاللاپ كېسىۋېلىنىپ ، 15 سانتىمې-
تىر ئۇزۇنلۇقتا ئۈچىدىن بىر تال يوپۇرماق قالدۇرۇپ
توغراپ ، ھەر 50 تېلى بىر باغلام قىلىپ تەييارلىنىدۇ .
تۆۋەن تەرىپى 2 — 3 سانتىمېتىرغىچە 200PPm لىق ABT
يىلتىز تارتقۇزۇش ئۈنتوقىغا ئىككى سائەت (50PPm لىق

بولسا 8 سائەت) چىلاپ ، ئۈستىدىن سايە چۈشۈرۈپ تەييار-
 لانغان قۇمىسىدىن يەرگە (1 كىۋادرات مېتىر يەرگە
 320 — 350 تال) سىنجىپ تەكشۈرۈلۈپ ، پارنىك
 تېمپېراتۇرىسى 25 — 30 °C ، پارنىكنىڭ نەملىكى
 90% ئەتراپىدا بولىدۇ . مۇشۇنداق شارائىت ئاستىدا ،
 كېسىلگەن ئورۇن 30 كۈندە پۈتۈپ ، توقۇلما يىلتىزلار
 ئۆسۈپ چىقىدۇ . بۇ ئۆسۈل بىلەن كۆچەت يېتىشتۈرۈش ،
 يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا ، ئۇنىڭ ئۈستىگە يوپۇرماقلىق يۈم-
 ران نوتا بىلەن ئېلىپ بېرىلغاچقا ، نەملىكنىڭ پارغا ئايلى-
 نىشى ۋە يەرگە سىڭىپ كېتىشى تېز بولىدۇ . شۇڭا ، ھەر
 1 سائەتتە بىر قېتىم دورا چېچىش ماشىنىسىدا تۇمانلىتىپ
 سۇ پۈركۈپ تۇرۇش لازىم . يىلتىز چىقارغاندىن كېيىن ،
 ئىككى سائەتتە بىر قېتىم سۇ پۈركۈسۈمۈ بولىدۇ . شۇنىڭ-
 غا دىققەت قىلىش لازىمكى ، قەلەمچە قىلىنىدىغان نوتىلار-
 نى ھاۋا سۆرۈن ۋاقىتلاردا ، ئەتىگەن - كەچلەردە ئېلىش
 ۋە قەلەمچە قىلىش كېرەك . كۆچەتلەرنى ئېتىزلارغا
 كۆچۈرۈپ تەكشۈرۈش ، ھاۋا تۇتۇق كۈنلىرى كەچ تەرەپ-
 لەردە كۆچۈرۈپ ، ۋاقىتتا ئاز سۇ باشلاپ تەكشى سۇ-
 غىرىش كېرەك .

(3) يىلتىزنى قەلەمچە قىلىش . چىلاننىڭ يىلتىزنى
 قەلەمچە قىلىشتا ، ئەسلىدە ئەلا سورتلۇق چىلاننىڭ ئۇرۇ-
 قىدىن تېرىپ ئۆستۈرۈلگەن سەككىز يىللىقتىن يۇقىرى
 ئۆسۈش تارىخىغا ئىگە ئانا تۈپلەر تاللىۋېلىنىدۇ . ئادەتتىكى
 يەرلىك سورتلارنى ئۇلاق ئاستى قىلىپ ، ئەلا سورتلارغا
 ئۇلىغان تۈپلەرنى يىلتىز قەلەمچىسى قىلىشقا تاللىماسلىق

لازم . يىلتىزنى قەلەمچە قىلىپ تىكىش ئۇسۇلى تۆۋەندى -
كىچە :

ئەتىياز پەسلىدە (3 - ئاينىڭ 25 - كۈنلىرىدىن
4 - ئاينىڭ 10 - كۈنلىرىگىچە) ئۇرۇقتىن ئۆسۈپ يېتىلگەن
8 — 10 يىللىقتىن يۇقىرى ئەلا سورتلۇق چىلان دەرەخلە -
رىنىڭ يىلتىز ئەتراپىنى كولاپ ، دىئامېتىرى 3 — 4
سانتىمېتىردىن يۇقىرى بولغان چاچما يىلتىزلىرىنى
ئارىلاپ كېسىۋالغاندىن كېيىن ، 12 — 15 سانتىمېتىر
ئۇزۇنلۇقتا توغراپ قەلەمچە قىلىپ ، ھەر 50 تېلى بىر
باغلام قىلىنىدۇ . قەلەمچىلەر تىكىلىشتىن ئىلگىرى ھۆل
قۇمغا كۆمۈپ ساقلىنىدۇ . 4 - ئاينىڭ 12 — 15 - كۈنلىرى
ئەتراپىدا ئاق يەرگە تاپ ئېچىپ ، قۇر ئارىلىقى 50 سانتى -
مېتىر ، تۈپ ئارىلىقى 15 سانتىمېتىر قىلىپ رەتلىك
تىكىلگەندىن كېيىن ، كۆمۈپ ئىككى تەرىپى دەسسەپ چىڭ -
دىلىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ئاز سۇ باشلاپ كىچىك ئېرىقلار
بويىچە قاندۇرۇپ سۇغىرىلىدۇ . تۇپراقنىڭ نەملىكى نور -
ماللاشقاندىن كېيىن ، ئۈستىگە سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ ، نەم -
لىكىنى ساقلاپ ، تۇپراق تېمپېراتۇرىسى ئۆرلىتىلىدۇ .
25 — 30 كۈنگىچە پات - پات تەكشۈرۈپ تۇرۇپ ، قەلەم -
چىلەر بىخ سۈرگەندىن كېيىن ، ئۈستىدىكى سۇلياۋنى تې -
شىپ تۆشۈك ئېچىپ قويۇلىدۇ . يۇمران كۆچەتلەر سىرتقى
مۇھىتنىڭ تېمپېراتۇرىسىغا ماسلىشىپ بولغاندىن كېيىن
كەچ تەرەپتە سۇلياۋ ئېچىۋېتىلىدۇ . كۆچەتلەر 20 سانتى -
مېتىر ئېگىزلىكتە ئۆسكەندىن كېيىن سۇغىرىلىپ ، تۈ -
ۋى يۇمشىتىلىپ ، ئاز مىقداردا ئازوتلۇق ئوغۇتلار بىلەن

قوشۇمچە ئوغۇتلىنىدۇ . بۇنىڭدىن باشقا چىلان دەرىخىنىڭ توقۇلمىسىدىن كۆچەت يېتىشتۈرۈشكە بولىدۇ .

2 . پەرۋىش قىلىش

چىلاننى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش مەشغۇلاتى بىرقەدەر مۇرەككەپ بولۇپ ، ئۇنىڭ بىخ چىقىرىپ كۆچەت بولۇپ يېتىلىشىگە كۆپرەك ئەجىر سىڭدۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ . شۇڭا ، ئۇنى ياخشى پەرۋىش قىلىپ باشقۇرۇش لازىم . بۇنىڭ ئۈچۈن :

1) سۇغىرىپ بولغاندىن كېيىن تۇۋىنى يۇمشىتىپ ، ئوتىنى ئوتاپ ، تۇپراقنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى ئۆرلەش ، بىر يىلدا 8 — 10 قېتىم سۇغىرىپ ، 5 — 6 قېتىم تۇۋىنى يۇمشىتىپ ئۆسۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىم .

2) كۆچەتلەر مايسا مەزگىلىدە 2 — 3 قېتىم دورا چېچىپ ، كېسەللىك ، ھاساراتلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ، تۈپ-راقنى ياخشى دېزىنېكسىيە قىلىپ ، يەر ئاستى زىيانداش ھاساراتلىرىنىڭ زىيىنىدىن مۇداپىئە كۆرۈش كېرەك .

3) كۆچەتلەرنى بىر يىلدا ئۈچ قېتىم ، ھەر قېتىمدا مۇۋاپىق مىقداردا خىمىيەۋى ئوغۇتلار بىلەن قوشۇمچە ئوغۇتلاپ ، كۆچەتلەرنىڭ بويىغا ئۆسۈشنى ۋە غولىنىڭ ياغاچلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىم .

4) ئۆشۈشكۈ ۋە سوغۇقتىن مۇداپىئە كۆرۈش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتىپ ، كۆچەتلەرنى قىشتىن بىدخەتەر ئۆتكۈزۈش لازىم .

2. ئانار نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش

ئانارنىڭ نوتىسىنى قەلەمچە تىكىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش — ئانار دەرىخىنى كۆپەيتىشنىڭ ئاساسلىق ئۇسۇلى . بۇ ئۇسۇل بىلەن يېتىشتۈرۈلگەن كۆچەتلەر ئىلمىي ئۇسۇل بىلەن ياخشى پەرۋىش قىلىنسا ، بىر يىللىق كۆچەتنىڭ ئېگىزلىكىنى 1.80 مېتىرغا ، ئىككى يىللىق كۆچەتلەرنىڭ ئېگىزلىكىنى 2.50 مېتىرغا يەتكۈزگىلى ، 1مۇ يەردىن 7 — 8 مىڭ تۈپ سۈپەتلىك كۆچەت ئالغىلى بولىدۇ .

1. نوتا يىغىش

قەلەمچە تىكىش مەزگىلى يېتىپ كېلىشتىن ئىلگىرى ، قەلەمچە قىلىنىدىغان نوتىلارنى ئالدىن تەييارلاپ قويۇش لازىم . قەلەمچە نوتىسىنى ئېلىشتا ، ئالدى بىلەن قەلەمچە ئالىدىغان ئانا تۈپنى ياخشى تاللاش كېرەك . ئەگەر قەلەمچە نوتىسى غولىنىڭ شەكلى ناچار ، قاتاق ، چالداپ كەتكەن ، كېسەللىك ، زىيانداش ھاساراتلارنىڭ زىيىنىغا ئۇچرىغان دەرەخلەردىن ئېلىنسا ، كۆپەيتىلگەن ئەۋلادلار ئانا تۈپلەرنىڭ مۇشۇ خۇسۇسىيەتلىرىنى ساقلاپ قالىدۇ . شۇڭا ، قەلەمچە قىلىنىدىغان نوتىلارنى تاتلىق ئانار دەرىخىنى تاللاپ ، مېۋىسى چوڭ ، پوستى نېپىز ، تەمى ياخشى ، بولۇق مېۋە بېرىپ كەلگەن ، غولىنىڭ شەكلى (سۈپىتى)

ياخشى ، كېسەللىك ۋە ھاساراتلارنىڭ زىيىنىغا ئۇچرىمىغان ساغلام تۈپلەردىن قاچا بىلەن كېسىپ ئېلىش كېرەك . ئۇنىڭدىن باشقا ، قەلەمچە ئارقىلىق ئۆستۈرۈلگەن كۆچەت-لەرنىڭ يىلتىز ۋە غولىدىن ئۆسۈپ چىققان 2 — 3 يىللىق نوتىلاردىن ياخشىلىرىنى تاللاپ كېسىۋېلىش لازىم . ئومۇ-مەن ، تېمەن ، بوغۇم ئارىلىقى قىسقا ، توم ئۆسكەن نوتىلار ۋە قوشۇمچە ئوغۇت بەرگەن ئانا تۈپلەردىن ئۆسۈپ چىققان نوتىلارنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبى مول ، ھاياتى كۈچى كۈچ-لۈك بولغانلىقتىن ، ئۇنىڭدىن ئېلىنغان نوتىلار قەلەمچە قىلىپ تىكىلسە ، ئاسان كۆكلەيدۇ ۋە تېز ئۆسىدۇ . ئادەت-تىكى ئەھۋالدا دەرەخ غولىنىڭ تۆۋەن قىسمىدىن ئۆسۈپ چىققان توم ، بىخ ئارىلىقى قىسقا ، ساغلام ، ئۆسۈپ يېتىل-گەن نوتىلارنىڭ ئۆسۈشى بىرقەدەر ياخشى بولىدۇ . قەلەمچە قىلىنىدىغان نوتىلار كۈزدە ئانارنى كۆمۈش-تىن ئىلگىرى (11 - ئاينىڭ 20 - كۈنلىرىدىن كېيىن) ياكى ئەتىيازدا كۆمۈكتىن ئاچقاندىن كېيىن قاچا بىلەن كېسىۋېلىنىدۇ . ئەتىياز پەسلىدە كېسىلگەن نوتىلاردىن تەييارلانغان قەلەمچىلەرنىڭ كۆكلەش نىسبىتى كۈزدە كې-سىۋېلىنغانلىرىدىن يۇقىرى بولىدۇ . ئەگەر كۈز پەسلىدە ئانارلىق باغلارغا توك ياتقۇزۇپ كۆمۈلگەن بولسا ، نوتىنى ئەتىياز پەسلىدە كېسىۋالسا ، توك ياتقۇزۇلمىغان بولسا ، كۈز پەسلىدە كېسىۋالسا ئۈنۈمى ھەقىقەتەن ياخشى بولىدۇ . ئەگەر نوتىلار كۈز پەسلىدە كېسىۋېلىنغان بولسا ، شۇ ھامان توغراپ قەلەمچە قىلماستىن ، پەقەت تىكەن ، ئۆش-شاق شاخ - پۇتاقلىرىنى كېسىۋېتىپ ، ھەر 100 تال نوتە-

نى بىر باغلام قىلىپ ، ئۆرەككە سېلىپ پاكىز قۇرۇق قۇم بىلەن كۆمگەندىن كېيىن ، سۇ قۇيۇپ توغلىتىش لازىم . ئەگەر ئەتىياز پەسلىدە ئانارنى كۆمۈكتىن ئاچقاندىن كېيىن نوتا ئېلىنغان بولسا ، ئالدى بىلەن ھۆل توپىغا قېلىن كۆمۈپ ساقلاپ ، قەلەمچە تىكىش مەزگىلى يېتىپ كەلگەندە ئاندىن توغراپ قەلەمچە قىلىش لازىم .

2. نوتىلارنى ساقلاش ۋە قەلەمچە توغراش

كۈز پەسلىدە يىغىپ تەييارلانغان نوتىلار مەخسۇس ئورا كولاپ ساقلىنىدۇ . كۈن نۇرى چۈشمەيدىغان جايدىن چوڭقۇرلۇقى 1 مېتىر ، كەڭلىكى 1.5 مېتىر قىلىپ ئورا كولىنىدۇ . ئورنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى قەلەمچىنىڭ ئاز - كۆپلۈ - كىگە قاراپ بەلگىلىنىدۇ . نوتىلارنىڭ ئۇچى قىرقىپ تاش - لىنىپ ، ئۇزۇن - قىسقىلىقى تەڭشەلگەندىن كېيىن ، باغ - لىمى بويىچە ئورغا توغرىسىغا ياتقۇزۇپ تىزىلىدۇ ، ئۈست - تىگە بىر قەۋەت قۇرۇق ياكى نەم قۇم تۆكۈپ نوتا ئارىسىد - ىدىكى بوشلۇق تولدۇرۇلغاندىن كېيىن تەكشى تۈزلىنىدۇ . ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە بىر قەۋەت نوتا تىزىلىپ ، قۇم قوشۇپ نوتا ئارىسىدىكى بوشلۇق تولدۇرۇلىدۇ ، ئىككىنچى رەت نوتا ئۈستىدىكى قۇمنىڭ قېلىنلىقى 20 سانتىمېتىر بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ . نوتىلارنىڭ كۆمۈلۈشى ئورنىنىڭ ئۈستىد - ىدىن 20 سانتىمېتىر ئەتراپىدا پەس بولۇشى ، قۇم بىلەن كۆمۈلۈپ بولغاندىن كېيىن تەكشى تۈزلەپ چىڭدىلىشى كېرەك . ئورغا قاتتىق سوغۇق بولغان كۈنلەردە (12 - ئاينىڭ باشلىرىدا) چىڭقاپ سۇ قۇيۇپ ، توك ياتقۇزۇپ ،

12 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا ئورنىنىڭ ئۈستىگە 20 — 30 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا قۇرۇق توپا تۆكۈپ تەكشى تۈزلەش كېرەك . بۇنداق قىلىش ئەتىياز پەسلىدە توك ئېرىش ۋاقتىنى كەينىگە سۈرۈپ ، نوتلارنىڭ ئوردا بالدۇر بىخلىدىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا پايدىلىق .

ئانار قەلەمچىلىرى ئەتىياز پەسلىدە قانچە ئۇزاق كېچىكتۈرۈپ تىكىلسە ، ئۇنىڭ كۆكلەش ئۈنۈمى شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ . شۇڭا ، كۆمۈلگەن نوتلارنى ئەتىياز پەسلىدە كېچىكتۈرۈپ ئېچىپ (4 - ئاينىڭ 5 — 10 - كۈنلىرى) توغراپ قەلەمچە قىلغاندىن كېيىن ، كۈن نۇرى چۈشمەيدىغان (قاراڭغۇ) يەردە 1 سوتكا سۈزۈك سۇغا چىلاپ ئاندىن تىكسە ، كۆكلەش نىسبىتى تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ . قەلەمچىلەرنىڭ ئوردا تۈرۈپ بالدۇر بىخلىنىپ قېلىش مۇمكىنچىلىكى بولسا ، بالدۇرراق قەلەمچە قىلىپ تىكسىمۇ بولىدۇ .

ئانار قەلەمچىسىنى توغراشتا ئانار قەلەمچىسى تىكىلدىغان يەرنىڭ سۇ ، تۇپراق شارائىتىغا قاراپ تۇغراش كېرەك . تۇپراقنىڭ تېگى مۇنبەت ، سېغىز ئارىلاش بولسا ۋە سۇغىرىش شارائىتى ياخشى بولۇپ ، بىر يىلدا قەلەمچىلەرنى 10 — 12 قېتىم سۇغىرىش مۇمكىن بولسا ھەم قەلەمچە تىكىلگەندىن كېيىن سۇلياۋ يوپۇق يېپىش پىلانلانغان بولسا ، ئۇ ھالدا قەلەمچىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى 10 — 12 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا توغرىسىمۇ بولىدۇ . ئەگەر بۇ خىلدىكى يەرلەرگە قەلەمچە تىكىلگەندىن كېيىن سۇلياۋ يوپۇق يېپىلمايدىغان بولسا ، قەلەمچىنى 15 — 16 سانتىمېتىر

ئۇزۇنلۇقتا توغراش كېرەك .
قەلەمچە تىكىدىغان يەر قۇم تۇپراق ، مەرئ ، مەلۇم
شور تەركىبى بار يەرلەر بولسا ، قەلەمچىنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى
18 — 20 سانتىمېتىر ئەتراپىدا توغراش كېرەك . قەلەم-
چىنى توغرىغاندا ئۇچىدىن ساغلام يېتىلگەن بىر تال بىخ
(بىرىنچى بىخ) قالدۇرۇلىدۇ . قەلەمچىلەرنى توغرىغاندا
قاچا بىلەن توغراش ، باشقا تۆمۈر ئەسۋابلار بىلەن توغرى-
ماسلىق لازىم .

3 . يەر تاللاش ۋە يەر تۈزلەش
ئانار قەلەمچىسى تىكىش ئۈچۈن ، قاتناش شارائىتى
ياخشى ، يەر تۈزۈلۈشى تەكشى ، يانتۇلۇق پەرقى تۆۋەن ،
سۇ مەنبەسى تولۇق ، سۈيى راۋان ، تۇپرىقى يۇمشاق ، قۇم-
ساڭا ئەت تۇپراق ياكى مۇنبەت تۇپراق ، كۈن نۇرى تولۇق
ۋە تەكشى چۈشىدىغان ، ھاۋاسى ياخشى ، قۇرغاق ، سۇ
ئورنى تۆۋەن يەرلەر تاللىنىدۇ ھەمدە ھەر مو يەرگە
50 — 60 تاغاردىن (5 — 6 مىڭ كىلوگرام) ياخشى
چىرىگەن سۈپەتلىك قوي قىغى تۆكۈپ ، 24 — 25 سانتى-
مېتىر چوڭقۇرلۇقتا يۇمشاق ئاغدۇرۇلىدۇ . يەر ئاغدۇرۇ-
لۇپ ، قىرلار سېلىنىپ بولغاندىن كېيىن ، يەر تەكشى
تۈزلىنىپ ، تارماق بىلەن ئېتىزلاردىكى ئوت - چۆپ ۋە
زىرائەت يىلتىزلىرى پاكىز تازىلىۋېتىلىدۇ .

4 . قەلەمچە تىكىش
1) نوتىسىدىن قەلەمچە تىكىش . ئانار قەلەمچىسى

ئىلگىرى 3 - ئاينىڭ 25 — 30 - كۈنلىرى ئارىلىقىدا تىكلەتتى، ھازىر 4 - ئاينىڭ 10 — 15 - كۈنلىرى ئەتراپىدا تىكلەسە، قەلەمچىلەرنىڭ كۆكلەش نىسبىتىنى %95 تىن ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقى ئىسپاتلاندى. بۇنىڭ ئۈچۈن ئوردا توڭلىتىلغان نوتلارنىڭ ئېرىش مۇددىتىنى 4 - ئاينىڭ 8 — 10 - كۈنلىرىگىچە كەينىگە سۈرۈش لازىم. ئەتىيازدا كېسىپ يىغىۋېلىنغان نوتلارنى ۋاقىتىنچە ھۆل توپىغا كۆمۈپ ساقلاپ، ئېتىزغا تىكىش ۋاقتىدا توغ-راش كېرەك.

قەلەمچىنى تۈزلەپ چۆنەك تارتىلغان ئاق يەرگە ساند-جىپ تىكىپ، ۋاقتىدا سۇغىرىپ، 4 — 5 كۈندىن كېيىن ئۈستىگە سۇلياۋ يېپىپ، قەلەمچىنىڭ ئۈچىنى بىر تال بىخ بىلەن سۇلياۋنىڭ تېشىغا چىقىرىپ قويۇش كېرەك. قەلەم-چىلەرنى تىكىشتىن ئىلگىرى قەلەمچىلەرنى كۆلچەك، چوڭ تۇڭ ياكى ئىدىشلارغا قاچىلاپ 1 سوتكا سۈزۈك سۇغا چىلىغاندىن كېيىن، ئۇدۇللۇق سۈزۈۋېلىپ، ئۇدۇللۇق تىكىش لازىم. ئانار قەلەمچىلىرى ئادەتتە چۆنەك ئۈستىگە تىكىلىدۇ. چۆنەكنىڭ كەڭلىكى 1 مېتىر، ئېگىز-لىكى 8 — 10 سانتىمېتىر بولۇشى، قۇر ئارىلىقى 30 سانتىمېتىر (بىر چۆنەككە ئۈچ رەت) دىن ئۈچ قوش تاپ، چۆنەك ئېرىقنىڭ كەڭلىكى (يەككە تاپ) 60 سانتىمې-تىر، تۈپ ئارىلىقى 10 سانتىمېتىر بولۇشى، قەلەمچە تىكىلىپ بولغاندىن كېيىن، شۇ كۈنى قاندۇرۇپ سۇغىرىد-لىشى كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا قەلەمچىنى چۆنەك تارتماي تۈز يەرگە تىكىشكىمۇ، ئوسىغا تىكىشكىمۇ بولىدۇ، ۋاقىت

جەھەتتىن كۈزدە تىكشىكىمۇ ياكى ئەتىياز پەسلىدە تىكىش-كىمۇ بولىدۇ. قانداق ۋاقىتتا، قانداق ئۇسۇل بىلەن تىكشىنى جايلار ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىسە بولىدۇ.

2) يىلتىزنى قەلەمچە قىلىش. ئانار دەرىخىنىڭ يىلتىزنى قەلەمچە قىلىپ تىكسىمۇ كۆكلەش ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ. ئانار دەرىخىنىڭ يىلتىزنى قەلەمچە قىلىشتا، 13 — 15 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا توغراپ، قۇر ئارىلىقىنى 40 سانتىمېتىر، تۈپ ئارىلىقىنى 10 — 12 سانتىمېتىر قىلىپ تىكىش كېرەك. تۇپراقنىڭ يۇمشاقلىقى، نەملىكى، قۇۋۋەتلىك بولۇشى ۋە ئىسسىقلىق ئۆتكۈزۈشچانلىقى كۆچەتنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىدىكى ئىچكى ئامىل بولۇپ، ئۇنىڭغا ياخشى پەرۋىش قىلىپ باشقۇرۇشتىن ئىبارەت تاشقى ئامىل قوشۇلسا، قەلەمچىلەرنىڭ بىخ سۈرۈش، يىلتىز چىقىرىش ۋە ئۆسۈش سۈرئىتىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ.

5. كۆچەتلەرنى پەرۋىش قىلىپ باشقۇرۇش
ئانار كۆچەتلىرىنى پەرۋىش قىلىش سۇغىرىش، تۈپ-سىنى بوشىتىش، دورا چېچىش، قوشۇمچە ئوغۇتلاش، پۇتاش، ئوتاش، كۆمۈپ قىشتىن ئۆتكۈزۈش مەشغۇلات تەرتىپلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

1) سۇغىرىش. قەلەمچىدىن يېتىشتۈرۈلگەن كۆچەتلەر بىر يىلدا 6 — 8 قېتىم سۇغىرىلسا، ئەڭ ئاخىرقى سۈيى 9 - ئاينىڭ ئاخىرىدا توختىتىلىپ، 11 - ئاينىڭ

ئوتتۇرىلىرىدا توك سۈيى قويۇلسا بولىدۇ . 7 - ، 8 -
ئايلىرىدا ھەر 20 — 25 كۈندە بىر قېتىم سۇغىرىپ ، ھەر
قېتىم سۇغارغاندا تۇۋىنى چاناپ يۇمشىتىش لازىم . سۇغى-
رىشتا ، ئەڭ مۇھىمى تۇپراقنىڭ قۇرۇلمىسى ، تېمپېراتۇ-
رىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكى ، كۆچەتلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھ-
ۋالىغا قارىسا بولىدۇ . قۇم تۇپراقلىق يەرگە تىكىلگەن
قەلەمچىلەر 1 - 2 قېتىم كۆپرەك سۇغىرىلسمۇ بولىدۇ .
قەلەمچىلەر مايسا مەزگىلىدە سۈزۈك سۇ باشلاپ نېپىز
سۇغىرىش ، سېغىز ، لاتقا سۇ بىلەن سۇغارماسلىق
كېرەك .

2) تۇۋىنى يۇمشىتىش . كۆچەتلەر مايسا مەزگىلىدە
تۇۋىنى ئوتغۇچ بىلەن بوشتىش ، كېيىن كەتمەن بىلەن
بوشتىپ ، بىر يىلدا كۆچەتلەرنىڭ ئەتراپىنى 5 — 6
قېتىم چاناپ ھەم نەملىكىنى ساقلاش ، ھەم تۇپراق تېمپې-
راتۇرىسىنى ئۆستۈرۈش لازىم .

3) دورا چېچىش . كۆچەتلەر 25 — 30 سانتىمېتىر
ئۆسكۈچە كېسەللىك ، زىيانداش ھاشارلارنىڭ زىيىنىغا
ئۇچراپ تۇرىدۇ . بۇ مەزگىللەردە روگور ، ھاك - گۇڭ -
گۈرت بىرىكمىسى ۋە باشقا ئۈنۈملۈك دورىلارنى چېچىپ
كېسەللىك ، ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە يوقىتىش
كېرەك .

4) پۇتاش . قەلەمچىلەر ئۆسۈپ 15 — 20 سانتىمې-
تىر بولغاندا بىر تۈپ قەلەمچىدە بىر تال نوتا قالدۇرۇپ ،
ياندىن چىققان باشقا شاخلارنى پۇتاپ ئېلىۋېتىش
لازم . 7 - ، 8 - ئايلىرىدا ئاساسىي نوتىلارنىڭ غولىدىن

ئۆسۈپ چىققان قوشۇمچە شاخلارنىمۇ پۇتاپ ئېلىۋېتىپ ،
كۆچەتلەرنىڭ غول قىسمىنىڭ توملىشىشىنى ئىلگىرى
سۈرۈش كېرەك .

5) ئوتاش . كۆچەتلەر ئۆسۈۋاتقان مەزگىلدە سېرىق-
ئوت ، يۆگمەچ ، چىم ، قىياق قاتارلىقلارنىڭ زىيان سې-
لىشىغا كۆپ ئۇچرايدۇ . بۇلارنىڭ كۆچەتنىڭ ئۆسۈپ يېتى-
لىشىگە بولغان زىيىنى ئېغىر ، سېرىقئوت ، يۆگمەچ قا-
تارلىقلار كۆچەتلەرنى ئۆزئارا گىرەلەشتۈرۈپ ، ئۆسۈشنى
تەزگىنلەيدۇ . چىم - قىياق بولسا تۇپراقنى قاتۇرۇپ ھاۋا
ئالماشتۇرۇشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ . شۇڭا ، پات - پات ئو-
تاپ ، ئوت - چۆپلەرنىڭ كۆچەتلەرگە زىيان سېلىشىنىڭ
ئالدىنى ئېلىش لازىم .

6) قوشۇمچە ئوغۇتلاش . بىر يىللىق كۆچەتلەرنى
بىرىنچى قېتىم ئوغۇتلىغاندا ئازوتلۇق ئوغۇتتىن ھەر مو
يەرگە 5 كىلوگرام تەييارلاپ ، قوي قىغى ياكى مۇۋاپىق
مىقداردا توخۇ - كەپتەر مايىقى بىلەن (كۆچەتنىڭ يىلتىز-
دىن 10 سانتىمېتىر يىراقلىقتىن تاپ ئېچىپ) ئوغۇتلاش ؛
ئىككىنچى قېتىمدا 1 مو يەرگە 10 كىلوگرام فوسفورلۇق
ئوغۇت ، كۈنجىرە ، قۇرۇق گەندە ، قوي قىغى ، توخۇ -
كەپتەر مايىقى قاتارلىقلار بىلەن مۇۋاپىق ئوغۇتلاش ؛ ئو-
چىنچى قېتىملىق ئوغۇتنى 8 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بې-
رىش ، ئاساسلىقى كالىيلىق ئوغۇتلار بىلەن قوشۇمچە ئو-
غۇتلاش لازىم . ھەر قېتىم ئوغۇتلىغاندا تاپ ئېچىپ ۋە
تاپنى نۆۋەتلەشتۈرۈپ ئوغۇتلاپ ، دەرھال سۇغىرىش كې-
رەك . كۆچەتلەرنى قوشۇمچە ئوغۇتلىغاندا بىرىنچىدىن ،

ئوغۇتلاش ۋاقتى ؛ ئىككىنچىدىن ، ئوغۇت تۈرى ؛ ئۈچىنچە -
دىن ، ئوغۇتنىڭ مىقدارى ؛ تۆتىنچىدىن ، ئوغۇتلاش ئۇسۇل-
لىغا قاتتىق دىققەت قىلىش لازىم .

7) قىشتىن ئۆتكۈزۈش . ئانار كۆچىتى كۈز
پەسلىدە كۆمۈپ قىشتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ . ئادەتتە
11 - ئاينىڭ 15 — 25 - كۈنلىرىگىچە كۆمۈلسە مۇۋاپىق
بولىدۇ . كۆچەتلەرنى كۆمۈشتىن 15 — 20 كۈن ئىلگىرى
قاندۇرۇپ سۇغىرىپ ، تۇپراقنىڭ نەملىكى نورماللاشقاندىن
كېيىن ، ئاندىن كۆمۈش كېرەك . ئەگەر سۇغارغىلى بول-
مىسا ، كۆچەتنى يىلتىزى بىلەن قومۇرۇپ ، كۈن نۇرى
چۈشمەيدىغان يەردىن ئورا كولاپ ، ئورغا تىزىپ ، ئۈستىگە
قۇم تۆكۈپ كۆمۈپ ، سۇ قويۇپ توڭلاتسىمۇ بولىدۇ .
كۆچەتلەرنى كۆمگەندە زەخمىلىنىشتىن ساقلىدۇ .
نىش كېرەك .

8) كۆچەتلەرنى ئېچىش . ئانار كۆچەتلىرىنى ئەتىيازدا
3 - ئاينىڭ 20 — 30 - كۈنلىرىگىچە ، ئەگەر تېمپېراتۇرا
تۆۋەنلەپ ، ھاۋا تۇتۇلۇپ قالسا 4 - ئاينىڭ 5 - كۈنلىرىگە-
چە ئاچسا بولىدۇ . كۆچەتلەرنى ئاچقاندا توپىسىنى قول
بىلەن سىيرىپ ئېچىش ياكى كەتمەن بىلەن ئاۋايلاپ ئېچىش
كېرەك ، شاخلىرىنى تارتىپ سىلكىپ ئېچىشقا بولمايدۇ .
كۆچەتلەرنى ئېچىپ بولغاندىن كېيىن تۈۋىدىكى بوش توپە-
لارنى كەتمەن بىلەن سىيرىپ تەكشى تۈزلەش كېرەك .
ئانار كۆچەتلىرىنى ئەڭ ياخشىسى ئىككى يىللىق بولغاندا
(شۇ يىلى كۈز ، 3 - يىلى ئەتىيازدا) ئاندىن كۆچەتخانىدىن
چىقارسا ، ئورمان بىنا قىلىش ئۆلچىمىگە توشىدۇ .

3. ئەنجۈر نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ

كۆچەت يېتىشتۈرۈش

1. ئەلا سورتلارنى تاللاش

دۇنيا بويىچە ئەنجۈرنىڭ تارقالغان سورتلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ ، ئاپتونوم رايونىمىزدا ئۇنىڭ بەش خىل سورتى ئۆستۈرۈلىدۇ . بۇ بەش خىل سورتلارنىڭ تەبىئىي شارائىتىغا ماسلىشىشچانلىقى ، مېۋىسىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى ، پىششىق مەزگىلى ، مېۋىسىنىڭ سۈپىتى بىر - بىرىدىن روشەن پەرقلىنىدۇ .

ئەنجۈر دەرىخى ئاساسلىقى قەلەمچە قىلىش ، نوتا با - سۇرۇش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق كۆپەيتىلىدۇ . قەلەمچە تەكپ كۆپەيتىشتە ، ئالدى بىلەن ئەلا سورتلۇق دەرەخنى تاللاپ نوتا يىغىپ تەييارلاش لازىم . ھازىر جايلاردا ئاساسلىق ئۆستۈرۈلۈۋاتقان ئەنجۈر سورتلىرى تۆۋەندىكىچە :

1) تۇخۇمىسىمان سېرىق ئەنجۈر . بۇ سورتنىڭ مېۋىسى تۇخۇم شەكلىدە بولۇپ ، ئېتىمۇ ، پوستىمۇ سېرىق كېلىدۇ . مېۋە سۈپىتى ئوتتۇراھال ، يازلىق مېۋىسى 7 - ئاينىڭ ئالدى - كەينىدە ، كۈزلۈك مېۋىسى 8 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا پىشىدۇ . بۇ سورت ئاتۇش ، قەشقەر رايونلىرىدا ئۆستۈرۈلىدۇ .

2) كىچىك سېرىق ئەنجۈر . بۇ سورتنىڭ مېۋىسى كىچىك ، ساپىقى قىسقا ، پوستى سېرىق ، ئېتى قىلن ،

تەمى تاتلىق ، سۈپىتى بىرقەدەر ياخشى بولۇپ ، 7 - ئاي -
نىڭ ئاخىرلىرىدا پىششىقلاپ باشلاپ ، ئوششۇك تې -
گىشنىڭ ئالدى - كەينىدە پىشپ بولىدۇ . بۇ سورتىنى
زەيرەك تۇپراقلاردىمۇ ئۆستۈرۈشكە بولىدۇ . لېكىن ، مەھ -
سۇلات مىقدارى تۆۋەنرەك .

3) شىنجاڭ چىلگە ئەنجۈرى . بۇ سورتىنىكى ئەنجۈر
دەرەخلىرىنىڭ ئېگىزلىكى 6 — 16 مېتىرغىچە بولىدۇ ،
ئۇزاق يىل مېۋە بېرىدۇ . تۇپراق شارائىتى ياخشى بولسا
ھەمدە ئۇششۇكتىن مۇداپىئە كۆرۈپ ياخشى پەرۋىش قىلىن -
سا ، 200 يىلدىن ئارتۇق ئۆمۈر كۆرىدۇ . ئۇنىڭ مېۋىسى
چوڭ ، رەڭگى كۆركەم ، شەكلى ياپىلاقراق بولۇپ ، سۈي -
تى ياخشى ، ھەربىر دانىسىنىڭ ئېغىرلىقى 50 — 70
گرام كېلىدۇ . باشقا ئەنجۈر سورتلىرىغا سېلىشتۇرغاندا
مېۋىسى يۇمشاق ، تەمى تاتلىق بولۇپ ، مەھسۇلاتىمۇ ئەڭ
يۇقىرى . يازلىق مېۋىسى 7 - ئايلاردا ، كۈزلۈك مېۋىسى
8 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا پىشىدۇ . بۇ سورتىنىڭ
مۇھىت - شارائىتىغا ماسلىشىشچانلىقى ياخشى بولۇپ ، ئا -
تۇش ، قەشقەر ، خوتەن رايونلىرىدا ئۆستۈرۈلىدۇ .

4) شىنجاڭ سېرىق ئەنجۈرى . بۇ سورتىنىڭ مېۋىسى
ياپىلاقراق ، پوستى سېرىق ھەم سۈزۈك ، ئېتى يۇمشاق ،
تەمى تاتلىق ۋە شېرىن ، دەرىخى ناھايىتى باراقسان ئۆس -
ىدۇ . مەھسۇلاتى مول بولۇپ ، مېۋىسىنىڭ ئوتتۇرىچە ئې -
غىرلىقى 68.6 گرام ، ئەڭ چوڭلىرىنىڭ 76 گرامغىچە
كېلىدۇ . بۇ سورتىنىڭ يازلىق مەھسۇلاتى كەم ، كۈزلۈك
مەھسۇلاتى مول بولىدۇ . ئاتۇش ، قەشقەر ، خوتەن قاتارلىق

رايونلاردا ئۆستۈرۈلىدۇ .

5) شىنجاڭ چاغدا ئەنجۈرى . بۇ خىل سورتىنىڭ مېۋىسى ياپىلاق ، ساپىقىنىڭ تۈۋى كۈچلۈك ، ساپىقى ئۇزۇنراق ، پوستى سېرىق ھەم ئاق (دەرەخ تاجى ئارىسىدىكى كۈن نۇرى چۈشمىگەن مېۋىلەرنىڭ رەڭگى ئاق) كېلىدۇ . پىشقانلىرى ۋاقتىدا ئۇزۇپ بىر تەرەپ قىلىنمىسا پوستى قارىداپ ، يەرگە تۆكۈلۈپ كېتىدۇ . ئەمما ، بۇ خىل سورتىنىڭ سۈپىتى ياخشى ، تەمى تاتلىق بولۇپ ، ئەلا سۈپەتلىك سورت ھېسابلىنىدۇ . ئۇنىڭ يازلىق مېۋىسى 7 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا ، كۈزلۈك مېۋىسى ئۈششۈك تەككەنگە قەدەر پىشىدۇ . بۇ خىل سورت ئاتۇشنىڭ ئازاق يېزىسى ، قەشقەر كونىشەھەرنىڭ بەشكېرەم يېزىسىدا ئۆستۈرۈلىدۇ .

2 . يەر تەييارلاش

ئەنجۈر قەلەمچىسى تىكلەيدىغان يەر توپا قاتلىمى قېلىن ، مۇنبەت ياكى قۇمساڭغۇ ئەت تۇپراقلىق يەرلەردىن تاللىنىشى لازىم . ئالدى بىلەن كۈن نۇرى تەكشى چۈشۈشى ، سۇ مەنبەسى يېتەرلىك بولۇشى كېرەك ، سۇغىرىش ئاسان ، سۇ چىقىرىۋېتىش شارائىتى ياخشى بولۇشىمۇ مۇھىم . يەرنى تاللاپ بولغاندىن كېيىن ، ئوسا قىلىشتىن ئىلگىرى ھەر مو يەرگە 2000 — 2500 كىلوگرام ياخشى چىرىگەن ئېغىل قىغى تۆكۈپ ، يەرنى 25 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا يۇمشاق ئاغدۇرۇش لازىم . ئۇنىڭدىن كېيىن ، چالمدىلارنى ئېزىپ تەكشى تۈزلەپ (سۆرەم سېلىپ) ، ئوت - چۆپ ، زىرائەت يىلتىزلىرىنى تارماق

بىلەن پاك - پاكىز تازىلاش كېرەك . قەلەمچىنى چۆنەك ئېچىپ ئاق يەرگە تىكىپ سۇغارسىمۇ ياكى يەرنى تۈزلەپ تەييارلىغاندىن كېيىن ئوسا قىلىپ تىكىسىمۇ بولىدۇ . چۆ- نەك ئۈستىنىڭ كەڭلىكى 40 سانتىمېتىر ، چۆنەكنىڭ ئى- گىزلىكى 20 سانتىمېتىر بولۇشى ، قىر ۋە چۆنەكلەر تەك- شى ، تۈز سېلىنىشى كېرەك .

3 . نوتا تاللاش ۋە قەلەمچە كېسىش

قەلەمچە قىلىنىدىغان نوتىلار ئەتىياز پەسلىدە (ئەنجۈر دەرىخىنى ئاچقاندا) يىغىۋېلىنىدۇ . نوتا تاللاشتا ، ئىككى يىللىق پىشىپ يېتىلگەن شاخلار ۋە بىر يىللىق ساغلام ئۆسكەن شاخلار ئىچىدىن قىشتىن ياخشى چىققان ، كېسەل- لىك ، زىيانداش ھاشارلارنىڭ زىيىنىغا ئۇچرىمىغان ، بو- غۇم ئارىلىقى قىسقا ، بىخلىرى تولۇق ، تۈز ئۆسكەن سۈپەت- لىك نوتىلار تاللىنىپ ، قاچا بىلەن كېسىپ يىغىۋېلىنىد- دۇ . نوتىلارنى بىر ياقىتىن يىغىۋېلىپ ، 50 تالنى بىر باغلام قىلىپ ، كۈن نۇرى چۈشمەيدىغان سايە يەردە ، ۋاق- تىنچە ھۆل توپىغا كۆمۈپ ساقلاش لازىم . ئەگەر قەلەمچە قىلىنىدىغان نوتىلار كۈز پەسلىدە كېسىۋېلىنسا ، دەرھال سايە يەردىن 50 — 60 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا ئورا كولاپ ، ئورنىنىڭ تېگىگە 10 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا نەم قۇم تۆكۈپ ، نوتىلارنى تەكشى ، رەتلىك تىزغاندىن كېيىن نەم توپا بىلەن كۆمۈپ (نوتىنىڭ ئاستى 25 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا كۆمۈلىدۇ) قىشتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ . لېكىن ، كۈزدە كېسىپ يىغىۋېلىنغان قەلەمچىلەرنىڭ كۆكلەش

نسبىتى تۆۋەن ، نوتىلارنى كېسىش ، ساقلاش ، توغراش (قەلەمچە قىلىش) جەريانىدا ئىسراپچىلىق ئېغىر بولىدۇ . شۇڭا ، ئەڭ ياخشىسى ئەنجۈر نوتىلىرىنى ئەتىياز پەسلىدە كېسىپ يىغىۋېلىش كېرەك .

ئەنجۈر نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كېسىش ۋاقتى 4 - ئاينىڭ 10 — 20 - كۈنلىرىگىچە ، قەلەمچە - نىڭ ئۇزۇنلۇقى 20 — 22 سانتىمېتىر بولۇشى ، ھەربىر تال قەلەمچىدە ئۈچتىن يۇقىرى بىخ بولۇشى ، قەلەمچىنىڭ ئۈستى تۈز ، يەرگە سانجىلىدىغان تەرىپى قەلەم شەكلىدە بولۇشى كېرەك . ھەر 50 تال قەلەمچىنى بىر باغلام قىلىپ باغلاپ ، تىكىشتىن ئىلگىرى سۈزۈك سۇغا 3 — 4 سائەت چىلاپ ، سۇدىن ئۇدۇللۇق سۈزۈۋېلىپ تىكىش لازىم .

4 . قەلەمچە تىكىش

ئەنجۈر قەلەمچىسى ئادەتتە 4 - ئاينىڭ 10 — 20 - كۈنلىرىگىچە بولغان ئارىلىقتا تىكىلسە مۇۋاپىق بولىدۇ . ئەمما ، قەلەمچە قىلىنىدىغان نوتىلار ياخشى ساقلانغان بولۇشى (سېسىپ قالمىغان ، قۇرۇپ قالمىغان ، بالدۇر بىخلىنىپ قالمىغان بولۇشى) كېرەك . ئەڭ ياخشى ئۇسۇل — قەلەمچىنى بىر تەرەپتىن توغراپ ، بىر تەرەپتىن سۇغا چىلاپ ، بىر تەرەپتىن تىكسە ، كۆكلەش نسبىتىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ . قەلەمچە ئالدىن تەييارلانغان چۆنەك - كە قۇر ئارىلىقى 30 — 35 سانتىمېتىردىن ئىككى قوش رەت ، 60 سانتىمېتىر كەڭلىكتە بىر تاق رەت (ئەنجۈر قەلەمچىسى قىشتا كۆمۈلگەچكە بىر رەتنىڭ ئارىلىقى كەڭ -

رەك قويۇلدى) ، تۈپ ئارىلىقى 10 سانتىمېتىر قىلىپ تىكىلىدۇ . قالەمچىنىڭ ئۇچى يەردىن 2 سانتىمېتىر (بىر تال بىخ) چىقىپ تۇرسا بولىدۇ . قەلەمچىنى تىكىشتىن ئىلگىرى ، يەرگە سانجىلىدىغان تەرىپىنىڭ 8 — 10 سانتىمېتىر يېرىنى (باغلىمى بىلەن) 500 ھەسسە سۇيۇلدۇ . رۇلغان ABT يىلتىز تارتقۇزۇش ئۇنتوقى ئېرىتمىسىگە 10 مىنۇت چىلاپ ، ئاندىن تىكسە قەلەمچىنىڭ كۆكلەش نىسبىتىنى تېخىمۇ ئۆستۈرگىلى بولىدۇ . قەلەمچىنى ئاق يەرگە سانجىپ تىكىپ ، سۇغىرىپ ئوسسى كېلىشكەندىن كېيىن ، ئۈستىگە سۇلياۋ يوپۇق ياپسىمۇ ياكى يەرنى ئوسا قىلىپ ئاغدۇرۇپ چۆنەك تارتقاندىن كېيىن ، چۆنەك ئۈستىگە سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ ، سۇلياۋ ئۈستىدىن تۆشۈك ئېچىپ ، قەلەمچىنى سانجىپ تىكسىمۇ بولىدۇ .

5. پەرۋىش قىلىش

قەلەمچىنى تىككەندىن باشلاپ ، كۈز كىرگىچە بولغان ئارىلىقتا سۇغىرىش ، سۇلياۋنى ئېلىۋېتىش ، تۇپراقنى يۇمشىتىش ، ئوتىنى ئوتاش ، قوشۇمچە ئوغۇتلاش ، قىش-تىن ئۆتكۈزۈش قاتارلىق پەرۋىش ئىشلىرىنى ياخشى ئىشلەپ ، كۆچەتلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ئۈچۈن ياخشى شارائىت يارىتىپ بېرىش لازىم .

1) سۇغىرىش . قەلەمچىلەر تىكىلگەندىن باشلاپ ، كۈزدە كۆمۈلگەنگە قەدەر بىر يىلدا 10 — 12 قېتىم سۇغىرىلسا مۇۋاپىق بولىدۇ . كۆچەتلەرنى 4 - ئاينىڭ ئاخىرىدا بىر قېتىم ، 5 - ئايدا ئۈچ قېتىم ، 6 -

ئايىدىن 8 - ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ھەر 15 كۈندە بىر قېتىم ،
 9 - ئاينىڭ 20 - كۈنلىرىگىچە بىر قېتىم سۇ -
 غىرىپ ، 11 - ئاينىڭ 10 - كۈنلىرى ئەتراپىدا تولۇق
 سۈيى قويۇپ ، 11 - ئاينىڭ 20 — 25 - كۈنلىرىدىن
 بۇرۇن كۆچەتلەرنى توپا بىلەن قېلىنراق كۆمۈپ قىشتىن
 ئۆتكۈزۈش كېرەك . قەلەمچىلەرنى دەسلەپكى مەزگىللەردە
 سۇغارغاندا ئاز سۇ باشلاپ يېنىك سۇغىرىش ، تېمپېراتۇرا
 30 C تىن ئاشقان مەزگىللەردە ئەتىگەن ياكى كەچ تەرەپلەر -
 دە سۇغىرىش لازىم .

2) سۇلياۋ يوپۇقنى ئېلىۋېتىش . قەلەمچە تىكىلىپ
 20 كۈندىن كېيىن بىخلىنىشقا باشلايدۇ . بۇ مەزگىلدە
 بىخنىڭ ئۈستىدىكى سۇلياۋ يوپۇقنى يىرتىپ تۈشۈك ئې -
 چىپ قويسا ، بىخ پەيدىنىيەي مايسا چىقىرىپ تۇپراق سىرتى -
 غا چىقىدۇ . 5 - ئاينىڭ ئاخىرى ياكى 6 - ئاينىڭ باشلىرى -
 دا ھاۋا تېمپېراتۇرىسى ئۆرلىگەندىن كېيىن ، سۇلياۋ يو -
 پۇقنى ئېلىۋېتىپ ، كۆچەتلەرنىڭ توپىسىنى بوشتىتىش
 لازىم .

3) تۇپراقنى يۇمشىتىپ ئوتنى ئوتاش . سۇلياۋ يو -
 پۇقنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن ، كۆچەتلەرنىڭ تۈۋىنى بوشى -
 تىپ ، ئوتنى ئوتاپ ، ئاندىن سۇغىرىش كېرەك . ھەر
 قېتىم سۇغىرىشتىن بۇرۇن بىر قېتىم چاناپ ، ئوت -
 چۆپلەرنى ئوتاش ۋە مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇمچە ئوغۇت
 بەرگەندىن كېيىن ، ئاندىن سۇغىرىش لازىم .

4) قوشۇمچە ئوغۇتلاش . 6 - ئايدىن 8 - ئاي -
 نىڭ 20 - كۈنلىرىگىچە ئۈچ قېتىم فوسفورلۇق ، كالىي -

لىق ئوغۇتلارغا تولۇق چىرىگەن قوي قىغى ، توخۇ - كەپتەر مایىقى ، كۈنجىرە قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئارىلاش- تۇرۇپ قوشۇمچە ئوغۇت بەرسە بولىدۇ . ئازوتلىق ئو- غۇتلارنى بىرىنچى قېتىمدا ناھايىتى ئاز مىقداردا ئىشلەت- كەندىن باشقا ، ئىككىنچى ، ئۈچىنچى قېتىمدا ئىشلەتمەس- لىك كېرەك . فوسفورلۇق ئوغۇت ھەر مو يەرگە 12 — 15 كىلوگرام ئەتراپىدا بېرىلىشى ، كالىيلىق ئوغۇت ئو- چىنچى قېتىمدا 15 كىلوگرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم . باشقا ئورگانىك ئوغۇتلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئوغۇتلىغاندا ، خىمىيىۋى ئوغۇتلارنىڭ مىقدارىنى ئا- زايىتىش ، ئوغۇت بەرگەندە نۆۋەتلەشتۈرۈپ تاپ ئې- چىپ ، تاپ بويىچە ئوغۇتلىغاندىن كېيىن ، ئوغۇتنى كۆمۈپ دەرھال سۇغدىرىش لازىم .

5) كۆچەتلەرنى قىشتىن ئۆتكۈزۈش . ئەنجۈر كۆچە- تىنى توپا بىلەن كۆمۈپ قىشتىن چىقارمىسا ئۇششۇپ كېتىدۇ . ئۇنى قىشتىن بىخەتەر ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن تۆۋەن- دىكى ئىككى خىل ئۇسۇلنىڭ بىرىنى قوللانسا بولىدۇ . بىرى ، كۆچەتنى ئېتىز ئۈستىدىلا ياتقۇزۇپ كۆمۈش ئارقى- لىق قىشتىن ئۆتكۈزۈش ؛ يەنە بىرى ، 11 - ئاينىڭ 18 — 25 - كۈنلىرىگىچە كۆچەتنى يىلتىزى بىلەن قومۇ- رۇپ ، ئورغا كۆمۈپ قىشتىن ئۆتكۈزۈش . بىرىنچى خىل ئۇسۇل كېلەر يىلى ئەتىيازدا ئورمان بىنا قىلىشقا ئىشلەت- كىلى بولمايدىغان كىچىك كۆچەتلەرگە باب كېلىدۇ . ئىك- كىنچى خىل ئۇسۇل ئەتىيازدا ئورمان بىنا قىلىشقا ئىشلەت- كىلى بولىدىغان ئۆلچەملىك كۆچەتلەرگە باب كېلىدۇ . بۇ

ئىككى خىل ئۇسۇلنى جايلار ئۆزىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىسە بولىدۇ .

4 . ئۈزۈم نوتىسىنى قەلەمچە قىلىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش

1 . ئەلا سورتلىرىنى تاللاش

كۆچەت يېتىشتۈرۈپ باغ بىنا قىلىشتا ئۈزۈمنىڭ ئەلا سورتلىرىنى تاللاشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم . ھۆل پېتى ئىستېمال قىلىشقا ۋە قۇرۇتۇپ يۆتكەشكە بولىدىغان شىندى جاك يەرلىك ئۈزۈم سورتلىرىدىن ساپ مەرۋايىت ، قىزىل داراي ، تۇرپان قىزىل ئۈزۈمى (قىزىل سايۋا) ، كۆك سايۋا (سوقا ئۈزۈم) ، ئاق كىشىمىش ئۈزۈم ، قەشقەر ئۈزۈمى ، خوتەن قىزىل ئۈزۈمى ، قىزىل مۇناقى ئۈزۈم قاتارلىقلارنى تاللاش لازىم . بۇ سورتلار تۇپراق ، ھاۋا ، قۇرغاقچىلىق ، ھۆلچىلىك قاتارلىق تەبىئىي شارائىتلارغا بولغان ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك ، مېۋىسى چۈرۈك ، پوستى نېپىز ، ئېتى يۇمشاق ، تاتلىق ، تەمى شېرىن بولۇشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە ، بۇ سورتلاردىن كۆچەت يېتىشتۈرۈپ باغ بىنا قىلىشنىڭ ئىستىقبالى كەڭ ، مېۋىسىنىڭ ئىقتىسادىي قىممىتى يۇقىرى بولۇپ ، خەلقئارا بازاردا كۈچلۈك رىقابەت ئۈستۈنلۈكىگە ئىگە .

ھاراق ئىشلەپچىقىرىش ئۈچۈن كېڭەيتىلىدىغان سورتلار : ھاراق ئىشلەپچىقىرىشقا ئىشلىتىلىدىغان ئۈزۈمنىڭ

قەنت تەركىبى يۇقىرى بولۇشى كېرەك ، ئەمما ئۇنىڭ چۈ-
چۈمەللىكى بەك تۆۋەن بولماسلىقى ، قەنت ، تاننىن كىسلاتا
ۋە خۇش پۇراقلىق ماددىلار ئوتتۇرىسىدا مۇۋاپىق تەڭپۇڭ-
لۇق بولۇشى لازىم . قەنت تەركىبى يۇقىرى بولۇپ ، ئور-
گانىك كىسلاتا يېتەرلىك بولمىسا ، بۇنداق ئۈزۈم ئەلا سۈ-
پەتلىك ھاراقنىڭ خام ئەشياسى بولالمايدۇ . شۇڭا ، ھاراق
ئىشلەپچىقىرىشقا ئىشلىتىش ئۈچۈن فرانسىيىنىڭ ئاق پى-
نون ، رېسىلىڭ ، گروزىيىنىڭ پىكادىل ، سالىراۋې ، ئى-
تالىيىنىڭ رېسىلىڭ ، ئىلىنىڭ پۇراقلىق ئۈزۈمى قاتارلىق
سورتلارنى تاللاپ باغ بىنا قىلىش لازىم . بۇنىڭدىن باشقا ،
جۇفېڭ (ياپونىيە سورتى) ، «يەر شارى قىزىل ئۈزۈمى»
(ئامېرىكا سورتى) ، بېيجۈەن (بېيجىڭ سورتى) ، جىڭ-
زاۋجىڭ (بېيجىڭ سورتى) قاتارلىق سورتلارنى ئۆزىنىڭ
تەبىئىي شارائىتىغا ماس كېلىدىغان ئورۇنلار مۇۋاپىق كۆ-
لەمدە كېڭەيتىسە بولىدۇ . ھاراق ئىشلەپچىقىرىشقا ئىشلىتىد-
لىدىغان ئۈزۈم سورتلىرىدىن شامپان ھارقى ، ئاق ئۈزۈم
ھارقى ، ئەلا سۈپەتلىك ئاق ۋە قىزىل ئۈزۈم ھارقى ئىش-
لەپچىقىرىلىدۇ . بۇنىڭدا ئۈزۈم ۋە ئۇنىڭدىن ئىشلەپچىقىد-
رىلغان مەھسۇلاتلاردىن كۆرۈنەرلىك ئىقتىسادىي ئۈنۈم يا-
راقلىقى بولىدۇ .

2. كۆچەت يېتىشتۈرۈش

ئۈزۈم تېلى جىنسلىق (ئۇرۇقنى تېرىش) ۋە جىنس-
سىز (قەلەمچە تىكىش ، نوتا باسۇرۇش ، تۈپ ئايرىش ،
ئۇلاش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق) كۆپەيتىلىدۇ . ئۇرۇقنى تې-

رىپ كۆپەيتىش ئۇسۇلى ئادەتتە قوللىنىلمايدۇ . قەلەمچە تىكىش ، نوتا باسقۇرۇش ، ئۇلاش قاتارلىق ئۇسۇللار كۆپ-رەك قوللىنىلىدۇ .

تالنى قەلەمچە قىلىپ تىككەندە ، كۆچەت يېتىشتۈ-رۈش باسقۇچىنى قىسقارتقىلى ، كۆكلەش ئۈنۈمىنى ئۆس-تۈرگىلى ، ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى ۋە ئەسلىدىكى ئانا تۈپلەرنىڭ خۇسۇسىيەتلىرىنى ساقلاپ قال-غىلى بولىدۇ . بۇ ئۇسۇل قەلەمچىنى بىۋاسىتە تىكىپ باغ بىنا قىلىش ۋە قەلەمچىدىن كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئارقىلىق باغ بىنا قىلىش دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ . بۇ ئۇسۇل-نىڭ ھەر ئىككىسىنىڭ ئۈنۈمى ياخشى . لېكىن ، تەييارلان-غان قەلەمچىلەر ئالدىن بىخاندۇرۇپ تىكىلىشى كېرەك . نوتا باسقۇرۇپ كۆپەيتىش ھەرقايسى جايلاردا ئۇزاق زامانلار-دىن بېرى قوللىنىپ كېلىۋاتقان ئەنئەنىۋى ئۇسۇل بولۇپ ، ھازىر بۇ ئۇسۇل كۆپ قوللىنىلمايدۇ . تالنى ئۇلاپ كۆپەي-تىش ئۇسۇلى 60 - يىللاردىن كېيىن بارلىققا كەلگەن يېڭى ئۇسۇل بولۇپ ، ئۇنىڭ ئۈزۈم سورتلىرىنى ياخشىلاش-تا ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك ، لېكىن بۇ ئۇسۇل ھەممە جايلاردا ئومۇميۈزلۈك كېڭەيتىلمىگەنلىكتىن ئەمەلىيەت جەريانىدا ئاز قوللىنىلماقتا .

3 . نوتا تاللاش

قەلەمچە قىلىنىدىغان نوتىلارنىڭ سورتى ساپ ، سۈپە-تى ياخشى بولۇش تەلەپ قىلىنىدۇ ، سورتى ئارىلاش ، سۈپىتى ناچار ياكى شاللاپ چىقىرىۋېتىلگەن ئۈزۈم سورت-ى

لىرىدىن نوتا ئېلىپ قەلەمچە قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق . ئەڭ مۇھىمى يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن ئەلا سورتلار . دىن نوتا ئېلىپ قەلەمچە قىلىش كېرەك . تاللىنىدىغان قەلەمچە نوتىلىرى ساغلام ، قاۋۇل ئۆسكەن ، بوغۇم ئاردا . لىقلىرى قىسقا ، ئۆزەك قىسمى كىچىك ، تولۇق پىشىپ يېتىلگەن بىر يىللىق نوتىلاردىن بولۇشى لازىم . قەلەمچە نوتىلىرىنى ئەڭ ياخشىسى كۈز پەسلىدە (تالنى چاتقاندا) تاللاپ يىغىۋېلىپ ، 1 مېتىردىن كېسىپ ھەر 50 — 100 تالنى بىر باغلام قىلىپ ، ئورغا سېلىپ توڭلىتىپ ساقلاش كېرەك . نوتىلارنىڭ سېسىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۇ . چۈن ، نوتىلارنى قۇرۇق قۇم بىلەن كۆمۈپ ، ئاندىن سۇ قويۇپ توڭلىتىش لازىم .

4 . قەلەمچىلەرنى ساقلاش

قەلەمچىلەرنى ئوردا توڭلىتىپ ساقلىسىمۇ ياكى ھۆل توپىدا كۆمۈپ ساقلىسىمۇ بولىدۇ . قەلەمچىلەرنىڭ قۇرۇپ قېلىشىدىن ياكى ھوردىلىپ سېسىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ، قەلەمچىلەرنى كۆمگەندە ، ئورغا كۆمگەن قەلەمچىلەرگە نىسبەتەن قۇرۇق قۇم ياكى قۇرۇق توپا تۆ . كۆپ قەلەمچىلەرنىڭ ئارىسىدىكى بوش ئورۇننى چىڭداپ ، ھاۋا ئالمىشىدىغان كاۋاك قالدۇرماسلىق ؛ ھۆل توپىغا كۆ . مۇپ ساقلىغان قەلەمچىلەرگە نىسبەتەن ، ھۆل قۇم ئاردا . لاشتۇرۇپ كۆمۈپ ، قەلەمچە ئارىسىدا بوشلۇق قالدۇرما . لىق لازىم .

5. قەلەمچە نوتىلىرىنى كېسىش

قەلەمچە نوتىلىرىنى كېسىشتە ، ئالدى بىلەن نوتىلار - نىڭ ئوڭ - تەتۈرى بويىچە رەتلەپ ، كېسىلگەن قەلەمچىلەر - نىمۇ شۇ بويىچە رەتلىك باغلاش كېرەك . قەلەمچە نوتىلىرى ئادەتتە 20 — 25 سانتىمېتىر ، بىۋاسىتە تىكىپ باغ بىنا قىلىشقا ئىشلىتىشتە 0.5 — 1 مېتىر ئۇزۇنلۇقتا كېسىلدۇ . قىسقا كېسىلگەن قەلەمچىدە 3 — 4 تال ، ئۇزۇن كېسىلگەن قەلەمچىدە 7 — 14 تال بىخ قالدۇرۇلىدۇ . نوتىلارنىڭ بوغۇم ئارىلىقلىرى ئۇزۇن - قىسقا بولغاچقا ، قەلەمچە كەسكەندە ، قەلەمچىلەرنىڭ ئۇزۇن - قىسقا كېسىدلىشى ئېھتىمالى تۇغۇلىدۇ . بۇنداق بولغاندا ئىلاج قىلىپ قەلەمچىلەرنى ئوخشاش ئۇزۇنلۇقتا كېسىشكە ئىمكانىيەت يارىتىش كېرەك . قەلەمچىنى كەسكەندە ، قەلەمچىنىڭ ئۇچى بىختىن 1.5 سانتىمېتىر قالدۇرۇپ تۈز كېسىلىدۇ . ئاستى تەرىپى بىخ (كۆز) گە يېقىنراق يەردىن قىيپاش كېسىلىدۇ . نوتىلارنى قەلەمچە قىلىپ كەسكەندە ، قەلەمچىنىڭ ئۇچىدىكى بىخنىڭ تولۇق - تولۇق ئەمەسلىكىگە دىققەت قىلىش ، ئەگەر بىخنىڭ ئورنى بولۇپ ، ھاياتى كۈچى بولمىسا ، ئۇنى كېسىپ ئېلىۋېتىپ ، تولۇق بىخنى قالدۇرۇش لازىم . قەلەمچىلەرنى ئۇدۇللۇق كېسىپ ، ئوڭ - تەتۈرى بويىچە ئۇدۇللۇق باغلاپ ، ھۆل توپىغا ۋاقتىدا كۆمۈپ ساقلاش لازىم .

6. قەلەمچىلەرنى تىكىشتىن بۇرۇن يىلتىز

تارتقۇزۇش

كېسىپ تەييارلانغان قەلەمچىلەر سۈزۈك سۇدا پاكىز

يۇيۇپ تازىلانغاندىن كېيىن ، 20 — 24 سائەت سۈزۈك ، پاكىز سۇغا چىلاپ تويۇندۇرۇلىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ، تۈرلۈك ئۇسۇللار ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىنىپ ، يىلتىز تارتقۇزۇلىدۇ . تال قەلەمچىلىرىنى يىلتىز تارتقۇزۇش ئۇسۇللىرى كۆپ ، ئۈنۈمى ياخشى بولۇپ ، ئومۇمەن 20 — 30 كۈندە يىلتىز تارتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ، قەلەمچىلەرنى يۆتكەپ تەككەپ ، بىخ چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ .

قەلەمچىلەر سالقىن كۆچەتلىكتە يىلتىزلىتىش ئۇسۇلى ، كاڭدا يىلتىزلىتىش ئۇسۇلى ، پارنىكتا يىلتىزلىتىش ئۇسۇلى ، توك ئارقىلىق يىلتىزلىتىش ئۇسۇلى قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق يىلتىز تارتقۇزۇلىدۇ . قەلەمچىنى تېز يىلتىز تارتقۇزۇپ بىخلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە كۆچەتنى تېز ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ، ھازىر پارنىكتا يىلتىزلىتىش ۋە توك ئارقىلىق يىلتىزلىتىش ئۇسۇللىرى كۆپرەك قوللىنىلىدۇ . بۇ ئۇسۇللارنىڭ ئۈنۈمى ياخشى بولۇپ ، ئېھتىياجلىق ئەلا سورتلۇق ئۈزۈم كۆچەتلىرىنى ھەم كۆپ ، ھەم تېز يېتىشتۈرۈپ چىققىلى بولىدۇ . بۇنىڭدىن باشقا ، ھازىر دورا بىلەن يىلتىز تارتقۇزۇش ئۇسۇللىرى بىرقەدەر كۆپ قوللىنىلماقتا ، بۇ ئۇسۇلنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك ياخشى بولۇپ ، كېڭەيتىشكە بولىدۇ .

1) دورا بىلەن يىلتىز تارتقۇزۇش ئۇسۇلى . قەلەمچىلەرنى دورا ئارقىلىق يىلتىز تارتقۇزۇش ھازىر مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىنى تېز يېتىشتۈرۈشتە كۆپ قوللىنىلىدۇ . خان ئۇسۇللارنىڭ بىرى . قەلەمچىلەرنى يىلتىز تارتقۇزۇش .

قا ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ تۈرى كۆپ بولسىمۇ ، لېكىن ئۇنۇمى ئوخشاش ئەمەس . ھازىر كۆپرەك ئىشلىتىلىدىغانلىرى ساخاروزا ، كالىي پېرمانگانات ، α - نافتالىنلىق ئاچچىقسۇ كىسلاتاسى ، ئىندوللۇق ئاچچىقسۇ كىسلاتاسى ، ئىندوللۇق بوتېل كىسلاتاسى ، ABT يىلتىز تارتقۇزۇش ئۇنتوقى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت . بۇ دورىلار نىسبەت بويىچە تەڭشەپ سۇيۇقلاندۇرۇلغاندىن كېيىن ، كېسىپ سۇغا چىلانغان قەلەمچىنىڭ يەرگە سانجىلىدىغان ئۇچى تەييارلانغان دورا سۇيۇقلۇقىغا 2 سانتىمېتىر چىلىنىپ ، 12 سائەت چىلاپ قويۇلىدۇ . مۇشۇ ئارىلىقتا قەلەمچىنىڭ ئۈستى سۇغا چىلاپ نەمدەلگەن تاغار ، كىگىز ، ئەدىيال ياكى سۇل-ياۋ بىلەن مەھكەم باسۇرۇلىدۇ .

2) دورىنى تەڭشەپ سۇيۇقلاندۇرۇش ئۇسۇلى .
 0.1 — 0.5% لىك كالىي پېرمانگانات ، 150 — 200ppm لىق α - نافتالىنلىق ئاچچىقسۇ كىسلاتاسى ، 50 — 100ppm لىق ئىندوللۇق ئاچچىقسۇ كىسلاتاسى ، 50 — 100ppm لىق ئىندوللۇق بوتېل كىسلاتاسى ۋە ABT يىلتىز تارتقۇزۇش ئۇنتوقىنىڭ ھەر 1 گرام پاراشوكى (100 گرام) 95% لىك ئىسپىرتتا سۇيۇقلاندۇرۇلغاندىن كېيىن ، يەنە 1000 گرام سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ بىلەن تەڭشەپ تەييارلىنىدۇ . قەلەمچىلەر دورا سۇيۇقلۇقى بىلەن يىلتىز تارتقۇزۇلغاندىن كېيىن ، مەخسۇس تەييارلانغان يەرگە تىكىلسە ، كۆكلەش ئۈنۈمىنى كۆرۈنەر-

لىك نىسبەتتە ئۆستۈرگىلى بولىدۇ .

7. قەلەمچە تىكىش

قەلەمچىلەر پارنىك ، ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى ۋە خىمىيىلىك دورىلارنىڭ ياردىمى ئارقىلىق 20 — 30 كۈن يىلتىز تارتقۇزۇپ تەييارلانغاندىن كېيىن ، رەسمىي ئاق يەرگە تىكىپ سۇغىرىپ پەرۋىش قىلىنىدۇ . قەلەمچىنى قايسى ۋاقىتتا تىكىش ، شۇ يەرنىڭ ھاۋا ، تېمپېراتۇرا ، سۇ ، يەر شارائىتى ۋە قەلەمچىلەرنى يىلتىز تارتقۇزۇش تەييارلىق ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ . جەنۇبىي شىنجاڭدا ئادەتتە 4- ئاينىڭ 10 — 15- كۈنلىرى ئەتراپىدا تىكسە بولىدۇ ، ئەڭ كېچىككەندىمۇ 4- ئاينىڭ 20- كۈنلىرىدىن بۇرۇن تىكىپ بولۇش لازىم . شۇ مەزگىلگىچە قەلەمچىلەرنى يىلتىز تارتقۇزۇپ تەييارلاپ بولۇش كېرەك .

ئالدى بىلەن قەلەمچە تىكىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈلىدىغان يەرنىڭ ھەر 1 موسغا 40 — 50 تاغار سۈپەتلىك قوي قىغى تۆكۈپ ، يۇمشاق ئاغدۇرۇپ تەكشى تۈزلەش كېرەك . ئۇنىڭدىن كېيىن ، تەييارلانغان يەرگە قۇر ئارىلىق 50 سانتىمېتىر ، تۈپ ئارىلىقى 15 سانتىمېتىر ، چوڭ- قۇرلۇقى 18 — 20 سانتىمېتىر قىلىپ تاپ ئېچىلىدۇ ياكى چۆنەك ئېلىنىدۇ . تاپ ياكى چۆنەكنىڭ ئۇزۇنلۇقى بويىچە تاناب تارتىلىپ ، قەلەمچە تاپ ئىچىگە رەتلىك ، تۈز تىكىلىدۇ . ھەربىر تاپ بويىچە قەلەمچە تىكىلىپ بولغاندىن كېيىن ، يىلتىزنى زەخمىلەندۈرمەي كەتمەن بىلەن يېنىك توپا تاشلاپ دەسسەپ چىڭدىلىدۇ . قەلەمچىنى تىككەندە تۈپ-

راق يۈزىدىن قەلەمچىنىڭ بىر تال بىخى ئېنىق چىقىپ تۇرۇشى ، قەلەمچە تىكىلىپ بولغاندىن كېيىن دەرھال ئې- تىزلار بويىچە سۇغىرىلىشى لازىم . قەلەمچە تىكىلىپ بىر ئايغىچە ئوتىنى ئوتاپ ، تۇۋىنى چانماسلىق كېرەك . قە- لەمچىنى تىكىپ سۇغىرىپ 5 — 6 كۈندىن كېيىن ، ئۈس- تىگە سۇلياۋ يوپۇق ياپسا ، قەلەمچىلەرنىڭ كۆكلەش نىس- جىتىنى تېخىمۇ ئۆستۈرگىلى بولىدۇ .

قەلەمچە تىكىشنىڭ يەنە بىر ئۇسۇلى قەلەمچىنى بىۋا- ستە تىكىپ باغ بىنا قىلىش . بۇ ئۇسۇلدا تىكىلىدىغان قەلەمچىلەر 1 مېتىر ئۇزۇنلۇقتا كېسىلىدۇ ، قەلەمچىلەر ئىلمىي ئۇسۇلدا يىلتىز تارتقۇزۇلغاندىن كېيىن ، تۈپ ئا- رىلىقى 70 — 80 سانتىمېتىر ياكى بىر مېتىر ، قۇر ئارىلىقى 7 — 8 مېتىر قىلىپ ، قەلەمچە تىكىدىغان يەرگە 40 — 50 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا ئورەك كولىنىدۇ . ئورەكنىڭ تېگىگە 15 — 20 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا ئور- گاننىڭ ئوغۇت ئارىلاشتۇرۇلغان قۇرۇق توپا تۆكۈلىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ، 5 — 10 سانتىمېتىر قېلىنلىقتا ئەت توپا تۆكۈلۈپ ، 3 — 5 تال قەلەمچە بىر ئورەككە سېلى- نىپ ، قۇرۇق توپا تاشلاپ كۆمۈپ ، دەسسەپ چىڭدىلىدۇ . قەلەمچىنىڭ 2 تال بىخى يەر ئۈستىدە قالدۇرۇلىدۇ ، قە- لەمچىلەر قاندۇرۇپ سۇغىرىلغاندىن كېيىن ، يەر ئۈستىدە- كى قىسمى نەم توپا بىلەن نېپىز كۆمۈلۈپ ، 5 - ئاينىڭ 15 — 20 - كۈنلىرى ئېچىلىدۇ . قەلەمچىلەر كۆكلەپ بولغاندىن كېيىن ، شۇ يىلى كۈز ياكى كېلەر يىلى ئەتىياز- دا ، ھەر بىر ئورەكتە بىر تال كۆچەت قالدۇرۇلۇپ ، قالغان

قىسمى باشقا جايغا يۆتكىلىدۇ . بۇ ئۇسۇلدا تىكىلگەن قە -
 لەمچىلەر ياخشى پەرۋىش قىلىنسا ، يىل ئاخىرىغىچە 2 —
 3 مېتىر ئېگىزلىكتە ئۆسىدۇ . تىكىلگەن قەلەمچىلەرنىڭ
 پەرۋىشىنى كۈچەيتىپ ۋاقتىدا تۈۋىنى بوشتىپ ، ۋاقتىدا
 ئوتاپ ، ئىككى قېتىم قوشۇمچە ئوغۇت بېرىلسە ، 2 — 3
 قېتىم دورا پۈركۈپ كېسەللىك ۋە ھاساراتلارنىڭ ئالدى
 ئېلىنسا ، ئۆسۈشىنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ .
 قەلەمچىلەر كۆكلەپ ئېگىزلىكى 30 — 40 سانتىمېتىرغا
 يەتكەندىن كېيىن ، باراڭغا ئېلىپ ، ئاساسىي شاخلارنىڭ
 ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ، يان شاخلىرىنى پۈتاپ تۈ -
 رۇش كېرەك . 8 - ئايلاردا ئۈچىنى ياندۇرۇپ ، غولىنىڭ
 ياغاچلىشىشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىش لازىم . كۈز پەس -
 لىدە قەلەمچىدىن يېتىشىپ چىققان كۆچەتلەرنى قاندۇرۇپ
 سۇغىرىپ ، 11 - ئاينىڭ 25 - كۈنلىرىدىن بۇرۇن كۆمۈپ
 بولۇش كېرەك .

8 . سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش
 سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈشتە ، قەلەم -
 چىلەر ئالدىن يىلتىز تارتقۇزۇلمىسىمۇ بولىدۇ . ئەمما ،
 قەلەمچە قىلىنىدىغان ئوتلار كۈزدە ئېلىنىپ ، 1 مېتىر
 ئۇزۇنلۇقتا كېسىپ 50 — 100 تالدىن باغلاپ ، قىشتا
 توڭلىتىلغان بولۇشى كېرەك .

سۇلياۋ يوپۇق يېپىپ قەلەمچە قىلىنىدىغان يەرلەر
 چوڭقۇر ، يۇمشاق ئاغدۇرۇپ تەييارلىنىشى ، ھەر مو يەرگە
 40 — 50 تاغاردىن سۈپەتلىك ئېغىل قىغى تۆكۈلگەن

بولۇشى ۋە يەرلەر تەكشى تۈزلەنگەن بولۇشى كېرەك . تال قەلەمچىسى 4- ئاينىڭ 10 — 15- كۈنلىرى ئەتراپىدا تىكىلىدۇ . نوتىلارنى قەلەمچە تىكىدىغان چاغدا كېسىپ ، 20 — 25 سائەت سۈزۈك سۇغا چىلاپ ئاندىن تىكىش كېرەك ، قەلەمچە چۆنەككە ئىككى رەت قىلىپ تىكىلسە بولىدۇ .

چۆنەكنىڭ كەڭلىكى 1 مېتىر ، ئېگىزلىكى 10 سانتىمېتىر بولسا ، ھەر بىر چۆنەككە قۇر ئارىلىقى 40 سانتىمېتىر ، تۈپ ئارىلىقى 15 سانتىمېتىر قىلىپ ئىككى رەت قەلەمچە تىكىلسە ، زىچلىقى مۇۋاپىق بولغان بولىدۇ . قەلەمچىلەرنىڭ بىر تال بىخنى سىرتتا قالدۇرۇش ، تىكىلىپ بولغاندىن كېيىن دەرھال سۇغىرىپ ئۈستىگە كەڭ ئەنلىك سۇلياۋ يېپىش كېرەك . 6 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا سۇلياۋنى ئېلىۋېتىپ پەرۋىش قىلىشنى كۈچەيتىش لازىم .

Ⅲ باب ئۇلاش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش

ئۇلاش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئۇرۇق تېرىش ، قەلەمچە تىكىش ، نوتا باسقۇچى ئۇسۇلى ئارقىلىق يېتىشتۈرۈلگەن كۆچەتلەر ئىچىدىن سورتى ناچار ، سۈپىتى تۆۋەن كۆچەتلەرنى ئۇلاق ئاستى ، ئەلا سورتلۇق ، يۇقىرى مەھسۇلاتلىق ئانا تۈپلەردىن ئېلىنغان يۇمران شاخ (نوتا) ۋە بخ (كۆز) نى ئۇلاق ئۈستى قىلىپ ئۇلاش ئارقىلىق ئەلا سورتلۇق كۆچەتلەرنى يېتىشتۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ . ئۇلاش ئارقىلىق يېتىشتۈرۈلگەن كۆچەتلەرنىڭ ئىرسىيەت-چانلىقى مۇقىم ، ئۆسۈپ يېتىلىشى تېز ، ئەسلىدىكى ئانا تۈپلەرنىڭ فىزىئولوگىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى ساقلاپ قېلىش ئىقتىدارى كۈچلۈك ، مېۋىگە كىرىشى بالدۇر ، مەھسۇلاتى مول ، مېۋىسىنىڭ سۈپىتى ياخشى بولغانلىقتىن كۆچىتىنىڭمۇ ، مەھسۇلاتىنىڭمۇ ئىقتىسادىي قىممىتى يۇقىرى ھەم بازىرى ئىتتىك . چوڭ دەرەخلەرگە قارىغاندا مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ 1 — 2 يىللىق كۆچەتلىرىنى ئۇلاش ئۇسۇلى ئاددىي ، ئۇلاش مەشغۇلاتى ئاسان بولۇپ ، ئۇلىغاندىن كېيىن ياخشى پەرۋىش قىلىنسا ، كۆكلەش ، ئەيى بولۇش نىسبىتىنى 85 — 98% كە يەتكۈزگىلى بولىدۇ .

ئۇلاش ئۇسۇلى كۆپەتچىلىك ، باغۋەنچىلىك ، گۈلچە-لىك ئىشلەپچىقىرىشىدا ناھايىتى كەڭ قوللىنىلىدۇ . بۇ ئۇسۇل بىلەن ياخاق ، بادام ، چىلان ، ئۆرۈك ، ئالما ، ئا-نار ، شاپتۇل ، ئۈزۈم ، نەشپۈت ، جىگدە ، بېھى ، ئۈجمە ، گىلاس ، ئالۇچا ، ئەينۇلا ، كۆكسۇلتان ، بەرگى ، ئالاراهەت (ئالگرات) ، قارىئۆرۈك ، جىنەستە ، ياۋا ئامۇت ، قىزىل-گۈل ، ئەتىرگۈل قاتارلىق كۆچەت ۋە گۈل - گىياھ تۈرلى-رىنى ئۇلاپ ، سورتىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ . 1 — 2 يىللىق كۆچەتلەرنى ئۇلاشتا ، ئاساسلىقى ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ، « T » ، « I » شەكىللىك قوۋزاقلىق بىخ ئۇلاق ۋە پىپى ئۇلاق ئۇسۇللىرى كۆپرەك قوللىنىلىدۇ . ئۇلاش ئۇ-سۇلى ئارقىلىق مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سورتلىق كۆچەتلىرىنى تېز يېتىشتۈرۈش نۆۋەتتە ئەلا سورت-لىق ، يۇقىرى مەھسۇلاتلىق مېۋىلىك باغلارنى بەرپا قى-لىشنىڭ جىددىي ئېھتىياجى .

1 . ياخاق كۆچىتىنى ئۇلاش

ياخاق كۆچىتىنى ئۇلاش جىنسىز كۆپەيتىش ئۇسۇل-لىرىنىڭ بىرى بولۇپ ، بۇ ئۇسۇلدا ئۇلانغان كۆچەتلەر بىخى ئېلىنغان ئەلا سورتلىق ئانا تۈپلەرنىڭ ئىرسىيەتلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى ساقلاپلا قالماستىن ، بەلكى بالدۇر مې-ۋىگە كىرىدۇ . بۇ خىل كۆچەتلەرنى تىكپ باغ بىنا قىلغان-دا ، تۈپلەرنىڭ بىرلىك مەھسۇلاتىنى ئاشۇرغىلى ۋە ئىقتى-

سادىي قىممىتىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ .

1. ئۇلاق ئاستىنى تاللاش

ئۇرۇقتىن ئۈنۈپ ئۆسۈۋاتقىنىغا 1 — 3 يىل بولغان ، غولى توم ، سىلىق ، تۈز ئۆسكەن ، كېسەللىك ، زىيانداش ھاساراتلارنىڭ زىيىنىغا ئۇچرىمىغان ساغلام كۆ-چەتلەر ئۇلاق ئاستى قىلىشقا تەييارلىنىدۇ . ئۇلاق ئاستى قىلىنىدىغان كۆچەتلەر ئۇلاشتىن 10 — 15 كۈن ئىلگىرى يىلتىز ئەتراپىدىن 20 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا تاپ ئېچىپ ، قوي قىغى قاتارلىق ئورگانىك ئوغۇتلار بىلەن ئوغۇتلانغاندىن كېيىن ، قاندۇرۇپ سۇغىرىلىدۇ . كۆچەت-لەرنىڭ تۈۋى يۇمشىتىلىپ ، ئوت - چۆپلەر ئوتۇپتىلىدۇ .

2. بىخ تاللاش

ئۇلاق ئۈستىگە ئىشلىتىش ئۈچۈن ، سورت تاللاش ئورۇنلىرىنىڭ باھالاپ بېكىتىشىدىن ئۆتكەن ئەلا سورتلۇق ئانا تۈپلەر (مەسىلەن «شىنجاڭمول ھوسۇللۇق ياڭقى» ، «ئاقسۇ جام 343- نومۇر» ، «ئاقسۇ كۈنشەھەر 183 - نومۇر» قاتارلىقلار) نىڭ بىر يىللىق (شۇ يىللىق) ساغلام ئۆسكەن نوتىلىرى تاللاپ كېسىۋېلىنىدۇ . ئادەتتە كېڭەيتىل-مىۋاتقان ئەلا سورتلۇق ياڭاقنىڭ شۇ يىللىق نوتىلىرىدىن ئۆسۈپ يېتىلىشى ساغلام ، بىخى تولۇق يېتىلگەن ، ياخشى پىشقان ، بىخ ئورنى توق ، 2 — 3 تالدىن يۇقىرى ئانىلىق بىخى بولغان نوتىلاردىن بىخ ئېلىنسا بولىدۇ . بىخ ئورنى كەمتۈك ياكى پىشىپ يېتىلمىگەن ، غولى ئىنچىكە ، ئاتى-

لىق بىخلىرى كۆپ سۈپەتسىز نوتىلاردىن بىخ ئېلىشقا بولمايدۇ . كېسىلگەن نوتىنىڭ تۆۋەن ، ئوتتۇرا قىسمىلىرىدىن بىخ ئېلىنسا ، ئۇلاغ ئۈستىدىكى بىخنىڭ كۆكلىشى تېز ، كۆكلەش نىسبىتى يۇقىرى بولىدۇ .

3 . ئۇلاش ۋاقتى

ئۇلاش ۋاقتىنى پۇختا ئىگىلەش ۋە ئۇلاقچىلىقنىڭ تېخنىكا پرىنسىپلىرىغا قاتتىق ئەمەل قىلىش لازىم . بىخ ئۇلاقنى ئۇلاش مەزگىلى بىرقەدەر ئۇزاق بولۇپ ، ئادەتتە 4- ئاينىڭ 10- كۈنلىرىدىن 7- ئاينىڭ 10- كۈنلىرىگىچە ئۇلاشقا بولىدۇ . مۇزخانغا سېلىپ توڭلاتقان نوتىدىن بىخ ئېلىپ ئۇلاشقا توغرا كەلسە ، 4- ئاينىڭ 10- كۈنلىرىدىن 5- ئاينىڭ ئاخىرلىرىگىچە ؛ دەرەخ ئۈستىدىن شۇ يىللىق يۇمران نوتىلارنى ئېلىپ ئۇلاشقا توغرا كەلسە ، 6- ئاينىڭ 10- كۈنىدىن 7- ئاينىڭ 10- كۈنلىرىگىچە ئۇلاشقا بولىدۇ . ياڭاق كۆچىتىگە بىخ ئۇلاق ئۇلاشتا ، ئەڭ ياخشىسى 6- ئاي ئىچىدە شۇ يىللىق يۇمران بىخلارنى دەرەختتىن ئۈدۈللۈك كېسىۋېلىپ ، ئۈدۈللۈك ئۇلسا ، كۆكلەش نىسبىتىنى 90 — 98% كە يەتكۈزگىلى بولىدۇ .

4 . ئۇلاش ئۇسۇلى

ياڭاق دەرەخىنى ئۇلاش ئۇسۇللىرى كۆپ بولسىمۇ ، ئادەتتە « I » شەكىللىك بىخ ئۇلاق ئۇلاش ئۇسۇلى كۆپ قوللىنىلىدۇ . بۇ ئۇسۇلدا ئۇلاش ئاسان ، سۈرئىتى تېز ، ئۈنۈمى ياخشى بولۇپ ، ئالدىنقى يىلى ئۇرۇقتىن ئۈنگەن

كۆچەتلەرنىڭ ئېگىزلىكى بۇ يىل ئۇلاش مەزگىلىگىچە 50 — 60 سانتىمېتىردىن ئاشسلا ، بۇ ئۇسۇل بىلەن ئۇلىغىلى بولىدۇ .

ئۇلاش ئۇسۇلى : ئۇلاق ئاستى قىلىدىغان كۆچەتنىڭ شۇ يىلى يېڭىدىن ئۆسكەن نوتىلىرىغا « I » شەكىللىك بىخ ئۇلاق قىلىنىدۇ ، بىخ سالىدىغان جاينىڭ يۇقىرى قىسمى بىر تال يوپۇرماق قالدۇرۇپ ، سەل ئۈستىدىن قاچا بىلەن كېسىپ تاشلىنىدۇ . تۆۋەنكى غولدا ئۆسكەن شاخ - يوپۇر - ماقىلار پۇتاپ ئېلىۋېتىلىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ، ئۇلماقچى بولغان بىخ ئۇزۇنلۇقى 2 سانتىمېتىر ، كەڭلىكى 1.5 سانتىمېتىر چوڭلۇقتا قوۋزاق ئۇلاق پىچىقى ئارقىلىق كېسىپ چىقىرىلىدۇ . بىخ چىقىرىشتا ، بىخ ئۈندۈرمىسى ياغاچ قىسمىدا قالماي ، بىخ بىلەن بىللە چىقىرىلىشى كېرەك . ئۇنىڭدىن كېيىن بىخنىڭ كەينى تەرىپىدىكى پوستى بىر ئاز شىلۋېلىنىپ «ئۆلچىگۈچ» قىلىنىدۇ ، ئاندىن «ئۆلچىگۈچ» ئۇلماقچى بولغان نوتىغا (ئۇلاق ئاستىغا) قويۇلۇپ ، ئاستى - ئۈستى بەلگە قىلىنىپ ، ئۇلاق ئاستى قوۋزىقى « = » شەكلىدە كېسىلىدۇ . ئاخىرىدا «ئۆلچىگۈچ» ئېلىۋېتىلىپ ، « = » سىزىقىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۇزۇنسىغا بىر سىزىق تىلىپ ، « I » شەكىللىك ئۇلاق ئورنى تەييارلىنىدۇ . بىخنىڭ ئىككى ياندىكى كېسىلگەن تەرىپىنىڭ تاشقى پوستى پىچاق بىلەن يانتۇ قىرىۋېتىلگەندىن كېيىن ، « I » شەكلىدىكى ئۇلاق ئاغزىغا يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ كىرگۈزۈلىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ، ئۇلاق مەخسۇس ئىشلەنگەن سۇلياۋ شوينا بىلەن بىخنىڭ ئۈستى

تەرىپىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ يوقۇق قويماي چىڭ تېڭىلىدۇ ،
 تاڭغاندا بىخنىڭ كۆزى سىرتقا چىقىرىپ قويۇلىدۇ . بىخنى
 ئىمكانقەدەر ياش ، ئوتتۇرا ياشلىق دەرەخلەردىن ئېلىش ،
 ئۇلاشقا تەييارلانغان بىخلارنى ئىككى كۈندىن ئارتۇق تۇر-
 غۇزماسلىق كېرەك . ئۇلاق ئۇلىنىپ 9 — 12 كۈندە بىخ
 سېلىنغان جاي پۈتۈشكە باشلايدۇ . ئۇلانغان بىخلار يېڭى
 نوتا چىقارغاندىن كېيىن ، شۇ يىلى مېۋىلەيدىغان ئەھۋالمۇ
 كۆرۈلىدۇ . بۇ چاغدا نوتىلارنىڭ ئوسۇشنى ئىلگىرى سۈ-
 رۇش ئۈچۈن ، مېۋىسىنى پۇتاپ ئېلىۋېتىش كېرەك . كۆ-
 چەتلەر ئۇلىنىپ بولغاندىن كېيىن ، 10 — 15 كۈنگىچە
 سۇغارماسلىق كېرەك . ئۇلانغان بىخنىڭ كۆكلەيدىغان -
 كۆكلىمەيدىغانلىقىنى 10 — 13 كۈندە بىلگىلى بولىدۇ .
 بىخ چوڭىيىپ ، بىخ ئورنى يېشىل تۇرغان بولسا ، ئۇلاق
 تۇتقان ھېسابلىنىدۇ . ئەگەر بىخ ئورنى قورۇلۇپ ، بىخ
 قارىداپ قالغان بولسا ، دەرھال كېسىۋېتىپ قايتىدىن بىخ
 سېلىپ ئۇلاش لازىم . ياڭاق كۆچەتلىرىنى ئۇلاش ئۇسۇللى-
 رى بىرقەدەر كۆپ بولۇپ ، ئوقسىمان بىخ ئۇلاق ، كۋادرات
 شەكىللىك بىخ ئۇلاق ، نەيچىسىمان بىخ ئۇلاق ، « T » شە-
 كىللىك بىخ ئۇلاق ، ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ، « [» شەكىللىك
 بىخ ئۇلاق ، ئۈچ بۇلۇڭ شەكىللىك بىخ ئۇلاق ، ھالقىسىمان
 بىخ ئۇلاق قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەنمۇ ئۇلاپ كۆكلەتكىلى
 بولىدۇ . لېكىن ، مەشغۇلات تەرتىپى ئاددىي ، ئۇلاش ئۇسۇ-
 لى ئاسان ، ئىش ئۈنۈمى تېز ، كۆكلەش نىسبىتى ئەڭ
 يۇقىرى بولىدىغان ئۇسۇل يەنىلا « I » شەكىللىك بىخ ئۇلاق-
 تۇر . ئادەتتە 1 — 3 يىللىق ياڭاق كۆچەتلىرىنى

مۇشۇ ئۇسۇلدا ئۇلدىغان ياخشى .

5. پەرۋىش قىلىش

ئۇلانغان بىخ 3 — 5 سانتىمېتىر نوتا چىقارغاندىن كېيىن ، ئۇلاق ئاغزىدىن 2 سانتىمېتىر ئەتراپىدا قالدۇ . رۇپ قالغان قىسمى كېسىپ تاشلىنىدۇ . 15 — 20 سانتىمېتىر ئۆسكەندە تېگىلغان سۇلياۋ شوپنا بوشىتىپ قويۇلسا ياكى ئېلىۋېتىلسە بولىدۇ .

ئۇلانغان كۆچەتلەرنىڭ پەرۋىشىنى چىڭ تۇتۇپ ، سۇ . غىرىش ، تۇۋىنى يۇمشىتىش ، ئوتاش ، قوشۇمچە ئوغۇتلاش ، ئۇششۇكتىن ساقلاش ، قىشتىن ئۆتكۈزۈش قاتارلىق مەشغۇلاتلارنى ياخشى ئىشلەش لازىم . ئەگەر ئۇلدىغان كۆ . چەتلەرنى كۈز كىرگۈچە 7 — 8 قېتىم سۇغدىرىپ ، 2 — 3 قېتىم قوشۇمچە ئوغۇتلاپ ، 5 — 6 قېتىم تۇۋىنى يۇمشىتىپ ياخشى پەرۋىش قىلسا ، ئۇلانغان بىر يىللىق كۆچەتلەرنىڭ ئېگىزلىكىنى 1.5 مېتىرغا ، ئىككى يىللىق كۆچەتلەرنى 2 — 2.5 مېتىرغا يەتكۈزگىلى بولىدۇ . ئۇلانغان كۆچەتلەرنىڭ ئۈچىنى 8 . ئاينىڭ باشلىرىدا ئازراق كېسىپ تاشلاپ ، نوتلارنىڭ ياغاچلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ، 11 . ئاينىڭ ئوتتۇرلىرىدا بىر قېتىم توك سۈيى قويۇپ ، 11 . ئاينىڭ 20 — 25 . كۈنلىرىدىن بۇرۇن كۆ . چەتلەرنى كۆمۈپ قىشتىن ئۆتكۈزۈش كېرەك . ئۇلدىغان ياڭاق كۆچەتلىرىنى كۈزدە كۆمگەندە ۋە ئەتىيازدا ئاچقاندا قاتتىق ئېھتىيات قىلىش ، نوتلارنىڭ ئۇلاق تۇۋىدىن يېرىلىپ كېتىشى ، سۈنۈپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم .

2. بادام كۆچتىنى ئۇلاش

بادامنى ئۇلاپ كۆچەت يېتىشتۈرۈشنىڭ ئارتۇقچىلىقى كۆپ ، ئۇلاش ئۇسۇلى ئاددىي ، ئۇلانغان كۆچەتلەرنىڭ ئۆسۈشى تېز ، ئەي بولۇش نىسبىتى يۇقىرى بولۇپ ، ئەلا سورتلارنىڭ ئۆز خۇسۇسىيىتىنى ساقلاپ قېلىش ئىقتىدارى كۈچلۈك . جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ بادام ئۆستۈرۈلىدىغان رايونلىرىدا ھەر خىل بادام ، شاپتۇل سورتلىرىنىڭ ئۇرۇقىدىن تېرىپ يېتىشتۈرۈلگەن 1 — 2 يىللىق كۆچەتلىرىنى ئۇلاق ئاستى قىلىپ ، ئەلا سورتلۇق بادام دەرەخلىرىدىن بىخ ئېلىپ ئۇلاش ئارقىلىق ئەلا سورتلۇق بادام كۆچىتى يېتىشتۈرۈلىدۇ .

1. ئۇلاق ئاستىنى تاللاش

بادامنىڭ ئۇلاق تۈپىنى يېتىشتۈرۈش ۋە تاللاش ئىنتايىن مۇھىم . چۈنكى ، كۆچەتلەر ئۇلانغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ، مېۋە بېرىشى ، كېسەللىك ، زىيانداش ھاشارلارغا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى ۋە تەبىئىي شارائىتقا بولغان ماسلىشىشچانلىقى قاتارلىقلارغا ئۇلاق تۈپى ناھايىتى چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ . ئۇلاق ئاستىنى تاللاشتا ، ئۇلاق ئاستى بىلەن ئۇلاق ئۈستى قىلىنغۇچىنىڭ ئۇرۇق - تۇغقانلىق مۇناسىۋىتىنىڭ يېقىن ياكى يىراقلىقىدىن ئالدىنقى شەرت قىلىش لازىم . بادام دەرەخلىرىنىڭ

ئۇرۇق - تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتى قانچە يېقىن بولسا ، ئۇلانغاندىن كېيىن ، كۆكلەش ئۈنۈمىمۇ شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ . شۇڭا ، ئۇلاق ئاستىنى تاللاشتا ، ئۇرۇقىدىن تېرىپ يېتىشتۈرۈلگەن تاش بادام ، ئاچچىق بادام ، شاپ-تۇل بادام ، شاپتۇل قاتارلىقلارنىڭ 1 — 2 يىللىق كۆچەتلىرىنى تاللاپ ئۇلاق ئاستى قىلىش لازىم . ئۆرۈك ، ئالۇچا ، قارىئۆرۈك ، ئەينۇلا ، گىلاس قاتارلىقلارنى ئۇلاق ئاستى قىلىپ تاللاشقا بولمايدۇ .

2. ئۇلاق ئۈستىنى تاللاش

بادام سورتلىرىنىڭ ئىچىدە قەغەز شاكالىق بادام ، ئارا قەغەز شاكالىق بادام ۋە ئارا شاكالىق باداملارنىڭ مەھسۇلاتى يۇقىرى ، ھەر خىل تەبىئىي شارائىتلارغا بولغان ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك بولۇپ ، قىسقا مېۋە شاخلىرىدا مېۋىلەشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە . ئاپتونوم رايونىمىزدا ئاساسلىق تەرەققىي قىلدۇرۇلىدىغان بادام سورتلىرىدىن چوڭ بادام ، قەغەز شاكالىق چىلگە بادام ، پىستە بادام ، ياپىلاق بادام ، قوش مېۋىلىك بادام ، قەغەز شاكالىق قوش-حاق مېغىزلىق بادام ، ئارا شاكالىق مازا بادام قاتارلىقلار بار . بۇ سورتلارنىڭ مەھسۇلاتى مۇقىم ، شاكىلى نېپىز ، مېغىزى تەملىك بولۇپ ، كۆپىنچە ھاللاردا مېۋىسى قىسقا مېۋە شاخلىرىغا ئورۇنلاشقان بولىدۇ . يۇقىرىقى سورتلار ئىچىدىن ئاساسلىق سورتلارنى ئىككى نىسبەتتە ، قوشۇمچە چاڭلاشتۇرغۇچى سورتلارنى بىر نىسبەتتە ئۇلاق ئۈستى قىلسا ، دەرەخلەرنىڭ سورتىغا ۋە مېۋە مەھسۇلاتىنىڭ مىقدارىغا

دارىغا كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ .

3 . بىخ تاللاش

بولۇق مېۋىلەش باسقۇچىغا كىرگەن 8 — 15 يىللىق ئۆسۈش تارىخىغا ئىگە ئەلا سورتلۇق بادام دەرەخلىرى ئىچىدىن باراقسان ئۆسكەن ، تېنى ساغلام ئانا تۈپلەرنى تاللاپ ، بىر يىللىق نوتلار كېسىپ يىغىۋېلىنغاندىن كېيىن بىخ ئېلىپ ئۆلىنىدۇ ، نوتلارنى تاللاپ كېسىشتە ، دەرەخ تاجىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىنىڭ سىرتىدىن ، يەنى كۈن نۇرى تولۇق چۈشكەن تەرەپتىن تاللاپ يىغىۋېلىش لازىم .

4 . ئۇلاش مەزگىلى

ئۇلاق ئاستى قىلىنىدىغان 1 — 2 يىللىق كۆچەتلەرنى ئەتىياز ، ياز ، كۈز پەسىللىرىدە ئۇلاشقا بولىدۇ . 3- ئاي- نىڭ 20- كۈنلىرىدىن 4- ئاينىڭ ئاخىرلىرىغىچە مەخسۇس توغلىتىپ ساقلانغان نوتىدىن بىخ ئېلىپ بىخ ئۇلاق ئۇلاشقا بولىدۇ . 5- ئاينىڭ 25- كۈنلىرىدىن 7- ئاينىڭ 10- كۈنلىرىگىچە دەرەخ ئۈستىدىن ئۇدۇللۇق نوتا ئېلىپ ، ئۇ- دۇللۇق بىخ ئۇلاق ئۆلىنىدۇ . 9- ئاينىڭ باش ۋە ئاخىرلىرىدا كۈزلۈك بىخ ئۇلاق ئۇلاشقا بولىدۇ . بادام كۆچەتلىرى كۆپىنچە ھاللاردا ئەتىياز ۋە ياز پەسىلىدە كۆپرەك ئۆلىنىدۇ .

5 . ئۇلاش ئۇسۇلى

ئەتىيازلىق ، يازلىق ، كۈزلۈك بىخ ئۇلاق ئۇلاشنىڭ ئۇسۇللىرى مۇنداق : بىخ ئۇلاق ئۈچۈن دىئامېتىرى

0.5 — 1.5 سانتىمېتىر كېلىدىغان 1 — 2 يىللىق كۆچەتلەرنى ئۇلاق ئاستى قىلىشقا بولىدۇ. بىخ ئۇلاق قىلىشتا «T» شەكىللىك ئۇلاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. ئالدى بىلەن ئۇلاق ئاستى قىلىنىدىغان كۆچەتنىڭ شاخلىرى يەر يۈزىدىن 15 — 20 سانتىمېتىر ئېگىزلىكتە قاچا بىلەن كېسىپ تاشلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن، كېسىلگەن كۆچەتنىڭ ئۈچىدىن 2 سانتىمېتىر قالدۇرۇپ، غولى تۈز، سىلىق يەر تاللىنىپ، كۆچەتنىڭ قوۋزىقى ئۇلاق پەيدىقى بىلەن «T» شەكلىدە تىلىنىپ ئېغىز ئېچىلىدۇ. ئارقىدىنلا ئۇلاق ئۈستى بىخى نۆتىدىن شىلىپ ئېلىنىپ، «T» شەكىللىك ئورۇنغا يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ سېلىنىدۇ. بىخنىڭ كۆزى سىرتتا قالدۇرۇلۇپ، قالغان قىسمى سۇلياۋ شوينا بىلەن يۇقىرىدىن تۆۋەنگە چىڭ تېڭىپ قويۇلىدۇ. ئۇلانغان بىخ 2 — 3 سانتىمېتىر كۆكلەپ چىققاندا تېڭىلغان تېڭىق يېشىۋېتىلىدۇ. كۈز پەسلىدە ئۇلانغان كۆچەتلەرنىڭ تېڭىقى ئەتىياز پەسلىدە بىخ كۆكلەپ چىققاندىن كېيىن يېشىۋېتىلسە بولىدۇ.

6. پەرۋىش قىلىش

كۆچەتلەر ئۇلانغاندىن كېيىن، ئۇلاق تۈپىنىڭ ئەسلىدىكى غولىدىن ئۆسۈپ چىققان ياۋا شاخلارنى ۋاقتىدا پۇتاپ تۈرۈش كېرەك. كۆچەتلەرنى ئۇلاپ بىر ئاي ئۆتكەندىن كېيىن، تۈۋىدىن تاپ ئېچىپ 1 — 2 قېتىم قوشۇمچە ئوغۇت بېرىش، 6 — 7 قېتىم سۇغىرىپ، 5 — 6 قېتىم تۈۋىنى چاناپ، ئوتىنى پۇتاپ پەرۋىشنى كۈچەيتىش كېرەك.

رەك . 9- ئاينىڭ 20- كۈنلىرى ئەتراپىدا سۈيىنى توختى-
تىپ ، ئۇچىنى قىرقىۋېتىش ، 11- ئاينىڭ 10 — 20-
كۈنلىرى ئارىلىقىدا كۈزلۈك سۇ قويۇپ ، كۆچەتلەرنى
قىشتىن ئۆتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك .

3. چىلان كۆچىتىنى ئۇلاش

چىلان كۆچىتىنى ئۇلاش دېگەندە ، شىنجاڭ باغ چىلد-
نى (يۇمىلاق كىچىك چىلان) ، ئاچچىق چىلان (ياۋا چى-
لان) ، قاپاق چىلان (سوقا چىلان) قاتارلىقلارنىڭ ئۇرۇ-
قىدىن تېرىپ يېتىشتۈرۈلگەن 1 — 2 يىللىق كۆچەتلەرنى
ئۇلاق ئاستى قىلىپ ، ئەلا سورتلۇق چىلانغا ئۇلاش كۆزدە
تۇتۇلىدۇ . چىلان كۆچەتلىرىنى ئۇلاش ئۇسۇللىرى بىرقە-
دەر كۆپ ، ئەمما بەزى ئۇسۇللارنىڭ مەشغۇلاتى مۇرەككەپ
بولۇپ ، كەڭ تۈردە قوللانماق قىيىن ، شۇڭا بۇلارنىڭ
ئىچىدە قوللىنىش دائىرىسى كەڭ ، ئۇلاش ئۇسۇلى ئاددىي ،
كۆكلەش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغانلىرىدىن يا-
غاچلىق بىخ ئۇلاق ۋە «T» شەكىللىك قوۋزاقلىق بىخ
ئۇلاقتىن ئىبارەت ئىككى خىل ئۇسۇل بار .

1. ئۇلاق ئۈستىنى تاللاش

ئاپتونوم رايوندىكى مۇناسىۋەتلىك تارماقلار تەكشۈ-
رۈپ بېكىتكەن ۋە كېڭەيتىشكە بولىدۇ دەپ قارىغان ئەلا
سورتلارنى تاللاپ ئۇلاق نوتىسى ئېلىش لازىم . ئادەتتە

ھەرقايسى جايلاردا ئۆستۈرۈلۈۋاتقان ياخشى سورتلار ئىچىدە -
 دىن دانىسى چوڭ ، ئېتى قېلىن ، ئۇرۇقى كىچىك ، پوستى
 نېپىز ، قەنت تەركىبى يۇقىرى ، ئېتى چۈرۈك ، ئېلاستىك -
 لىقى ياخشى ، يۆتكەشكە قۇلايلىق ھەم ھۆل ئىستېمال
 قىلىشقا ، ھەم قۇرۇتۇپ ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغان ئەلا
 سورتلۇق ئانا تۈپلەرنى تاللاپ نوتا ئېلىش كېرەك . شۇنداقلا
 جاڭنىڭ يەرلىك چىلان سورتلىرىدىن قۇمۇل چىلىنىنى
 ئاساس قىلىش ، ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەلتۈرۈپ يەرلەش -
 تۈرۈلگەن سورتلاردىن نەشپۈتسىمان چىلان ، ئالمىسىمان
 چىلان ، ئۇرۇقسىز چىلان ، دۇنخۋاڭ چىلىنى ، زەنخاڭ
 چوڭ چىلىنى ، شياڭزاۋ چىلىنى ، چۈنزاۋ چىلىنى قاتار -
 لىقلاردىن ئەڭ ياخشىلىرىنى تاللاپ نوتا يىغىدىغان ئانا تۈپ
 قىلىش لازىم .

2. نوتا يىغىش

نوتا ئالىدىغان سورتلار بېكىتىلگەندىن كېيىن نوتا
 يىغىشنى باشلاش لازىم . ئەتىيازدا ياغاچلىق بىخ ئۇلاققا
 ئىشلىتىلىدىغان نوتىلارنى 2- ئاينىڭ باشلىرىدىن 3- ئاي -
 نىڭ ئاخىرلىرىغىچە كېسىۋېلىپ ، مۇزخانىدا ياكى سايە
 يەردىن ئورا كولاپ ، نەم قۇم بىلەن توڭلىتىپ ، 4- ئاينىڭ
 10- كۈنلىرىگىچە نوتىنىڭ نەملىكىنى نورمال ساقلاش
 لازىم . ياغاچلىق بىخ ئۇلاققا ئىشلىتىلىدىغان نوتىلار ئال -
 دىنقى يىلى قاۋۇل ئۆسكەن ، بىخى تولۇق ، ساغلام يېتىل -
 گەن بىر يىللىق شاخلاردىن يىغىۋېلىنسا بولىدۇ ، يازلىق
 ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ۋە « T » شەكىللىك قوۋزاقلق بىخ

ئۇلاققا ئىشلىتىدىغان نوتلار ئۇلاش مەزگىلىدە ئۇدۇللۇق يىغىۋېلىپ ، ئۇدۇللۇق ئۇلانسا بولىدۇ . بۇ خىل نوتلار شۇ يىلى يېڭىدىن ئۆسۈپ ، ساغلام يېتىلگەن يۇمران شاخ-لاردىن كېسىۋېلىنىدۇ .

3. ئۇلاق ئاستىنى تاللاش

ئۇلاق ئاستى قىلىش ئۈچۈن ، ئالدى بىلەن 15 — 20 سانتىمېتىر ئېگىزلىكتىكى دىئامېتىرى 0.8 — 2 سانتىمېتىر بولغان ساغلام ئۆسۈۋاتقان 1 — 2 يىللىق يۇمران كۆچەتلەر تاللىۋېلىنىدۇ . ئۇلاشتىن 8 — 10 كۈن ئىلگىرى كۆچەتلەر قاندۇرۇپ سۇغىرىلىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇلىنىدىغان كۆچەتلەرنىڭ غول شاخلىرى ئۇدۇللۇق يەر ئۈستىدىن 15 — 20 سانتىمېتىر قالدۇرۇپ قايچا بىلەن كېسىپ تاشلىنىدۇ . ئاستىنقى غولىدىكى شاخ - پۇتاقلىرى قىرقىپ تاشلىنىپ ئۇلاشقا تەييارلىنىدۇ .

4. ئۇلاش مەزگىلى

1 — 2 يىللىق چىلان كۆچەتلىرىنى 4 - ئاينىڭ 10 - كۈنىدىن 5 - ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ، 5 - ئاينىڭ 25 - كۈنلىرىدىن 7 - ئاينىڭ 10 — 15 - كۈنلىرىدە گىچە ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ۋە «T» شەكىللىك قوۋزاقلىق بىخ ئۇلاق ، 9 - ئاينىڭ 1 - كۈنلىرىدىن 20 - كۈنلىرىدە گىچە «T» شەكىللىك قوۋزاقلىق بىخ ئۇلاق ئۇلاشقا بولىدۇ .

ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ئۆسۈلىنى ئەتىيازدا ۋە يازدا قول-

لىنىشقا بولىدۇ ، ئەتىيازدا قوللانغاندا مۇرخانىدا ياكى ئو-
رىدا توڭلىتىپ ساقلانغان بىخ ئىشلىتىلىدۇ . يازدا قوللان-
غاندا بىر ياقىتىن نوتا ئېلىپ ، بىر ياقىتىن ئۇلاش ئېلىپ
بېرىلىدۇ . ئۇرۇقلۇق نوتىلار مەيلى قىشتا ئېلىنغان بول-
سۇن ياكى يازدا ئېلىنغان بولسۇن ، شامال تېگىپ قالمى-
غان ، سېسىپ كەتمىگەن ، بىخ ئورنى زېدە بولۇپ قالمى-
غان ، قىسقىسى ، ياخشى ساقلانغان بولۇشى كېرەك .

5. ئۇلاش ئۇسۇلى

چىلان كۆچىتىنى ئۇلاشتا ، دىئامېتىرى 2 سانتىمې-
تىردىن تۆۋەن بولغانلىرىغا « T » شەكىللىك ياغاچلىق بىخ
ئۇلاق ۋە « T » شەكىللىك قوۋزاقلىق بىخ ئۇلاق ئۇلاش
ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ .

1. « T » شەكىللىك ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ئۇلاش

ئۇلاش ۋاقتى 4- ئاينىڭ 10- كۈنلىرىدىن 5- ئاينىڭ
ئاخىرلىرىغىچە بولىدۇ . بۇ مەزگىلدە مۇرخانىدا ياكى ئورد-
دا توڭلىتىپ ساقلانغان ساغلام نوتىلاردىن بىر تال بىخ
قوۋزاق ئورنىدىكى ياغاچلىق قىسمى بىلەن نېپىز يونۇپ
ئېلىنىپ ، ئۇلاق ئاستىدىكى پىچاق بىلەن يېرىلغان « T »
شەكىللىك قوۋزاق ئىچىگە ئاۋايلاپ كىرگۈزۈلىدۇ . ئۇنىڭ-
دىن كېيىن ، ئۇلاق سۇلياۋ شوينا بىلەن ئۈستىدىن ئاستى-
غا قارىتىپ ھىم تېڭىلىدۇ . 5- ئاينىڭ 25- كۈنلىرىدىن
7- ئاينىڭ 10- كۈنلىرىگىچە ئۈلەندىدىغان كۆچەتلەر-
نىمۇ « T » شەكىللىك بىخ ئۇلاق قىلىپ ئۇلاشقا بولىدۇ .
بۇ مەزگىلدە شۇ يىلى يېڭىدىن ئۆسۈپ چىققان يېرىم ياغاچ-

لانغان ساغلام نوتىلار ئۇلاق ئۈستى قىلىنىدۇ . بۇنى ئۇ-
لاش ، تېخىش ئۈسۈلى يۇقىرىقىدەك بولىدۇ . ياغاچلىق بىخ
ئۇلاق ئۈسۈلى بىلەن ئۇلانغان كۆچەتلەردىكى بىخلارنىڭ
كۆكلەپ چىقىشىغا ئۇزاقراق ۋاقىت كېتىدۇ . ئەمما ، كۆك-
لىۋالسا ئۆسۈشى تېز بولىدۇ . كۆكلەش ۋاقتىنى قىسقار-
تىش ئۈچۈن ، بىخ بىلەن كېسىپ ئېلىنغان ياغاچلىق قىس-
مىنى نېپىز ۋە تۈز ئېلىش كېرەك .

2 . «T» شەكىللىك قوۋزاقلىق بىخ ئۇلاق
بۇ ئۈسۈل يازدا ۋە كۈز پەسلىدە كەڭ تۈردە قوللىنىد-
لىدۇ . ۋاقىت جەھەتتىن ، يازلىق ئۇلاق 5- ئاينىڭ 25-
كۈنلىرىدىن 7- ئاينىڭ 15- كۈنلىرىگىچە ، كۈزلۈك ئۇلاق
8- ئاينىڭ 25- كۈنلىرىدىن 9- ئاينىڭ 20- كۈنلىرىگىچە
ئېلىپ بېرىلىدۇ .

ئۇلاق ئاستىنىڭ ئۇلاق ئورنى (قوۋزىقى) توغرىسىغا
0.8 — 1 سانتىمېتىر «—» شەكلىدە كېسىلگەندىن كې-
يىن ، «—» شەكىللىك سىزىقنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئاستىغا
قارىتىپ «1» شەكلىدە يەنە 2 سانتىمېتىرچە كېسىلىدۇ .
بۇ چاغدا ئۇلاق ئاستىنىڭ قوۋزىقىدا «T» شەكىللىك ئۇلاق
ئورنى ھاسىل بولىدۇ . ئاندىن ئۇلاق نوتىسى كەڭلىكى
0.5 — 0.6 سانتىمېتىر ، ئۇزۇنلۇقى 1.5 — 2 سانتى-
مېتىر كېسىلىپ ، بىر تال بىخ قوۋزاق بىلەن سويۇپ
ئېلىنىدۇ . بىخنى ياغاچتىن سويۇپ ئالغاندا بىخنىڭ ئىچى-
دىكى مېغىزنى ياغاچتىن تولۇق ئاجرىتىپ ئېلىشقا دىققەت
قىلىش لازىم . بىخنىڭ مېغىزى بولمىسا ئۇلاق كۆكلىمەي-
دۇ . ئېلىنغان بىخ ئۇلاق ئاستىدىكى «T» شەكىللىك

ئورۇنغا سېلىنغاندىن كېيىن ، يۇقىرىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ سۇلياۋ شوينا بىلەن مەھكەم تېخىش كېرەك .

6 . پەرۋىش قىلىش

چىلان كۆچەتلىرىنى ئۇلاپ 15 — 20 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ، ئومۇميۈزلۈك بىر قېتىم تەكشۈرۈپ ، كۆكلىمىدەگەن ۋە كۆكلەش ئىمكانىيىتى بولمىغان كۆچەتلەرنى قايتا ئۇلاش كېرەك . كۆچەتلەرنى ئۇلغاندىن كېيىن 15 — 20 كۈنگىچە سۇغارماسلىق ، ئۇلاق ئورنىنىڭ سېسىپ كېتىدىغانلىقىنى ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ، بىرمەھەل چىققاپ سۇغارماسلىق كېرەك . ئۇلاقنىڭ ئاستىدىكى ۋە ئۈستىدىكى غول - پوتاكلاردىن ئۆسۈپ چىققان ياۋا بىخلارنى ۋاقتىدا پۇتاپ تۇرۇش ، ئۇلغان كۆچەتنىڭ نوتەسى 3 — 5 سانتىمېتىر ئۆسكەندە سۇلياۋ تېخىقنى يېشىۋېتىش ، 20 — 30 سانتىمېتىر ئۆسكەندە ، ئۇلاق ئاستىغا شاخ - تاياق تېخىپ ، ئۇلاق نوتىلىرىنى بوران سۈندۈرۈۋېتىشتىن مۇداپىئە كۆرۈش كېرەك . كۆچەتلەر 6 - ئاي ئىچىدە ئۇلانسا ، ئۇنىڭ كۆكلەش نىسبىتى %95 تىن يۇقىرى بولىدۇ ، بىر يىلدىكى ئېگىزلىكى 1.5 مېتىرغا يېتىدۇ . ئومۇمەن ، چىلان كۆچەتلىرىنى ئۇلغاندىن كېيىن ، كۆكلەش ، ئەي بولۇش نىسبىتىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەن بولۇشى پەرۋىش قىلىشنىڭ ياخشى - يامان بولۇشىغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ . شۇڭا ، كۆچەتلەرنى ئۇلغاندىن كېيىن ، تاڭغان سۇلياۋنى يېشىۋېتىش ، ھارام شاخلىرىنى پۇتاش ، ئۈچىنى ياندۇرۇش ، يېنىغا تىرەك قويۇش قاتارلىق پەر-

ۋىش ئىشلىرىنى ياخشى ئىشلىگەندىن باشقا ، توپىسىنى بوشىتىش ، سۇغىرىش ، ئوتىنى ئوتاش ، قوشۇمچە ئوغۇتلاش ، كېسەللىك ، زىيانداش ھاشاراتلاردىن ساقلاش ، كۆچەتلەرنىڭ قىش پەسلىدە سۇسىزلىنىشتىن ئۇششۇپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك .

كۆچەتلەر ئۇلانغاندىن كېيىن ، ئىككى قېتىم قوشۇمچە ئوغۇتلاپ بويىغا ۋە توغرىسىغا ئۆسۈش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش لازىم . كۈز پەسلىدە 11- ئاينىڭ 20- كۈنلىرىدىن كېيىن قىشلىق توك سۈيى قويۇپ ، كۆچەتلەرنىڭ ئۇششۇپ كېتىشىدىن مۇداپىئە كۆرۈش كېرەك .

4 . ئۈزۈم تېلىنى ئۇلاش

ئۈزۈم تېلىنى ئۇلاش ئاپتونوم رايونىمىزدا 60 - يىلدىن لاردىن كېيىن كىچىك دائىرىدە تەجرىبە قىلىپ مۇۋەپپەقىيەت يەت قازانغان ئۇسۇللارنىڭ بىرى بولۇپ ، 80 - يىللاردا كېڭەيتىلىپ بىر قىسىم جايلاردا قوللىنىلغان . 90 - يىلدىن لاردا ئۈزۈم تېلىنى ئۇلاشنىڭ تۈرلۈك ئىلغار ئۇسۇللىرى بارلىققا كېلىپ ، ئۈزۈمنىڭ سورتلۇق كۆچەتلىرىنى يېتىشتۈرۈشتە مۇۋەپپەقىيەت قازىنىلدى . ھازىر ئۇنىڭ بىر-نەچچە خىل ئۇسۇللىرى ئۈزۈمنىڭ سورتلۇق كۆچەتلىرىنى يېتىشتۈرۈش ۋە ئۈزۈم سورتلىرىنى ياخشىلاشتا كەڭ قوللىنىلىدىغان بولدى . بۇنىڭ ئىچىدە ئۇلاش ئۇسۇلى ئاددىي ، ئۇلاش سۈرئىتى تېز ، كۆكلەش ئۈنۈمى بىرقەدەر

ياخشى بولغانلىرىدىن شاخ ئۇلاق ، يارما ئۇلاق ، تىل ئۇلاق ، چاپلىما ئۇلاق ، بىخ ئۇلاق قاتارلىق ئۇسۇللار بار .

1. ئۇلاق ئۈستىنى تاللاش

ئۈزۈم تېلىنى ئۇلاشتا ، ئۇلاق ئۈستى قىلىنىدىغان ئەلا سورتلارنى ياخشى تاللاش كېرەك . مەيلى شىنجاڭنىڭ يەرلىك ئۈزۈم سورتلىرى بولسۇن ياكى ئىچكىرى ئۆلكىلەر ۋە چەت ئەللەردىن كىرگۈزۈپ ئۆستۈرۈلگەن سورتلار بولسۇن ، ئۇنىڭ شۇ يەرنىڭ تەبئىي شارائىتىغا ماسلىشىش ئىقتىدارى ، سورت ۋە سۈپىتىنىڭ ھەقىقەتەن ياخشىلىقى ، مېۋىسىنىڭ تاتلىقلىقى ، رەڭگىنىڭ كۆركەملىكى ، قەنت تەركىبىنىڭ يۇقىرىلىقى ، ساقلاش - يۆتكەشكە قۇلايلىقلىقى ، پىششىقلاپ ئىشلەشكە مۇۋاپىق كېلىدىغانلىقى ، ھۆل ياكى قۇرۇتۇپ ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغانلىقى ، مەملىكەت ئىچى ۋە خەلقئارا بازارنىڭ شۇ خىل سورتقا بولغان ئېھتىياجى ۋە ئۇنىڭ ئىقتىسادىي قىممىتى قاتارلىقلارنى تولۇق ھېسابقا ئېلىپ ، ئەڭ ياخشى سورتلارنى تاللاپ ، ئۇلاپ كۆپەيتىش كېرەك . ئومۇمەن ، ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ يېزا ئىگىلىك ، باغۋەنچىلىك ، پەن تەتقىقات تارماقلىرى تەرىپىدىن «كېڭەيتىشكە بولىدۇ» دەپ بېكىتىلگەن ئەلا سورتلارنى تاللاپ كۆچەت يېتىشتۈرۈش ياكى شۇ خىل سورتلارنى كېڭەيتىش لازىم .

2. نوتا تاللاش ۋە يىغىش

ئۇلاق ئاستى ۋە ئۇلاق ئۈستى نوتىلىرى كېسەللىك ،

ھاشارات زىيىنىغا ئۇچرىمىغان ، قاۋۇل ، ساغلام ئۆسكەن شۇ يىللىق يېڭى نوتىلاردىن بولۇش كېرەك . ئەمما ، ئۇ-زۈمىنى يارما ئۇلاق ئۇلاش شۇ يىللىق نوتىلاردىن باشقا 2 — 3 يىللىقتىن يۇقىرى چوڭ تۈپلەرگىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ . شۇ يىللىق يۇمران نوتىلارنى ئۇلاشتا ئۇلاق ئاستى ۋە ئۇلاق ئۈستى نوتىلىرىنىڭ توملۇقى ئوخشاش بولسا ، كۆكلەش ئۈنۈمىمۇ يۇقىرى بولىدۇ .

ئۇلاش مەزگىلى ۋە ئۇلاش ئۇسۇلى
ئۈزۈم تېلى ئەتىيازدا (3 - ، 4 - ئايلاردا) ، كۆپىنچە ھاللاردا يازدا (6 - ، 7 - ئايلاردا) ئۇلىنىدۇ . ئۈزۈم تاللىرىنى ئۇلاشتا 4 — 5 كۈن ئىلگىرى بىر قېتىم سۇغىرىپ ، تۈۋىدىكى ئۆت - چۆپلەرنى يۇلۇپ تازىلىۋېتىش لازىم . شۇ يىللىق يۇمران نوتىلار ئەتىگەن ياكى كەچ تەرەپلەردە ئۇلانسا ئۈنۈمى ياخشىراق بولىدۇ . ئۇلىغاندا نوتىنى (بىخنى) ئۇدۇللۇق ئېلىپ ، ئۇدۇللۇق ئۇلاش ، ئەگەر نوتا ئالىدىغان يەرنىڭ ئارىلىقى يىراق بولۇپ ، بىر قېتىمدا كەلتۈرۈلگەن نوتا كۆپرەك بولسا ، شۇ كۈنى ئۇلاپ ئېشىپ قالغان نوتىلارنى سوغۇق ، سايە يەردە نەم قۇمغا كۆمۈپ ساقلاش كېرەك .

كۆپ قوللىنىلىدىغان ئۇلاش ئۇسۇللىرى تۆۋەندىكىچە :

1 . يارما ئۇلاق (شاخ ئۇلاق)
بۇ ئۇسۇل ئۈزۈمنىڭ چوڭ تۈپلىرىگىمۇ ، شۇ يىللىق يۇمران نوتىلىرىنى ئۇلاشقىمۇ باب كېلىدۇ . بۇ ئۇسۇلنى

چوڭ تۈپلەرگە قوللانغاندا ، ئالدى بىلەن ئۇلاق ئاستى يەر -
دىن 10 سانتىمېتىر ئېگىزلىكتە كېسىپ تاشلىنىدۇ . ئۇلاق
ئاستىنىڭ كېسىلگەن كۆتىكى 3 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا
ئوتتۇرىدىن يېرىلىدۇ ، ئاندىن 5 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا
كېسىپ تەييارلانغان بىخ يېرىپ تەييارلانغان ئۇلاق ئاستىغا
سانجىلىپ ، سۇلياۋ شوينا بىلەن تۆۋەندىن يۇقىرىغا قارى-
تىپ مەھكەم تېگىلىدۇ . ئۇنىڭ ئۈستىگە نەم توپا تۆكۈ-
لۈپ ، ئۇلاقلىق بىخ سۈرگەندىن كېيىن ئېلىۋېتىلىدۇ .
ئۇلىغاندا بىر تال بىخ ئۇلاق ئاستىدىن 2 — 3 سانتىمېتىر
ئۈستىگە چىقىپ تۇرۇشى كېرەك .

ئۈزۈم تېلىنى شۇ يىللىق يېرىم ياغاچلانغان ، كۆك
يۇمران نوتلىرىنى ئۇلاق ئاستى قىلىپ يارما ئۇلاق ئۇلاشقا
بولىدۇ . ئەمما ، ئۇلاق ئاستى بىلەن ئۇلاق ئۈستىنىڭ توم-
لۇقى ئوخشاش بولۇشى كېرەك . ئۇلاش ئۇسۇلى : ئالدى
بىلەن ئۇلاق ئاستى قىلىنىدىغان نوتىنىڭ شېخى 20 سانتى-
مېتىر ئېگىزلىكتە كېسىپ تاشلىنىدۇ . كەسمە يۈزىنىڭ
ئوتتۇرىسىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ پىچاق بىلەن 3 سانتىمېتىر
يارغاندىن كېيىن ، 6 — 8 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا كې-
سىپ ، ئىككى يان تەرىپىدىن 3 سانتىمېتىر شىلىپ (شېنا
شەكلىدە) تەييارلانغان ئۇلاق ئۈستى نوتىسى ئۇلاق ئاستى-
نىڭ يېرىلغان يېرىگە ئاۋايلاپ كىرگۈزۈلىدۇ ، ئاندىن بىخ
ئورنى ئوچۇق قالدۇرۇلۇپ ، قالغان جايلىرى سۇلياۋ شوينا
بىلەن چىڭ تېگىلىدۇ .

2 . بىخ ئۇلاق (چاسا بىخ ئۇلاق)

ئۈزۈمنى چاسا بىخ ئۇلاق ئۇلاش ئۇسۇلى شۇ يىللىق

يۇمران نوتلارغا قوللىنىلىدۇ. ئالدى بىلەن ئۇلاق ئۈستى قىلىنىدىغان يۇمران نوتىدىن ئۇزۇنلۇقى 2 سانتىمېتىر ، توغرىسى 1 سانتىمېتىر قىلىپ چاسا شەكلىدە بىخ كېسىۋېتىلىندۇ ، ئاندىن ئۇلاق ئاستى قىلىنىدىغان نوتىنىڭ سىلىق ، تۈز ، تومراق كەلگەن يېرىدىن ئۇلاق ئورنى بەلگىلىنىپ ، چاسا شەكىللىك بىخنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىلەن ئوخشاش چوڭلۇقتا كېسىپ قوۋۇرۇقى ئېلىۋېتىلىدۇ . بىخ ئۇلاق ئاستىدىكى قوۋۇزاق ئورنىغا ئۇدۇلمۇئۇدۇل قىلىپ سېلىنغاندىن كېيىن ، سۇلياۋ شوپىنا بىلەن چىڭ تېگىلىدۇ .

4 . پەرۋىش قىلىش

ئۈزۈم تاللىرى ئۆلىنىپ 15 — 20 كۈندىن كېيىن يېڭى نوتا چىقىرىشقا باشلايدۇ . يېڭى نوتا 20 — 25 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا ئۆسكەندە ئۇلاق ئاستىنىڭ يېنىغا ياغاچ ياكى شاخ سانجىپ نوتىنى ياماشتۇرۇپ قويۇش لازىم . ئۇلاق تۈۋىدىن چىققان ياۋا بىخلارنى ۋاقىتىدا پۇتاپ ، تۈۋىنى يۇمشىتىپ ، ئوت - چۆپلەرنى ئوتاپ تۇرۇش كېرەك . ئۇلانغان نوتىلارنى بەك كۆپ سۇغارماسلىق ، نوتىنىڭ بىھۈدە ئۆسۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ، ئۇلانغان نوتىدىن 8 — 10 تال يوپۇرماق ئۆسۈپ چىققاندىن كېيىن ، ئۈچىنى ئۈزۈۋېتىش ، نوتىلارنىڭ ياغاچلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ، بالدۇر ئۆشۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم . كۈز پەسلىدە ، سۇغىرىپ بولغاندىن كېيىن 11 - ئاينىڭ 20 — 25 - كۈنلىرى نەم توپا بىلەن كۆمۈپ قىشتىن ئۆتكۈزۈش كېرەك .

5. ئۆرۈك كۆچتىنى ئۇلاش

ئۆرۈكنىڭ 1 — 3 يىللىق ئۆسۈۋاتقان كۆچەتلىرىدىن دىئامېتىرى 0.5 سانتىمېتىردىن يۇقىرى ، 3 سانتىمېتىردىن تۆۋەن بولغانلىرىنى «T» شەكىللىك ياغاچلىق بخ ئۇلاق ، «T» شەكىللىك قوۋزاقلىق بخ ئۇلاق ، دىئامېتىرى 0.6 سانتىمېتىردىن تۆۋەن بولغانلىرىنى پىپى ئۇلاق (ناچا ئۇلاق) ئۇسۇللىرى ئارقىلىق ئۇلاشقا بولىدۇ . ئۇلاش ۋاقتى ۋە ئۇلاش ئۇسۇلى بادام ، چىلان ، ئالما ، نەشپۈت ، شاپتۇل قاتارلىقلارنىڭ كۆچتىنى ئۇلاش ۋاقتى ۋە ئۇلاش ئۇسۇلى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ . ئۇلاق ئۈستى قىلىنىدۇ . غان ئەلا سورتلارنى تاللاشتا (1) بابتىكى «ئۆرۈكنىڭ ئەلا سورتلىرىنى تاللاش» دېگەن تېمىغا قارالغۇ) يۇقىرىنىڭ باھالاپ بېكىتىشىدىن ئۆتكەن ئەلا سورتلارنى تاللاپ نوتا ئېلىش لازىم .

ئۆرۈك كۆچتىنى باشقا مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىگە ئوخشاش 3- ئاينىڭ 25- كۈنلىرىدىن 5- ئاينىڭ ئاخىرىغىچە توغلىتىلغان ئۇرۇق بىلەن ياغاچلىق بخ ئۇلاق ، 5- ئاينىڭ 25- كۈنلىرىدىن 7- ئاينىڭ 15- كۈنلىرىگىچە قوۋزاقلىق بخ ئۇلاق ، 6- ئايدا پىپى ئۇلاق ، 8- ئاينىڭ 20- كۈنىدىن 9- ئاينىڭ 20- كۈنلىرىگىچە كۈزلۈك قوۋزاقلىق بخ ئۇلاق قىلىپ ئۇلاشقا بولىدۇ . بىر يىللىق كۆچەتلىرىنى كۈزدە بخ ئۇلاق قىلىپ ئۇلغاندا ئۇنىڭ ئەتى-

ياز پەسلىدىكى كۆكلەش ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ . ئەتىياز ۋە يازدا ئۇلانغان كۆچەتلەر ياخشى پەرۋىش قىلىپ باشقۇ- رۇلسا ، كېلەر يىلى ئۇنى كۆچەتخانىدىن چىقىرىپ ئورمان بىنا قىلىشقا ئىشلەتكىلى بولىدۇ .

6 . نەشپۈت كۆچىتىنى ئۇلاش

ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ كەلگۈسى بەش يىل ئىچىدە بىنا قىلىنىدىغان نەشپۈت بازىسى قۇرۇلۇشى كۆپلىگەن ئەلا سورتلۇق نەشپۈت كۆچەتلىرىگە موھتاج بولۇپ ، ئەگەر يېتەرلىك كۆچەت بولمىسا بۇ پىلانى ئورۇنداش قىيىنغا توختايدۇ . شۇڭا ، ھازىر ئەلا سورتلۇق نەشپۈت كۆچەتلىرىنى كۆپلەپ يېتىشتۈرۈش كەڭ ئىستىقبالغا ئىگە . نەشپۈت - ئامۇتنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرى ياۋا ئامۇت (دولى) نىڭ ئۇرۇقىدىن تېرىپ يېتىشتۈرۈلگەن كۆچەتلىرىنى ئۇلاق ئاستى قىلىپ ئۇلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق يېتىشتۈرۈلىدۇ . شۇڭا ، ئەلا سورتلۇق نەشپۈت - ئامۇت كۆچەتلىرىنى يېتىشتۈرۈش كېرەك .

1 . نەشپۈتنىڭ ئەلا سورتلىرىنى تاللاش

ھازىر شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئۆستۈرۈلۈ- ۋاتقان يەرلىك نەشپۈت - ئامۇت سورتلىرى 50 خىلدىن ، ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەلتۈرۈپ يەرلەشتۈرۈلگەن نەشپۈت - ئامۇت سورتلىرى 50 خىلدىن ئاشىدۇ . لېكىن ،

بۇ سورتلارنىڭ ھەرقايسى جايلارغا تارقىلىشى ئوخشاش ئەمەس ، تەبئىي شارائىتقا ماسلىشىشچانلىقى ، مېۋىلەش خۇسۇسىيىتى ، سورت - سۈپەت جەھەتتىكى ئۆزئارا پەرقىمۇ ناھايىتى چوڭ . شۇڭا ، نەشپۈت - ئامۇت سورتلىرىنى ئۇلاپ كۆچەت يېتىشتۈرۈشتە ، ئۇلاق ئۈستى قىلىنىدىغان ئەلا سورتلارنى ياخشى تاللاپ ، سۈپەتنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش كېرەك .

ئەلا سورتلۇق نەشپۈت - ئامۇت كۆچتى يېتىشتۈرۈشتە ، تۆۋەندىكى سورتلارنى ئۇلاق ئۈستى قىلىپ تاللاش لازىم .

1) كورلا نەشپۈتى . بۇ سورت كورلىغا مەركەزلىك تارقالغان بولۇپ ، مېۋىسىنىڭ ئېغىرلىقى 80 — 170 گرام كېلىدۇ . مېۋىسىنىڭ رەڭگى كۆركەم ، ئېتى ئاق ، پوستى نېپىز ، سۇلۇق ، چۈرۈك ، تەمى تاتلىق ھەم پۇراقلىق بولۇپ ، ساقلاشقا ، يۆتكەشكە قۇلايلىق . ئۇ سۈپەتلىك ياخشى ، خېرىدارى كۆپ ، ئىقتىسادىي قىممىتى يۇقىرى بولغان ئەڭ ئەلا سورت ھېسابلىنىدۇ .

2) چىپان نەشپۈتى . بۇ سورت قاغىلىق ناھىيىسىنىڭ چىپان يېزىسىدا ۋە جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئۆستۈرۈلىدۇ . چىپان نەشپۈتى كېڭەيتىشكە بولىدىغان ئاساسلىق سورتلارنىڭ بىرى بولۇپ ، تەبئىي شارائىتقا ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك ، مېۋە شەكلى يۇمىلاق ياكى ئېللىپسىسىمان ، چوڭلۇقى ئوتتۇرا ھال ، رەڭگى سارغۇچ يېشىل ، ساپىقى ئىنچىكە ، ئېتى ئاق ۋە يۇمشاق ، سۇلۇق ، تەمى تاتلىق . ئىچىدە ئۇرۇقى بولمايدۇ ، 9 - ئايلاردا پىشيدۇ .

3) سۈيۈڭ قىشلىق سېرىق ئامۇتى . بۇ خىل ئامۇت غۇلجا ، سۈيۈڭلەردە ئاساسلىق ئۆستۈرۈلىدىغان ئەلا سورتلارنىڭ بىرى بولۇپ ، ئوتتۇرىچە ئېغىرلىقى 130 گرام كېلىدۇ . مېۋىسىنىڭ شەكلى يۇمىلاقراق ، رەڭگى سېرىق بولۇپ ، سەل پارقىرايدۇ . ئېتى ئاقۇچراق بولۇپ يۇمشاق ، سۇلۇق ، چۈرۈك ھەم تاتلىق . مېۋىسى سوغۇققا چىداملىق بولۇپ ، 2 - يىلى 5 - ئايلارغىچە ئۆز پېتى ساقلىغىلى بولىدۇ . مېۋىسى 9 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا پىشىدۇ .

4) يالى نەشپۈتى . بۇ ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەلتۈرۈلگەن سورت بولۇپ ، مېۋىسىنىڭ ئوتتۇرىچە ئېغىرلىقى 150 — 200 گرام كېلىدۇ . شەكلى تۇخۇمىسىمان ، رەڭگى يېشىلغا مايىل سېرىق ، كۈن چۈشكەن تەرىپى سۇس قىزىل ، پوستى سىلىق ، رەڭگى كۆركەم ، ئېتى ئاق ، يۇمشاق ، سۇلۇق بولۇپ ، تەمى تاتلىق ، پۇرىقى خۇشبۇي ، ئۇزاق ساقلاشقا چىداملىق ، يۆتكەشكە قۇلايلىق .

5) داڭسەن نەشپۈتى . بۇ سورتنىڭ ئەسلى ماكانى ئەنخۇي ئۆلكىسىنىڭ داڭسەن ناھىيىسى بولۇپ ، ھازىر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا كەڭ كۆلەمدە ئۆستۈرۈلۈۋاتىدۇ . داڭسەن نەشپۈتى كۆلەم جەھەتتىن كورلا نەشپۈتىدىن قالسىلا ئاساسىي ئورۇننى ئىگىلەيدۇ . داڭسەن نەشپۈتىنىڭ رەڭگى سېرىق ، سۈزۈك ، پۇراقلىق ، پوستى سىلىق ۋە نېپىز ، داغلىرى كىچىك ، ئېتى ئاق ، چۈرۈك ، سۇلۇق ، تەمى تاتلىق بولۇپ ، ئۇزاق ساقلاشقا ۋە قاپچىلاپ يۆتكەشكە چىداملىق ، بۇ سورت ئاپتونوم رايونىمىز بويىچە كېڭەيتىلىدىغان ئەلا سورتلارنىڭ بىرى . جايلار نەش-

پۈت - ئامۇت كۆچەتلىرىنى يېتىشتۈرۈشتە ، يۇقىرىقى سورتلارنى ئاساس قىلغاندىن باشقا ، ئۆز رايونىدا ئۆستۈ-رۈپ كېلىۋاتقان سورتلار ئىچىدىن بىرقەدەر ئەلا ، بازىرى ئىتتىك ، ئىقتىسادىي قىممىتى يۇقىرى ، كەلگۈسىدە رىقا-بەت ئۆستۈنلۈكىنى ساقلاپ قالالايدىغان ياخشى سورتلارنى تاللاپ ، شۇ خىل كۆچەتلەرنى كۆپرەك يېتىشتۈرۈشى لازىم .

2. نوتا يىغىش

ئۇلاق ئۈستى قىلىنىدىغان نوتىلارنى ئالدىن تاللاپ بېكىتىلگەن ئەلا سورتلۇق ئانا تۈپلەردىن يىغىۋېلىش لازىم . ئەتىياز پەسلىدە ، 1 — 3 يىللىق ياۋا ئامۇت كۆچەت-لىرىگە «T» شەكىللىك ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ، چوڭ نەش-پۈت دەرەخلىرىگە يارما ئۇلاق (شاخ ئۇلاق) قىلىشقا ئىش-لىتىدىغان نوتىلارنى ئادەتتە 2- ئاينىڭ 15- كۈنلىرىدىن 3- ئاينىڭ 10- كۈنلىرىگىچە بولغان ئارىلىقتا كېسىپ يىغىۋالسىمۇ ياكى نەشپۈت دەرەخلىرىنى قىشلىق چاتاشقا بىرلەشتۈرۈپ يىغىۋالسىمۇ بولىدۇ . يىغىۋال-غان نوتىلارنى 25 — 50 تالدىن باغلاپ مۇزخانىغا سې-لىپ ساقلاش لازىم . ئەگەر ، يېقىن ئەتراپتا مۇزخانا بولمى-سا ، كۈن نۇرى چۈشمەيدىغان سايە يەردىن ئورا كولاپ ، نوتىنى ئورغا سېلىپ نەم قۇم تۆككەندىن كېيىن ، شۇ يەردىلا توڭلىتىپ ساقلىسىمۇ بولىدۇ . ئۇلاق ئۈستى قىلى-نىدىغان نوتىلارنى ئەلا سورتلۇق ئانا تۈپلەردىن مېۋىگە كىرگىنىگە 5 — 15 يىل بولغان ، كېسەللىك ، زىيانداش

ھاساراتلارنىڭ زىيىنىغا ئۇچرىمىغان ، باراقسان ، ساغلام ئۆسكەن تۈپلەرنىڭ كۈن نۇرى چۈشىدىغان تەرىپىدىكى دە- رەخ تاجىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىن (سىرتىدىن) يى- غىۋېلىش كېرەك . مۇشۇ ئورۇندىن نوتا ئېلىپ ئۇلىغان كۆچەتلەر تولۇق كۆكلەپ ، بالدۇر مېۋىگە كىرىدۇ .

3. ئۇلاق ئاستىنى تەييارلاش

نەشپۈت - ئامۇت كۆچەتلىرىنى ئۇلاپ يېتىشتۈرۈشتە ياۋا ئامۇتنىڭ 1 — 3 يىللىق كۆچەتلىرى ئۇلاق ئاستى قىلىنىدۇ . ئۇلاقچىلىق باشلىنىشتىن ئىلگىرى ئالدى بى- لەن ئۇلاق ئاستى قىلىنىدىغان ياۋا ئامۇت كۆچەتلىرىنىڭ تۈۋىنى يۇمشىتىپ ، ئوت - چۆپلەرنى پاكىز ئوتاپ بولغان- دىن كېيىن ، قاندۇرۇپ سۇغىرىش كېرەك . ئۇنىڭدىن كېيىن ، 1 — 2 ئېتىزدىكى كۆچەتلىرىنى ئۇدۇللۇق ھالدا يەر يۈزىدىن 15 — 20 سانتىمېتىر قالدۇرۇپ ، ئۈستىنىكى غول - شاخلىرىنى تەكشى كېسىپ تاشلاپ ، كېسىلگەن شاخ - پۇتاقلىرىنى ۋاقتىدا يۆتكىۋېتىپ ئۇلاق ئۇلاشنى باش- لاش كېرەك .

4. نەشپۈت كۆچىتىنى ئۇلاش

ئەلا سورتلىق نەشپۈت ، ئامۇتنىڭ بىخلىرىنى ياۋا ئا- مۇت كۆچەتلىرىگە ئۇلاش ئەتىياز ، ياز ، كۈز پەسىللىرىدە ئېلىپ بېرىلىدۇ . ئۇلاشتا ، «T» شەكىللىك ياغاچلىق بخ ئۇلاق ، «T» شەكىللىك قوۋزاقلىق بخ ئۇلاق ، كىيىدۈرمە ئۇلاق (پىپى ئۇلاق ، ناچا ئۇلاق) ئۈسۈللىرى قوللىنىلىدۇ .

1. «T» شەكىللىك ياغاچلىق بىخ ئۇلاق
 بۇ ئۇسۇل ئۇلاق تۈپىنىڭ دىئامېتىرى $0.8 - 3$ سانتىمېتىر بولغان (ياۋا ئامۇت، بادام، ئۆرۈك، چىلان، ياڭاق، ئالما، شاپتۇل قاتارلىق) كۆچەتلەرگە قوللىنىلىدۇ. ئۇلاش مەزگىلى 3- ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن 4- ئاينىڭ ئاخىرلىرىغىچە، ھەتتا 5- ئاينىڭ ئاخىرلىرىغىچە بولسىمۇ بولىدۇ. ئۇلاق ئۈستىگە توڭلىتىلغان (ئويقۇدىن ئويغانمىغان) ئەلا سورتلۇق نەشپۈت نوتىسىنىڭ بىخى ئىشلىتىلىدۇ. ئۇلاش ئۇسۇلى: نوتىنىڭ ساغلام بىر تال بىخى پىچاق بىلەن $1.5 - 2$ سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا، $0.5 - 0.6$ سانتىمېتىر كەڭلىكتە ياغاچ قىسمى بىلەن قوشۇپ نېپىز شىلىپ چىقىرىۋېلىنىدۇ. ئۇلاق ئاستىنىڭ $15 - 18$ سانتىمېتىر ئېگىزلىكتىكى تۈز، سىلىق ئۆسكەن جايىدىن پىچاق بىلەن «T» شەكلىدە قوۋۇزىقى يېرىلىدۇ. ئېلىنغان ياغاچلىق بىخ ئۈستىدىن ئاستىغا قارىتىپ «T» شەكىللىك ئورۇنغا سېلىنغاندىن كېيىن، قول بىلەن مەھكەم بېسىپ تۇرۇپ، ئۈستىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ سۇلياۋ شوينا بىلەن چىڭ تېڭىپ قويۇلىدۇ.

2. «T» شەكىللىك قوۋۇزاقلىق بىخ ئۇلاق
 بۇ ئۇسۇل 5- ئاينىڭ 25- كۈنلىرىدىن 7- ئاينىڭ 15- كۈنلىرىگىچە يازلىق ئۇلاقتا، 8- ئاينىڭ 25- كۈنلىرىدىن 9- ئاينىڭ 15- كۈنلىرىگىچە كۈزلۈك ئۇلاقتا قوللىنىلىدۇ. بۇ ئۇسۇلدا ئۈلىنىدىغان سورتلۇق نەشپۈت دەرىخىنىڭ شۇ يىلى يېڭىدىن ئۆسكەن يېرىم ياغاچلانغان نوتىلىدىن رىدىن تاللاپ ئۇدۇللۇق يىغىۋېلىپ، ئۇدۇللۇق ئۈلىنىدۇ.

ئەگەر نوتىلار باشقا جايلاردىن كۆپرەك يۆتكەپ كېلىنگەن بولسا ، ساپە يەردە (گەمىدە) نەم قۇمغا كۆمۈپ ، ئۈستىدىن تۇمانلىتىپ سۇ پۈركۈپ يېشىل پېتى ياخشى ساقلاش لازىم . ساقلاش ۋاقتى ئەڭ ئۇزاق بولغاندا بەش كۈندىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك . ئۇلاش ئۇسۇلى : بۇ ئۇسۇل «T» شەكىللىك ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ئۇلاش ئۇسۇلىغا ئوخشايدۇ . ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى ، بىخنى ياغاچ قىسمىدىن ئاجرىتىشتا ، خاس قوۋزىقى مېغىزى (ئۈندۈر-مىسى) بىلەن بىللە ئاجرىتىۋېلىنىدۇ (ياغاچ قىسمى ئېلىنىمايدۇ) . شۇڭا ، بۇ ئۇسۇل بىلەن ئۇلانغان كۆچەتلەر ، باشقا ئۇسۇللار ئارقىلىق ئۇلانغان كۆچەتلەرگە قارىغاندا 7 — 8 كۈن بۇرۇن كۆكلەيدۇ ھەم كۆكلەش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولىدۇ .

3. كىيدۈرمە ئۇلاق (پىپى ئۇلاق ، ناچا ئۇلاق)
بۇ خىل ئۇلاق ئۇلاق ئاستىنىڭ دىئامېتىرى بەك كىچىك بولۇپ ، قوۋزاق (كۆز) ئۇلاق ئۇلاشقا مۇمكىن بولمىغان شارائىتتا ئاندىن ئېلىپ بېرىلىدۇ . بىر ياپ ئۆسۈ-ۋاتقان كۆچەتلەرنى ئۇلانغاندا قىسمەن كۆچەتلەر بەك كىچىك بولغاچقا ، قوۋزاق ئۇلاق (بىخ ئۇلاق) قىلىشقا بولمايدۇ . بۇنداق كۆچەتلەرنى كىيدۈرمە ئۇلاق (پىپى ئۇلاق) ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۇلسا بولىدۇ . ئەمما ، بۇ ئۇسۇلدا ئۇلاش ئۈچۈن ، ئۇلاق ئاستى بىلەن ئۇلاق ئۈستىنىڭ دىئامېتىرى ئوخشاش چوڭلۇقتا بولۇشى ، ئۇلىنىدىغان كۆچەتنىڭ دىئامېتىرى 0.8 سانتىمېتىردىن تۆۋەن بولۇشى كېرەك . ئۇلاش ئۇسۇلى : ئالدى بىلەن نوتا بىر تال بىخ

بىلەن قوشۇپ ، 1 — 1.5 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا ، ئاستى - ئۈستى تۈز سىزىق بويىچە ئايلاندۇرۇپ ياغاچ قىسمىغىچە كېسىلىدۇ . ئۈچى تەرىپىدىكى ياغىچى قوۋزاق كېسىلگەن جايدىن كېسىپ تاشلىنىپ ، بىخ قول بىلەن تولغىنىپ قوۋزىقى ياغاچتىن چىقىرىۋېلىنىدۇ . ئاندىن كې - يىن ، ئۇلاق ئاستى تۈپىنىڭ ئوخشاش چوڭلۇقتىكى يېرى - دىن كېسىپ تاشلىنىپ ، قوۋزاقلىق بىخنىڭ دىئامېتىرى بىلەن ئوخشاش ئورۇننىڭ قوۋزىقى چىقىرىپ تاشلىنىدۇ . قوۋزاقلىق بىخنىڭ چىڭ كەلگۈدەك يېرىگىچە قوۋزىقى تە - تۈر سويۇپ قويۇلسىمۇ بولىدۇ . شۇ ئورۇنغا ناچا شەكىل - لىك قوۋزاقلىق بىخنى چىڭ كىيدۈرۈپ قويغاندىن كې - يىن ، ئۇلاق ئۈستى تېگىلمىسىمۇ كۆكلەۋىرىدۇ .

5. پەرۋىش قىلىش

ئۇلاق بىخلىرى كۆكلەپ چىقىپ 3 — 5 سانتىمېتىر ئۆسكەندە تېڭىقنى يېشىۋېتىش لازىم . ئۇلغان تۈپلەرنىڭ بىخ ئورنى قارىداپ سېسىپ كەتكەن بولسا ، ۋاقتىدا تەكشۈ - رۇپ قايتىدىن ئۇلاش كېرەك . ئۇلاق ئۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن (10 — 15 كۈندىن كېيىن) ، سۈزۈك سۇ باشلاپ بىر قېتىم نېپىز سۇغىرىش (بىخ ئورنى سۇغا چىلىشىپ قېلىشتىن ساقلىنىش) ، ئۇلاق ئاستىدىكى غولدىن كۆك - لەپ چىققان ياۋا بىخلارنى داۋاملىق پۇتاپ تۇرۇش كېرەك . يېڭى بىخلار كۆكلەپ 20 — 25 سانتىمېتىر بولغاندا مۇۋاپىق قوشۇمچە ئوغۇتلاش ، ۋاقتىدا سۇغىرىش ، ۋاقتىدا تۈۋىنى يۇمشىتىپ ، ئوتلىرىنى ئوتاپ پەرۋىش قىلىشنى

كۆچەيتىش لازىم . ئەگەر ئۇلانغان كۆچەتلەر ياخشى پەرۋاش قىلىنسا ، كۆچەتلەرنىڭ ئېگىزلىكىنى شۇ يىلى كۈزگىچە 1.5 مېتىردىن ئاشۇرغىلى بولىدۇ .

7 . شاپتۇل كۆچىتىنى ئۇلاش

بىر قىسىم ئەلا سورتلۇق شاپتۇللارنىڭ ئۇرۇقىدىن تېرىپ ئۆستۈرۈلگەن كۆچەتلىرى مېۋىگە كىرگەندىن كې- يىن ، ئەسلىدىكى ئانا تۈپلەرنىڭ ئىرسىيەتلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى ساقلاپ قالالايدۇ . يەنە بىر قىسىم سورتلۇق كۆچەتلەر مېۋىگە كىرگەندىن كېيىن (بولۇپمۇ يېشى چو- ئايغانسېرى) ، سورتى تەدرىجىي چېكىنىپ ، سۈپىتى ئۆز- گىرىپ كېتىدىغان ئەھۋاللارمۇ كۆرۈلىدۇ . بۇ ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىگە باغلىق . ئۇنداق بولسا قانداق ئۇسۇل قوللانغاندا سورت چېكىنىپ كېتىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ ؟ بۇنىڭدىكى ئەڭ ياخشى ئۇسۇل ئۇلاش ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش ، يەنى ئۇرۇقتىن تېرىپ ئۆستۈرۈلگەن ھەر خىل شاپتۇل كۆچەتلىرىنى ئەلا سورتلارغا ئۇلاش ئارقىلىق ھەل قىلغىلى بولىدۇ . ئەگەر بىر خىل ئەلا سورتلۇق شاپتۇلنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىپ ، ئۇنىڭ كۆچىتىگە يەنە بىر قېتىم شۇ خىل ئەلا سورتلۇق شاپتۇلنىڭ بىخى ئۇلاق ئۈستى قىلىپ ئۇلانسا ، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ مېۋىسى تېخىمۇ چوڭ ، سورتى تېخىمۇ سۈپەتلىك ، تەمى تېخىمۇ تاتلىق بولغاندىن باشقا ، ئۇزاق يىللارغىچە

ئۆزىنىڭ ئەسلىدىكى ئىرسىيەتلىك خۇسۇسىيىتىنى ساقلاپ قالالايدۇ . ئەگەر بۇ ئۇسۇل ئەمەلىي قوللىنىلسا ، شاپتۇل دەرەخلىرىنىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنى تېخىمۇ ئۆستۈرگىلى بولىدۇ .

ھازىر كۆپىنچە سورتى ھەر خىل ، ئارىلاش شاپتۇل ئۇرۇقلىرىنى تېرىپ كۆچەت يېتىشتۈرۈلۈۋاتىدۇ . بۇ خىل كۆچەتلەرنى شۇ يىلى كۈز ياكى كېلەر يىلى يازدا ئەلا سورتلارغا ئۇلاپ ، سۈپىتىنى ياخشىلىغاندىن كېيىن ، باغ بىنا قىلىشقا ئىشلىتىش كېرەك .

1 . نوتا تاللاش

ئۇلاق ئۈستى قىلىنىدىغان نوتىلارنى ئېلىشتا ، ئالدى بىلەن نوتا ئېلىنىدىغان ئەلا سورتلۇق شاپتۇل (توغاچ) دەرەخىنىڭ ئانا تۈپلىرىنى ياخشى تاللاش زۆرۈر . تاللىنىدىغان ئەلا سورتلار (I باققا قاراڭ) مول ھوسۇللۇق ، ياش ، ساغلام ، باراقسان ئۆسكەن تۈپلەردىن بولۇشى كېرەك . نوتىنى دەرەخ تاجىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىكى كۈنچەدە قىش تەرىپىدىن ، ساغلام ، تولۇق پىشقان ، بىخى كۆپ مېۋە شاخلىرىدىن كېسىۋېلىش كېرەك . نوتىنى ئەتىگەن ياكى كەچ تەرەپلەردە ئۇدۇللۇق ئېلىپ ، ئۇدۇللۇق ئۇلاش ، يەنى راقىتىن كەلتۈرۈلگەن نوتىلارنى ئۇدۇللۇق ئۇلاپ بولالمايدىغان ، گەمىدە ياكى كۈن نۇرى چۈشمەيدىغان سالقىن جايدا نەم قۇمغا كۆمۈپ ساقلاپ ، ئۇدۇللۇق ئېچىپ ئۇلاش لازىم .

2 . ئۇلاش مەزگىلى ۋە ئۇلاش ئۇسۇلى

شاپتۇل كۆچەتلىرى باشقا مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىدە

گە ئوخشاشلا ، ئەتىيازدا « T » شەكىللىك ياغاچلىق بىخ ئۇلاق ، يازدا ۋە كۈزدە « T » شەكىللىك قوۋزاقلق بىخ ئۇلاق ، يازدا پىپى (ناچا) ئۇلاق ئۇسۇللىرى ئارقىلىق ئۇلىنىدۇ . ئۇلاش ئۇسۇلى نەشپۈت كۆچىتىنى ئۇلاش ئۇسۇلىغا ئوخشايدۇ . شاپتۇل كۆچىتىنى ياز پەسلىدە ئۇلىغاندا ، ئەتىگەن ۋە كەچقۇرۇندا ئۇلاش كېرەك . ھاۋا بەك ئىسسىق ياكى يامغۇر ياغقان چاغلاردا ئۇلىغان ئۇلاقنىڭ كۆكلەش نىسبىتى تۆۋەن بولىدۇ .

3. پەرۋىش قىلىش

كۆچەتلەر ئۇلىنىپ بولغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭ كۆك-لەش ئەھۋالىنى پات - پات تەكشۈرۈپ تۇرۇش لازىم . ياغاچلىق بىخ ئۇلاقنىڭ تۇتقان - تۇتمىغانلىقىنى 20 كۈندە ، قوۋزاقلق بىخ ئۇلاق ۋە پىپى ئۇلاقنىڭ تۇتقان - تۇتمىغانلىقىنى 10 — 15 كۈندە بىلگىلى بولىدۇ . مۇشۇ مەزگىلگىچە كۆكلىمەيدىغان ئۇلاقلارنى بىخ ئورنىغا قاراپلا بىلگىلى بولىدۇ . كۆكلىمەيدىغانلىرى قورۇلۇپ قارىداپ قالىدۇ . يوپۇرماق سايپى قولىنى تەڭگۈزسىمۇ چۈشمەيدۇ . بۇنداق ئەھۋال كۆرۈلسە بىخ تۇتمىغان ھېسابلىنىدۇ . شۇڭا ، دەرھال قايتىدىن ئۇلاش كېرەك . ئۇلانغان كۆچەتلەرنىڭ ئۇلاق ئاستىدىن ئۆسۈپ چىققان بىخ ۋە ياۋا شاخلارنى ۋاقتى - ۋاقتىدا پۇتاپ تۇرۇش كېرەك . كۆكلەپ چىققان بىخلار 5 — 6 سانتىمېتىر ئۆسكەندىن كېيىن ، تاڭغان تېڭىقنى ئاۋايلاپ يېشىۋېتىش لازىم . ئۇلانغان كۆچەتلەرنى ئوغۇتلاش ، سۇغىرىش ، ئوتاش ، توپىسىنى يۇمشىتىش ،

ئۇششۇكتىن ساقلاش قاتارلىق پەرۋش ئىشلىرىنى تەلەپ
 بويىچە ياخشى ئىشلەش لازىم . 6- ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا ھەر
 مو يەرگە 1000 كىلوگرام ئورگانىك ئوغۇت ، 10 — 15
 كىلوگرام خىمىيىۋى ئوغۇت بېرىپ ياخشى پەرۋش قىلسا ،
 يىل ئاخىرىغىچە كۆچەتنىڭ ئېگىزلىكىنى 1 مېتىردىن ئا-
 شۇرغىلى بولىدۇ .

IV باب مېۋىلىك دەرەخ كۆچەتلىرىنى باشقا ئۇسۇللار بىلەن يېتىشتۈرۈش

مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سورتلۇق كۆچەتلىرى ئەلا سورتلۇق مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئۇرۇقىنى تېرىش ، نوتە-سىنى قەلەمچە قىلىش ، بىخنى ئۇلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق يېتىشتۈرۈلگەندىن باشقا ، نوتا باسۇرۇش ، تۈپ ئايرىش ، توقۇلمىدىن كۆپەيتىش ئۇسۇللىرى ئارقىلىقمۇ يېتىشتۈرۈلىدۇ .

1 . نوتا باسۇرۇش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش

نوتا باسۇرۇش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ يىلتىز ئەتراپى ياكى چاچما يىلتىزلىرىدىن كۆكلەپ چىققان ، شۇنداقلا قەلەمچە قىلىپ يېتىشتۈرۈلگەن بىر يىللىق يۇمران نوتىلارنى شۇ جايدىلا باسۇرۇپ كۆمۈش ئارقىلىق يىل ئاخىرىغىچە بىر تۈپ كۆچەت-تەن 3 — 4 تال ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك مۇستەقىل كۆچەت يېتىشتۈرۈش ئۇسۇلىنى كۆرسىتىدۇ . بۇ ئۇسۇلنىڭ ئۈنۈمى ياخشى بولسىمۇ ، لېكىن ئېھتىياجلىق كۆچەت-

لەرنى تولۇق ھەل قىلىپ كەتكىلى بولمايدۇ ھەم ئادەتتە كۆپ قوللىنىلمايدۇ. بۇ ئۇسۇل بىلەن ئانار، ئۈزۈم، ئەنجۈر، بېھى، قارىئۆرۈك قاتارلىق دەرەخلەرنىڭ بىر قىسمى كۆچەتلىرىنى يېتىشتۈرۈپ چىققىلى بولىدۇ.

2. تۈپ ئايرىش ئارقىلىق كۆچەت يېتىشتۈرۈش

بۇ، مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ يىلتىز بوغۇمى، يىلتىز ئەتراپى، چاچما يىلتىزى ياكى كولاپ كېسىۋېتىلگەن يىلتىزلىرىدىن كۆكلەپ چىقىپ، ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل تۈپ بولۇپ يېتىشىپ چىققان كۆچەتلىرىنى كۆرسىتىدۇ. ئانار، چىلان، تال، قارىئۆرۈك، بېھى، ئەنجۈر قاتارلىق دەرەخلەرنىڭ يىلتىز بوغۇمى، يىلتىز ئەتراپى ۋە كېسىۋېتىلگەن يىلتىزىدىن تۈپلىنىش ئىقتىدارى كۈچلۈك، ئۆسۈپ يېتىلىشى تېز بولۇپ، بۇ خىل كۆچەتلىرىنى كۈز ياكى ئەتىياز پەسلىدە يىلتىزى بىلەن تۈپ ئايرىپ، باشقا جايغا يۆتكەپ تەكسە ئۇنىڭ كۆكلەش ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ. جايلار ئېھتىياجلىق بولغان چوڭ ئانار كۆچەتلىرى مۇشۇ ئۇسۇل بىلەن ھەل قىلىنىدۇ، بولۇپمۇ ئانار، قارىئۆرۈك قاتارلىقلارنىڭ يىلتىز بوغۇمىنىڭ ئەتراپىدىن تۈپلىنىش ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ، بىر تۈپتىن 5 — 10 تال شاخنى 1 — 2 تال يىلتىزى بىلەنلا يېرىپ تۈپ ئايرىۋالغىلى بولىدۇ. لېكىن، بۇ ئۇسۇل يېتىشمىگەن كۆچەت ساندە

نى ۋاقىتلىق تولۇقلاش رولىنى ئوينايدۇ . ئەمما ، كۆچەت مەنبەسىنى كېڭەيتىشنىڭ ئاساسلىق ئۇسۇلى بولالمايدۇ .

3 . توقۇلمىدىن كۆچەت يېتىشتۈرۈش

توقۇلمىدىن كۆچەت يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسى ئادەتتە بىئوتېخنىكىسى (بىئولوگىيە قۇرۇلۇش تېخنىكىسى) دەپ ئاتىلىدۇ . بۇ تەتقىقات تۈرىنى 1988- يىلى شىنجاڭ ئورمانچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ تەتقىقات گۇرۇپپىسىدىكى لى كاڭ قاتارلىقلار ئۈستىگە ئېلىپ ئاقسۇدا تەتقىقاتقا كىرىشكەن . ئۇلار سەككىز يىل تەجرىبە - تەتقىقات ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ، بادام ، ئەنجۈر ، پىستە ، چىلان ، ئۈچ-مە ، ئۈزۈم قاتارلىق ئىقتىسادىي دەرەخلەرنىڭ توقۇلمىسى ئارقىلىق پروبىرىكىدا كۆچەت يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسىنى سىناق قىلىپ مۇۋەپپەقىيەت قازانغان . تەتقىق قىلغان بادام تۈرى 12 خىلغا ، پروبىرىكىدا يىلتىز چىقىرىش نىسبىتى 100% كە يەتكەن . بۇنىڭ بىلەن بىئوتېخنىكىسى ئارقىلىق ئىقتىسادىي دەرەخلەرنىڭ توقۇلمىسىدىن ئىرسىيەتچانلىقى مۇقىم ، كۆپىيىش ھەسسىسى كۆپ ، يىلتىز چىقىرىش نىسبىتى يۇقىرى ، ئەلا سورتلۇق ، سۈپەتلىك كۆچەت يېتىشتۈرۈشكە ئاساس سېلىندى . ئىقتىسادىي دەرەخلەرنىڭ توقۇلمىسىدىن زاۋۇتلاشتۇرۇپ تېز كۆچەت يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسى ھازىر شىنجاڭ بويىچە توقۇلمىدىن كۆچەت يېتىشتۈرىدىغان ئەڭ چوڭ بازا بولۇپ قالدى . لېكىن ، بۇ

ئۇسۇلدا كۆچەت يېتىشتۈرۈش يۇقىرى پەن - تېخنىكا ،
ياخشى شارائىت ۋە يېتەرلىك مەبلەغ تەلەپ قىلىدىغان بول-
غانلىقتىن ، ھەرقايسى ناھىيە ، شەھەرلەردە بۇ ئۇسۇلنى
قوللانماق ناھايىتى قىيىن . ئەمما ، ناھىيە ، شەھەرلەرنىڭ
دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كۆچەت يېتىشتۈرۈش مەيدانلىرىدا
ئۇنىڭدىن ئاددىي راق تېخنىكىلارنى قوللىنىپ ، ئادەتتىكى
توقۇلمىلاردىن كۆچەت يېتىشتۈرگىلى بولىدۇ . زامانىۋى
ئۇسۇلدا توقۇلمىدىن كۆچەت يېتىشتۈرۈشتە دەرەخنىڭ يو-
پۇرماق ۋە يوپۇرماق تومۇرى بىلەن يۇقىرى ئۈنۈملۈك
خىمىيىلىك دورىلار ئىشلىتىلىدۇ . ئەمما ، ئادەتتىكى ئۇ-
سۇلدا توقۇلمىدىن كۆچەت يېتىشتۈرۈشتە ئەلا سورت-
لۇق ئانا تۈپلەرنىڭ يۇمران شاخ - نوتىلىرى ئىشلىتىلىد-
ىدۇ ، بۇنىڭ كونكرېت ئۇسۇللىرى مۇنداق : دەرەخلەر ئۆ-
سۈۋاتقان مەزگىلدە ، ئەلا سورتلۇق چىلان ، ئانار ، بادام ،
ئۈزۈم قاتارلىق مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئانا تۈپلىرىنىڭ
يۇمران شاخ - نوتىلىرى يىغىۋېلىنىپ ، دېزىنڧېكسىيە قىل-
ىش ئارقىلىق مىكروپىسىز لاندۇرۇلىدۇ ، ئاندىن 1 سانتى-
مېتىر ئۇزۇنلۇقتا بىر تال بىخ بىلەن كېسىۋېلىنىپ ،
ئالدىن تەييارلانغان گورمون سۇيۇقلۇقىغا سانجىپ تېرىل-
سا ، 15 — 20 كۈن ئەتراپىدا ئاق رەڭلىك توقۇلمىلار
شەكىللىنىپ يىلتىز چىقىرىدۇ . ئۇنىڭدىن كېيىن مەخ-
سۇس تەييارلانغان دورىلار بىلەن ئەينەك شېشىدە تېز سۈر-
ئەت بىلەن كۆچەت يېتىشتۈرۈلىدۇ . شېشىدىكى كۆچەت 5
سانتىمېتىردىن ئاشقاندا يەنە 1 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا ،
تاق بىخلىق توغرىلىپ ، شېشىلەرگە كۆچۈرۈپ داۋاملىق

يېتىشتۈرۈلدى ، 15 كۈندىن كېيىن ، توقۇلمىلار يىلتىز
چىقىرىدۇ ۋە بىخلىنىدۇ . بۇ خىل ئۇسۇلدا بىر دانە بىخ-
تىن بىر يىلدا 20 — 30 مىڭ تۈپ كۆچەت يېتىشتۈرگىلى
بولىدۇ . شېشىدىكى كۆچەتلەر بىر تەرەپتىن ئېتىزلىققا
كۆچۈرۈلىدۇ . بۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق يېتىشتۈرۈلگەن
كۆچەتلەر ئېتىزلىققا كۆچۈرۈلگەندىن كېيىن ، شۇ يىلى
25 — 30 سانتىمېتىر ئېگىزلىكتە ئۆسىدۇ . ياندۇرقى
يىلى يەنە بىر يىل تەربىيىلىگەندىن كېيىن ، ئۆلچەمگە
يەتكەندە ئورمان بىنا قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ .

مەسئۇل مۇھەررىرى : دىلبەر ئابدۇرېھىم
مەسئۇل كوررېكتورى : ئارزۇگۈل سىدىق

مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەلا سورتلىرىنى
تېز يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسى

تۈزگۈچى : مۇھەممەتئىمىن توختى

قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى نەشر قىلىپ تارقاتتى
(قەشقەر شەھىرى تارбоғۇز يولى 14 - قورۇ ، پوچتا نومۇرى : 844000)
جايلاردىكى شىنخۇا كىتابخانىلىرىدا سېتىلىدۇ
قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى
فورماتى : 1092×787 1/32 باسما تاۋىقى : 4. 25
2003 - يىل 11 - ئاي 1 - نەشرى
2006 - يىل 4 - ئاي 2 - بېسىلىشى
تراژى : 5650 — 2571

ISBN7 — 5373 — 1207 — 9

باھاسى : 6.50 يۈەن

سۈپەتتە مەسىلە كۆرۈلسە ئالماشتۇرۇپ بېرىلىدۇ

تېلېفون : 2653927 — 0998

مۇقاۋىنى لايىھىلىگۈچى: غەيرەت خالىق



ISBN 7-5373-1207-9

(民文) 定价: 6.50 元

ISBN 7-5373-1207-9



9 787537 312073 >